

成方切用

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

上海
書店

卷九上

除痰門

正方三十一
附方二十一

苓桂朮甘湯

二陳湯

陳皮半夏湯

枳椇二陳湯

茯苓

半夏湯

二陳加梔連生薑湯

砂枳二陳湯

導痰湯

順氣導痰湯

加味二陳湯

溫中化

痰丸

三聖丸

橘

潤下丸

散

順氣消食化痰

皮湯

生薑半夏湯

金沸草散

半夏白朮天麻

丸

湯

六安煎

和胃二陳煎

枳椇二陳煎

礞石滾痰丸

瀝竹

達痰丸

清膈煎

茯苓丸

控涎丹

辰砂散

寧志膏

三子養親湯 常山飲 截瘡七寶飲 滌痰湯

星香散 牛黃丸 貝母丸 清肺飲 清氣

化痰丸 蘇子降氣湯 定喘湯 七氣湯

三因七氣

湯 四七湯 白金丸 百花膏

加味百花香膏

六君子湯

見治氣門 六味地黃丸

見補養門

八味地黃丸

見補養門

吳氏醫學述第四種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有榆蒼培同較
有杜雋望

成方切用

除痰門

內經止有積飲之說並無痰證之名至仲景始立四飲之名而痰飲居其一

。今後世相傳無論痰非痰開口便言痰火有云怪病之爲痰者有云痰爲百病母者不知痰之爲病必有所以致之者如因風因火而生痰者但治其風火風火息而痰自清也因虛因實而生痰者但治其虛實虛實愈而痰自平也未聞治其痰而風火可自散虛

實可自調者。此所以痰必因病而生。非病之因痰而致也。治之之法。全在詳辨虛實。果其年力猶盛。血氣未傷。或以肥甘過度。或以溼熱盛行。或逆氣內連肝膈。皆能驟致痰飲。但察其形氣病氣。多屬有餘者。卽實痰也。此則宜行消伐。但去其痰。無不可也。如其形羸氣弱。年及中衰。或以多病。或以勞倦。或以憂思。酒色。致成勞損。非風卒厥者。或脈見細數。藏無陽邪。時爲嘔惡。泄瀉。氣短。聲暗等證。但察其形氣病氣。本非有餘者。皆虛痰也。此則但宜調補。若或攻之。無不危矣。提之治痰之法。但能使元氣日強。則痰必日少。卽有微痰。亦自不能爲害。而且充助胃氣。若元氣日衰。則水穀津液。無非痰爾。隨去隨生。有能攻之。使盡。而且保元氣。無恙者乎。故善治痰者。惟能使使之不生。方是補天之手。苟不辨其虛實。而欲一槩攻之。如玉隱君所論。內外百病皆生於痰。悉用滾痰丸之類。其亦但知目前。而不

知日後之患哉。諸家治痰之法。多有治其標者。雖不可執。亦不可廢也。詳列如左。

苓桂朮甘湯

金匱

治心下有痰飲胸脇支滿目眩

茯苓

四兩桂枝

白朮

三兩甘草

二兩

痰飲陰象阻抑其陽。用此陽藥化氣以伸其陽。此正法也。茲所主乃在胸脇支滿目眩者。何耶。靈樞謂心包之脈是動則病胸脇支滿。然則痰飲積於心包。其病自必若此。目眩者。痰飲阻其胸中之陽。不能布水精於上也。茯苓治痰飲伐腎邪。通水道。桂枝通陽氣和營衛。開經絡。白朮

治風眩燥痰水除脹滿準繩云痰之本由於脾

而淤以成者也治痰宜先補脾脾復健運之常而痰自化矣甘草得茯苓則

不資滿而反泄滿本草亦曰甘草除煩滿故用之也金

日短氣有微飲當從小便去之苓桂术甘湯主

之腎氣丸亦主之喻嘉言曰予辨息論中已詳

仲景分別呼吸言病之旨矣今短氣亦分呼吸

各出一方呼吸氣之短用苓桂术甘湯以通其陽

陽氣化則小便能出矣吸氣之短用腎氣

丸以通其陰腎氣通則小便之關門利矣

二陳湯局方陳皮半夏貴其陳久治一切痰飲

爲病咳嗽脹滿嘔吐惡心頭眩心悸稠者爲痰

水溼其本也得火則結爲痰隨氣升降在肺則

咳在胃則嘔在頭則眩在心則悸在背則冷在

肺則脹中脘有痰令人憎寒壯熱頭痛類外感
表證久則潮咳夜重又類陰火內傷走注厥節
疼痛又類風證但肌色如故脈滑不勻爲異。

半夏

直製二錢

陳皮

去白

茯苓

甘草

五分

加薑煎

薑能

製半夏之毒。

治痰通用

二陳

風痰

加南星

白附

皂角

之毒。

竹瀝

寒痰

加半夏

薑汁

火痰

加石膏

青黛

溼痰

之毒。

加蒼朮

白朮

燥痰

加栝

薤杏仁

食痰

加山查

麥

之毒。

芽神

麴老痰

加枳實

海石

苾硝

氣痰

加香附

枳

之毒。

殼脇

痰及在皮

裏膜外

加白芥子

四肢

痰加竹

瀝

之毒。

之毒。

半夏辛溫體滑性燥行水利痰爲君痰因氣滯

氣順則痰降

應安常曰善治痰者不治痰而治氣氣順則一身津液亦隨氣而順

矣故以橘紅利氣痰由溼生溼去則痰消故以

茯苓溼爲臣中不和則痰涎聚又以甘草和

中補土爲佐也

或曰有痰而渴宜去半夏代以

水者易之渴而不能飲水者雖渴猶宜半夏也此溼爲本熱爲標溼極而兼勝已之化非真象也按貝母寒潤主肺家燥痰半夏溫燥主脾家溼痰雖俱化痰而寒溼燥潤各異脫或悞施貽害匪淺用者宜審之有血不足陰火上逆肺受火傷肅清之令不得下行由是津液渾濁生痰不生血者名燥痰當用潤劑如地黃門冬枸杞之類滋陰降火而痰自清若痰二陳立見危

殆有頭風。若稜骨痛。投以風藥不効。投以痰藥見功。又有眼赤羞明。與之涼藥不瘳。鼻以痰劑養愈。有人坐處吐痰滿地。不甚稠黏。只是沫多。此氣虛。不能攝。痰不可用利藥。宜六君子加益智仁一錢以攝之。

去茯苓甘草名陳皮半夏湯再加桔梗名桔梗

半夏湯去陳皮甘草名半夏茯苓湯治水氣嘔

惡加黃芩名茯苓半夏湯宣明治熱痰加黃連梔

子生薑名二陳加梔連生薑湯治膈上熱痰令

人嘔吐去生薑治嘈雜加砂仁枳殼名砂枳二陳湯行

痰利氣加膽星枳實名導痰湯治頑痰膠固非

二陳所能除者

加膽星以助半夏。加枳實以成衝牆倒壁之功。有痰飲流入

四肢肩背痠痛手足罷軟候以爲風則非其治宜導痰湯加木香片子薑黃。

再加菖

蒲治驚悸健忘怔忡不寐導痰湯加木香香附

名順氣導痰湯治痰結胸滿欬逆上氣加枳實

桔萸龍子山查神麴治食積痰嗽發熱加蒼朮

枳殼片子薑黃名加味二陳湯

仁治痰攻眼腫

併酒家手臂重痛麻木除甘草加乾薑薑汁糊

丸名溫中化痰丸

實鑑治胸膈寒痰不快除茯苓

甘草加黃連麴糊丸薑湯下名三聖丸治痰火

嘈雜心懸如饑單用陳皮生薑名橘皮湯金匱治
乾嘔噦及手足厥者單用半夏薑汁名生薑半
夏湯金匱治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心中
憤憤然無奈者

潤下丸 治膈中痰飲

廣陳皮

去白八兩
鹽水洗浸

甘草

二兩
蜜炙

蒸餅糊丸或將

陳皮鹽水煮爛曬乾同甘草爲末名二賢散薑
湯下溼勝加星夏火盛加芩連

陳皮燥溼而利氣溼去則痰消氣順則痰下食

鹽潤下而軟堅潤下則痰降軟堅則痰化痰在
膈中故用甘草引之入胃甘草經蜜炙能健脾
調胃脾胃健則痰自行矣

順氣消食化痰丸

瑞竹堂

治酒食生痰胸膈膨悶

五更咳嗽

過飲則脾瀉過食辛熱油膩之物皆能生痰壅於胸膈故滿悶五更咳嗽

由胃有積熱至此時火氣流入肺中故嗽

半夏

製

膽星

一青皮

陳皮

去白

萊菔子

生用

蘇子

沉水

山查

麥芽

神麴

葛根

杏仁

去皮

香附

製一兩

薑汁和蒸餅糊丸

一方半夏南星白礬皂角生薑

等分同煮至兩星無點爲
度去皂角薑切同曬乾用

痰由溼生半夏南星所以燥溼痰由氣升蘇子
蒴子杏仁所以降氣痰由氣滯青皮陳皮香附
所以導滯痰因於酒食葛根神麴所以解酒山
查麥芽所以化食溼去食消則痰不生氣順則
咳嗽止痰滯既去滿悶自除也

金水六君煎 治肺腎虛寒水泛爲痰或年邁陰
虛血氣不足外受風寒咳嗽嘔惡多痰喘急等
證神效妙劑 此六君子湯之變方也

當歸

錢二

熟地

錢三

陳皮

錢半

半夏

錢二

茯苓

錢二

炙草

錢一

加生薑

三五

片

如大便

不實而

多溼者

去當歸

加山藥

如痰盛

氣滯

胸膈不

快者

加白芥子

七分

如陰寒

盛而嗽

不愈者

加細辛

五分

如兼表

邪寒熱

者加柴胡

一

二錢

金沸草散

活

治肺經傷風

頭目昏痛

咳嗽多痰

風盛則氣壅

氣壅則痰升

故頭目昏痛

而咳嗽

直指方云

咳嗽感風者

鼻塞聲重

傷冷者

懷清

怯寒挾熱

爲焦煩

受濕爲纏

滯瘀血

則膈間

腥

悶停水

則心下

怔忡

三因方云

一婦牙疼

治療

金沸草散

活

治肺經傷風

頭目昏痛

咳嗽多痰

風盛則氣壅

氣壅則痰升

故頭目昏痛

不效。口類皆腫。以金沸草散大劑煎湯薰漱而愈。

旋覆花

即金沸草

前胡

細辛

錢一 荆芥

錢半

赤茯苓

六分

半夏

五分

甘草

炙三分

加薑棗煎局方加麻黃赤

芍無赤茯苓細辛如滿悶加枳殼桔梗有熱加柴

胡黃芩頭痛加川芎

風熱上壅荆芥輕辛發汗而散風痰涎內結前胡旋覆消痰而降氣半夏燥痰而散逆甘草發散而緩中茯苓行水細辛溫經蓋痰必挾火而兼溼故下氣利溼而證自平茯苓用赤者入血

分而瀉丙丁也

半夏白朮天麻湯

東垣

治脾胃內傷眼黑頭眩頭

痛如裂身重如山惡心煩悶四肢厥冷謂之足

太陰痰厥頭痛

痰厥者。淫痰厥逆而生也。痰逆則上實。故令頭痛目眩。眼前見

黑色也。東垣曰。太陰頭痛必有痰也。少陰頭痛足寒而氣逆也。太陰少陰二經雖不上循頭

然痰與氣逆壅於膈中頭上氣不得暢而爲痛也。

半夏

薑製

麥芽

錢半

神麴

炒

白朮

錢炒一

蒼朮

浸

人參

黃耆

蜜炙

陳皮

茯苓

澤瀉

天麻

五分

乾薑

分三

黃櫨

酒洗

每服

五錢

痰厥頭痛非半夏不能除

半夏燥痰而能和胃

頭旋眼黑

虛風內作非天麻不能定黃耆人參甘溫可以

補中亦可以瀉火二朮甘苦而溫可以除痰亦

可以益氣

去淫故除痰健脾故益氣

苓澤瀉熱導水陳皮調

氣升陽神麴消食蕩胃中滯氣麥芽化結助戊

已運行

胃爲戊土脾爲己土

乾薑辛熱以滌中寒黃蘗苦

寒以療少火在泉發躁也

東垣曰夫風從上受之風寒傷上邪從外

入令人頭痛身重惡寒此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩

頭痛者過在手太陽少陰乃淫熱頭痛也如氣上不下頭痛巔疾者下虛上實也過在足太陽

少陰甚則入腎寒溼頭痛也。如頭半寒痛者先取手少陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也。有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治頭痛每以風藥治之者以高巔之上唯風可到味之薄者陰中之陽乃自地升天者也。太陽頭痛惡風寒脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主。少陽頭痛脈弦細往來寒熱柴胡黃芩為主。陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根白芷石膏為主。太陰頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖其脈沉緩蒼朮半夏南星為主。少陰頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃附子細辛湯主之。厥陰頭痛或吐涎沫厥冷脈浮緩吳茱萸湯主之。血虛頭痛當歸川芎為主。氣虛頭痛人參黃耆為主。氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛清空膏風溼頭痛藥也。白朮半夏天麻湯痰厥頭痛藥也。羌

活附子湯厥逆頭痛藥也。如溼氣在頭者以苦吐之。不可執方而治。按以苦吐之者。瓜蒂散。濃茶之類是也。或搐去鼻中黃水。亦治溼氣在頭之捷法。

六安煎 治風寒咳嗽痰滯氣逆

陳皮

一錢五分

半夏

二錢三分

茯苓

二錢

甘草

一錢

杏仁

一錢

芥子

五七分。年老氣弱者不用。

加生薑

三五片

凡外

感風邪咳嗽而寒氣盛者多不易散。宜加北細

辛七八分。或一錢。若冬月寒邪盛者加麻黃

桂枝亦可。若風勝而邪不盛者加防風一錢

或蘇葉亦可。若頭痛鼻塞者加川芎白芷蔓

荆子皆可。若兼寒熱者加柴胡蘇葉。若風邪咳嗽不止而兼肺胃之火者加黃芩一二錢。甚者再加知母石膏所用生薑止。空一片。凡寒邪咳嗽痰不利者加當歸二三錢。老年者尤空。若氣血不足者當以金水六君煎俱此參用。凡時行初感痰勝而氣不順者加藿香一錢五分兼脹滿者加厚朴一錢。暫開痰氣然後察其寒熱虛實而調補之。若氣虛猝倒及氣平無痰者皆不可用此。

去杏仁白芥子加炒乾薑一二錢砂仁四分名
和胃二陳煎治胃寒生痰惡心嘔吐滿悶噯氣
去杏仁白芥子加豬苓澤瀉茯苓一錢五分白
朮一二錢乾薑炒黃二錢名苓朮二陳煎治痰
飲水氣停蓄心下嘔吐吞酸等證如肝腎兼寒
者再加肉桂一二錢去杏仁加乾薑豬苓爲末
湯浸蒸餅爲丸綠豆大白滾湯下名括痰丸治
一切停痰積飲吞酸嘔酸脹悶如胸脇疼痛者
加天台烏藥

礞石滾痰丸

王隱君

治實痰老痰怪證百病

風木太過

尅制脾土氣不運化積滯生痰壅塞中上二焦
遇薄腸胃曲折之處謂之老痰變生諸證不可
測識非尋常藥餌所能療也此丸主之

青礞石

兩一

沉香

錢五

大黃

酒蒸

黃芩

兩八

將礞石打

碎用焰硝一兩同入瓦罐鹽泥固濟曬乾火煅

石色如金爲度

礞石煅過無金星者不堪用陳
久者佳新煅者火毒硝毒未除

研末和諸藥水九量人虛實服之薑湯送下服

後仰臥令藥在胸膈之間除逐上焦痰滯不宜

飲水行動

礞石剝悍之性能攻陳積伏歷之痰

吐痰水上礞石抄

之痰卽隨下故爲利痰聖藥

大黃蕩熱去實以開下行之路

黃芩瀉肺涼心以平上僭之火沉香升降諸氣

上至天而下至泉以導諸藥爲使也然乃峻劑

非體實者不可輕投

王隱君曰痰証古今未詳方書雖有五飲諸飲之異

而莫知其爲病之源或頭風作眩目運耳鳴或口眼蠕動耆稜耳輪痛癢或四肢游風腫硬似疼非疼或爲齒頰癢痛牙齒浮而痛癢或噁氣吞酸心下嘈雜或痛或噦或咽噎不利咯之不出噁之不下其痰如墨有如破絮桃膠蛻肉之狀或心下如停米鐵心氣冷痛或夢寐奇怪之狀或足腕痠軟腰背骨節卒痛或四肢筋骨疼痛難以名狀竝無常處以致手臂麻痛狀若風

濕或脊上一條如線之寒起者或渾身習習如
臥芒刺者或眼黏溼瘡口糜舌爛喉痺等證或
繞頂結核狀若煤癰或胃腹間如有二氣交結
噎息煩悶有如煙火上衝頭面烘熱或爲失志
癲癇或中風癱瘓或勞瘵荏苒之疾或風毒腳
氣或心下怔忡或畏人捕或喘嗽嘔吐或嘔冷
涎綠水黑汁甚爲肺癰腸毒便膿攀跛內外爲
病百端皆痰所致其狀不同難以盡述蓋津液
既凝爲痰不復周潤三焦故口燥咽乾大便秘
結面如枯骨毛髮焦槁婦人則因此月水不通
若能逐去敗痰自然服餌有效余用滾痰
丸以愈諸疾不可勝數特相傳於世云

加元明粉一兩硃砂爲衣治同減大黃黃芩各
六兩加橘紅半夏各二兩甘草一兩竹瀝薑汁
爲丸名竹瀝達痰丸治同力稍和緩

清膈煎

治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴等證

陳皮

一錢五分

貝母

二三錢

膽星

一錢

海石

木通

二白芥子

五分

如火盛痰不降者加童便一

小鍾

如渴甚者加天花粉二錢如熱在上

焦頭面紅赤煩渴喜冷者加生石膏二三錢

如痰火上壅而小水不利者加澤瀉一二錢

如痰火閉結大便不通而兼脹滿者加大黃數

錢或朴硝一二錢酌宜用

茯苓丸

指迷方

治痰停中脘兩臂疼痛脾主四肢脾滯而氣

成方切用

卷九上

清膈煎

茯苓丸

三

不下。故上行攻臂。
其脈沉細者是也。

半夏麴二扶苓

一兩乳拌

枳殼

五錢麴炒

風化硝

二錢半如一時

未易成。但以朴硝撒竹盤中。少時盛水。置當風處。卽乾。如苾硝刮取。亦可用。

薑汁

糊丸薑湯下

半夏燥溼茯苓滲水枳殼行氣化硝軟堅去堅

生薑制半夏之毒而除痰使痰行氣通臂痛自

止矣。

嘉言曰。痰藥雖多。此方甚效。痰飲流入四肢。令人肩背痠痛。兩手罷軟。誤以爲風。

則非其治。宜導痰湯加木香薑黃各五分。輕者指迷茯苓丸。重者控涎丹。若血虛不能榮筋而

致臂痛。宜蠲痺四物湯各半帖和服。

控涎丹

一名妙應丸
三因方

治人忽患胸背手足腰項筋

骨牽引釣痛走易不定或手足冷痺氣脈不通此乃痰涎在胸膈上下誤認癰瘰非也

甘遂

去心

大戟

去皮

白芥子

等分爲末糊丸臨臥

薑湯服五七丸至十丸痰猛加丸數腳氣加檳

榔木瓜松枝卷柏驚痰加硃砂全蠍驚氣成塊

加穿山甲鼈甲延胡索蓬朮熱痰加盆硝寒痰

加胡椒丁香薑桂

李時珍曰痰涎爲物隨氣升降無處不到入心

或方切用

痰

卷九上

控涎丹

七

則迷成癰癰入肺則塞竅爲喘咳背冷入肝則
膈痛乾嘔寒熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋
骨則牽引釣痛入皮肉則癰癰腫陳無擇三
因方竝以控涎丹主之殊有奇功此乃治痰之
本痰之本水也溼也得氣與火則結爲痰大戟
能泄臟腑水溼甘遂能行經隧水溼直達水氣所結之處
以攻決白芥子能散皮裏膜外痰氣唯善用者
爲用。能收奇功也虛弱人慎用。丹溪曰胃氣亦賴
劇。
痰以養不可盡攻攻盡則虛而愈

辰砂散

靈苑

治風痰諸癇癲狂心疾

諸癇因驚恐憂怒火盛干

心痰塞心竅發時卒倒搐掣叫吼吐涎食頃乃醒身熱脈浮在表者陽癇屬六腑易治身冷脈沉在裏者陰癇屬五臟難治其實痰火與驚而已癲狂亦由於此

辰砂

光明者一兩

乳香

光瑩者

棗仁

五錢炒

溫酒調下

恣飲沉醉聽睡一二日勿動若驚寤不可復治

辰砂鎮心瀉心火乳香入心散瘀血棗仁補肝

膽而寧心

加人參一兩蜜丸彈丸大各寧志膏

本每服一

丸薄荷湯下治同

三子養親湯

韓

治老人氣實痰盛喘滿懶食

痰不

自動因火而動氣有餘便是火氣盛上壅故喘痰火塞胸故懶食

紫蘇子

沉水

白芥子

萊菔子

各微炒研煎

服或等分或看病所主爲君

白芥子除痰紫蘇子降氣萊菔子消食然皆行

氣豁痰之藥氣行則火降而痰消矣

吳鶴皋曰治痰先理

氣此治標爾終不若二陳能健脾去溼有治本之功也李士材曰治病先攻其甚若氣實而喘

則氣反爲木痰反爲標矣是在醫者神而明之若氣虛者非所宜矣

常山飲局

瘧久不已者用此截之

瘧初起不宜截截則邪氣

未盡變生他藥
發久則可截之。

常山

燒酒炒
二錢

草菓

煨

檳榔

知母

貝母

錢一
烏

梅二箇

薑三片

棗二枚

半酒

半水

煎露

一宿

日

未出時面東空心溫服渣用酒浸煎待瘧將發
時先服一方有良薑甘草無檳榔一方加穿山
甲甘草

古云無痰不作瘧常山引吐行水祛老痰積飲

檳榔下氣破積能消食行痰陰陽不和則瘧作

陽勝則熱
陰勝則寒

知母滋陰能治陽明獨勝之火草菓

辛熱能治太陰獨勝之寒貝母清火散結瀉熱

除痰烏梅酸斂瀦收生津退熱斂陰故退熱合爲截

瘧之劑也趙以德曰常究本草知母草葉常山

方者爲知母性寒入足陽明治獨勝之熱使退

就太陰草葉溫燥治足太陰獨勝之寒使退就

陽明二經和則無陰陽交錯之變是爲君藥常

山主寒熱痰吐胸中痰結是爲臣藥烏梅湧痰

檳榔除痰癖破滯氣是爲佐藥穿山甲穴山而

居遇水而入則是出入陰陽貫穿經絡於營分

以破暑結之邪爲使藥也惟脾胃有鬱痰者用

之收斂李士材曰常山生用多用則吐與甘草

同用亦必吐若酒浸炒透但用錢許每見奇功

未見其或吐也世人泥於老人久病忌服之說

使良藥見疑沉痾難起抑何愚耶李時珍曰常

山蜀漆劫痰截瘧須在發散表邪及提出陽分

之後。用之得宜。得甘草則吐。得大黃則利。得烏梅穿山甲則入肝。得小麥竹葉則入心。得秫米麻黃則入肺。得龍骨附子則入腎。得草菓檳榔則入脾。蓋無痰不作瘧。一物之功。亦在驅逐痰水而已。

截瘧七寶飲

易簡

治實瘧久發不止。寸口脈弦滑。

浮大者。

脈弦爲肝風。滑爲痰。浮爲在表。大爲陽。若脈沉細微澁者。禁用。

不問鬼

瘧食瘧竝皆治之。

常山

酒炒

草菓

煨

檳榔

青皮

厚朴

陳皮

甘草

等分。用酒水各一鍾。煎熟。絲綿蓋之。露

一宿。於當發之早。面東溫服。

經曰。工不治其已發。爲其氣逆也。

成方切用

瘧

卷九上

截瘧七寶飲

去

凡癰將來。可服藥阻其來。將去。可服藥追其去。若癰勢正盛。服藥與之混戰。徒自苦爾。但癰之來。去既遠。藥不相及。五不當一。故服藥妙在將來將去之時。

常山能吐老痰。積飲。檳榔能下食積痰結。草菓能消太陰膏粱之痰。陳皮利氣。厚朴平胃。青皮伐肝。癰爲肝邪。皆爲溫散行痰之品。加甘草入胃佐常山以吐癰痰也。玉機微義曰。此方乃溫脾燥

亦效者。值病人陰陽相并。脾氣鬱結。濁液凝痰。閉塞中脘。因得燥熱。亦以暫開。所以氣通而疾止。若中氣虛弱。內有鬱火之人。復用燥熱。愈劫愈燥。各將誰執。楊仁齋曰。癰有水有血。惟水飲所以作寒熱。惟痰血所以增寒熱。常山能逐水故也。若是血證。當加桃仁五靈脂爲佐。人生薑

審同煎苟無行血之品何以收十全之功耶
命集云。瘧夜發者乃邪氣深遠而入血分爲陰
經有邪。宜加桃仁於桂麻
湯中發散血中之風寒。

滌痰湯

嚴氏

治中風痰迷心竅舌強不能言

心在

舌。心別脈繫舌根脾脈連舌本散舌下腎脈挾
舌本三脈虛則痰涎乘虛閉其脈道故舌不能
轉運言語也若三脈亡血不能榮養而瘖者又
當加補血藥。風痰塞其經絡舌強不能言其
證爲重若壅熱上攻舌
腫不能轉者其證爲輕。

半夏

薑製

膽星

二錢五分

橘紅

枳實

茯苓

錢二

人參

菖蒲

一錢

竹筴

七分

甘草

五分

加薑煎

心脾不足風邪乘之而痰與火塞其經絡故舌

本強而難語也。人參、茯苓、甘草補心益脾而瀉火。陳皮、南星、半夏利氣燥溼而祛痰。菖蒲開竅通心。枳實破痰利膈。竹茹清燥開鬱。使痰火降則經通而舌柔矣。喻嘉言曰：此証最急。此藥最實。用此湯調下牛黃丸。審其屬虛。用此湯調下二丹丸。庶足開痰通竅。一丹丸見祛風門。有風中心脾者。有痰塞心竅者。有風寒壅滯者。致舌本木強。又有氣虛血虛。腎虛及老人暴不能言者。宜十全大補湯加菖蒲遠志。

星香散

治中風痰盛體肥不渴者

膽星

錢八

木香

錢二

爲末服或加全蠍

南星燥痰之品製以牛膽以殺其毒且膽有益

肝膽之功

肝膽之經屬風木

佐以木香取其行氣以利

痰也

木香能疏肝氣和脾氣

肥而不渴宜燥可知加全蠍

者以散肝風也

中風體虛有痰者宜六君子或四君子湯調下此散

牛黃丸

治風癰迷悶涎潮抽掣

風癰或感風寒暑溼或飲食不

節逆於脈氣鬱而生涎閉塞諸經厥而乃成或數日一發或一日數發發則眩仆倒地昏不知

人患癰抽掣口日尚斜或隨脈氣作六畜之聲

膽星

全蠍

去足焙

蟬蛻

二錢五分

牛黃

白附子

殭蠶

洗焙

防風

天麻

錢五分

麝香

分煮棗肉和水

銀五分細研入藥末爲丸荊芥薑湯下

牛黃清心解熱開竅利痰天麻防風南星全蠍

辛散之味殭蠶蟬蛻清化之品白附頭面之藥

去頭面遊風皆能搜肝風而散痰結麝香通竅水銀

劫痰引以薑芥者亦以逐風而行痰也按牛黃丸之方

頗多互有異同然大要在於搜風化痰寧心通

竅多用冰麝牛雄金珠犀珀若中臟者宜之如

中腑中血脈者反能引風入骨此方藥味頗簡故始錄之以藥其餘也

貝母丸 消痰熱潤肺止咳或肺癰肺痿乃治標之妙劑

貝母

一兩

爲末用砂糖或蜜和丸龍眼大或噙

化或嚼服之若欲劫止久嗽每貝母一兩宜加
百藥煎蓬砂天竺黃各一錢五分尤妙如無百
藥煎卽醋炒文蛤一錢亦可或栗殼亦可酌用
若治肺癰宜加白礬一錢同貝母丸服如前法
最妙

清肺飲

治痰溼氣逆而咳嗽

肺受火傷則氣逆而爲咳脾有停溼

則生痰而作嗽病有五臟六腑之殊而其要皆
歸於肺以肺爲五臟華蓋下通膀胱外達皮毛
爲氣之主而出聲也大法新嗽脈浮爲表邪宜
發散脈實爲內熱宜清利脈濡散爲肺虛宜溫

補久嗽曾經解利。以致肺胃俱虛。飲食不進。宜
溫中助胃。兼治嗽藥。素問曰。肺之令人欬。何
也。曰。五臟六腑。俱令人欬。非獨肺也。皮毛者。肺
之合也。皮毛先受邪氣。邪氣以從其合也。五臟
各以其時受病。非其時。各傳以與之。有自外得
者。肺主皮毛。風寒暑溼之邪。自皮毛入。內傳臟
腑。而爲嗽也。有自內發者。七情饑飽。內有所傷。
則邪氣上逆。肺爲氣出入之道。故五臟之邪。上
蒸於肺。而爲嗽也。然風寒暑溼。有不爲嗽者。蓋
所感者重。不畱於皮毛。傷臟腑。而成傷寒。溫
熱諸病。七情亦有不爲嗽者。蓋病尙淺。只在本
臟。未傳入肺。所以傷寒以有嗽爲輕。而七情饑
飽之嗽。必久而後發也。

杏仁

去皮尖

貝母

茯苓

錢桔梗

甘草

五味

子

橘紅

五分

加薑煎火嗽加青黛

蘇海云

食積痰加香附山查枳實溼痰除貝母加半夏
南星燥痰加栝蒌知母天冬午前嗽屬胃火宜
清胃加石膏黃連午後嗽屬陰虛宜滋陰降火
加芍歸芍地知礞二冬竹瀝薑汁傳送黃昏嗽
爲火浮於肺不可用涼藥宜五倍五味訶子斂
而降之勞嗽見血多是肺受熱邪宜加歸芍阿
膠天冬知母款冬紫苑之類久嗽肺虛加參耆
如肺熱用沙參

此治嗽之通劑也杏仁解肌散寒降氣潤燥貝

母清火散結潤肺化痰五味斂肺而寧嗽茯苓
除溼而理脾橘紅行氣甘草和中桔梗清肺利
膈載藥上浮而又能開壅發表也

清氣化痰丸

治熱痰

氣有餘則爲火。液有餘則爲痰。痰隨火而升降。故治

痰者必降其火。治火者必順其氣也。

半夏

薑製膽星

兩半橘紅

枳實

炒

杏仁

去皮尖

栝蒌

仁

去油黃芩

炒

茯苓

兩一

薑汁

糊丸

淡薑湯下

此治痰火之通劑也半夏南星以燥溼氣黃芩
栝蒌以平熱氣陳皮以順裏氣杏仁以降逆氣

枳實以破積氣。茯苓以行水氣。水溼火熱皆生痰之本也。氣之亢而爲火。猶民之反而爲盜。盜平則還爲良民。而復其業矣。火退則還爲正氣。而安其位矣。故化痰必以清氣爲先也。

蘇子降氣湯

局方

治虛陽上攻氣不升降上盛下

虛痰涎壅盛喘嗽嘔血或大便秘不利

肺爲氣主火升尅肺

故氣高痰湧或喘或嗽甚則嘔血也。火炎津枯有升無降故大便秘不利。又有氣痛便秘用通劑而愈不通故暫通復秘。因而下血者亦當順氣氣順則自通。當求溫緩之劑。

蘇子

半夏

前胡

厚朴

薑炒

橘紅

當歸

錢一

甘草

炙

肉桂

分五

加薑煎一方無桂有沉香

蘇子前胡厚朴橘紅半夏皆能降逆上之氣兼

能除痰氣行則痰行也數藥亦能發表既以疏

內壅又以散外寒也

風痰壅盛多挾外感

當歸潤以和血

甘草甘以緩中下虛上盛故又用官桂引火歸

元也

玉機微義曰此散鬱和中之劑準繩口口鼻出血皆由上盛下虛有升無降血隨氣

升法當先順其氣氣降則血歸經矣左蘇子降

氣湯加人參阿膠各一錢下養正丹金石烹煉

多發表破氣動血之藥養正丹金石烹煉

定喘湯

治肺虛感寒氣逆膈熱而作哮喘膈有膠固

之痰外有非時之感則令人哮喘而寒束於表陽氣併於膈中不得泄越故膈熱氣逆聲粗爲哮喘感之有餘也氣促爲喘肺虛而不足也

白菓

三十枚炒黃去殼

麻黃

薑製

款冬花

三錢

桑白皮

蜜蘇

子杏仁

去皮尖

黃芩

錢半

甘草

錢一

半夏

錢三

加薑煎

表寒宜散麻黃杏仁桑皮甘草辛甘發散瀉肺

而解表裏熱宜清款冬溫潤白菓收瀉

善化痰定

喘而清金蘇子降肺氣黃芩清肺熱半夏燥溼

痰以共成散寒疏壅之功也

七氣湯

三因方亦名四七湯

治七情氣鬱痰涎結聚略不

出嚥不下胸滿喘急或咳或喘或攻衝作痛

七情

者喜怒哀憂思悲恐驚也七情之病令人氣結痰聚陰陽不得升降故有痞滿喘咳衝攻等證

半夏

薑汁炒五錢

厚朴

薑汁炒三錢

茯苓

四錢

紫蘇

二錢

加

薑棗煎

氣鬱則痰聚故散鬱必以行氣化痰爲先半夏

辛溫除痰開鬱厚朴苦溫降氣散滿紫蘇辛溫

寬中暢肺定喘消痰茯苓甘淡滲溼益脾通心

交腎痰去氣行則結散鬱解而諸證平矣

加白芍陳皮人參桂心亦名七氣湯治七情

鬱結陰陽反戾吐利交作寒熱眩暈痞滿噎塞

四七湯

局方亦名七氣湯

治七情氣鬱痰涎結聚虛冷

上氣或心腹絞痛或膨脹喘急

針經云胃絡不和喘出於陽明

之上逆真元耗散喘出於腎氣之上奔。

人參

官桂

半夏

錢一分

甘草

痛加延胡索

能行血中氣滯氣中血滯。

李士材曰夫七情過極皆傷其氣丹溪以越鞠

丸主之而此獨異者蓋鬱久則濁氣閉塞而清

氣日薄矣故雖痛雖膨而不用木香枳殼用人

參以壯主氣之臟

肺

官桂以制謀慮之官

肝者將軍

之官謀慮出焉桂能平肝鬱久生痰半夏爲之驅逐鬱故不

和國老爲之調停况桂性辛溫疏氣甚捷鬱結

者還爲和暢矣湯名四七者以四味治七情也

玉機微義曰經云寒則氣收宜辛散之甘緩之此治氣虛寒鬱藥也

白金丸

治癲狂失心

癲多喜笑尙知畏懼證屬不足狂多忿怒人莫能制

證屬有餘此病多因驚憂痰血塞於心痰所致難經云諸陽爲狂諸陰爲癲

白礬

雨鬱金

七

薄荷

糊丸

白礬酸鹹能軟頑痰鬱金苦辛能去惡血痰血

去則心竅開而疾已矣

百花膏

治喘嗽不已或痰中有血虛人尤宜

百合

欵冬花

等分蜜丸龍眼大臨臥薑湯

下或噙化加紫苑百部烏梅名加味百花膏

欵冬瀉熱下氣清血除痰百合潤肺寧心補中

益氣竝爲理嗽要藥

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷九下

殺蟲門

正方一十

烏梅丸

溫臟丸

集効丸

蠟蟲丸

使君子

丸

獺肝丸

掃蟲煎

化蟲丸

消渴殺蟲方

雄檳丸

吳氏醫學述第四種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有榆蒼培同較
有杜雋望

成方切用

殺蟲門

風字從虫蟲風化也。淫熱鬱久則生

殺蟲門

蟲腐草爲螢陳麥爲蛾之類。菓實外

殺蟲門

殼完整蟲生於內。人之腸胃無物不受豈得

殺蟲門

無蟲三尸九道理或有之其猖狂於腸胃爲

殺蟲門

痛爲嘔爲噎爲噎爲噎種種煩苦須仗醫藥自來

殺蟲門

殺蟲之方每多險峻今人腸胃脆薄須兼養

殺蟲門

胃益血理中乃妥至蛔蟲乃人身之常有者

殺蟲門

偶爲食傷或吐或瀉出和中自安不可攻伐

成方切用

卷九十六 烏梅丸

一

味者不知。妄用雷丸使君之類反致傷氣血而疾作矣。

烏梅丸

仲景

治傷寒厥陰證寒厥吐虵

傷寒厥厥者死

者脈微而厥至七八日膚冷發躁無暫安時也。又煩虵聞食臭復出也。此爲臟寒。當自吐虵與烏梅丸溫臟安虵。

咳而嘔嘔甚則長蟲出亦主久痢

烏梅

三百枚

細辛

桂枝

人參

附子

炮

黃蘗

六兩

黃連

一兩

乾薑

兩

川椒

去汗

當歸

酒浸

烏梅一宿去核蒸熟和藥蜜丸

虵得酸則伏故以烏梅之酸伏之虵得苦則安

故以連藥之苦安之。虬因寒而動，故以桂附薑

椒溫其中臟，而以細辛當歸潤其肝腎。人參用

以助脾

吐蛇爲胃寒之故，則成虬厥。宜理中湯加炒川椒五粒，檳榔五分，吞烏梅九粒。

郊倩曰：烏梅丸於辛酸入肝藥中，微加苦寒，納

上逆之陽邪，而順之使下也。雖曰安蛇，實是安

胃，故併主久利。見陰陽不相順接而下利之證，

皆可以此方括之也。經曰：凡陰陽不相順接，

便爲厥。方時行，曰經云：手之三陰從腹走手，手

之三陽從手走頭，足之三陰從頭走足，足之三

陰從足走腹，是三陰二陽俱相接於手足者，

也。陽氣內陷，不與陰氣相順接，故手足逆冷。

溫臟丸

治諸蟲積既逐而復生者，多由臟氣虛

寒，宜溫健脾胃以杜其源。

人參

隨宜用

川椒

去開口者
炒出汗

白芍

酒炒

茯苓

細樵

肉

使君子

煨取肉

檳榔

二兩

白朮

米泔浸炒

當歸

薑

吳茱萸

湯泡一宿一兩

爲末神麴糊丸桐子大

每服五七十九或百丸饑時白湯下

如臍寒

甚者加製附子一二兩

集効丸

三因

治蟲嚙腹痛作止有時或耕起往來

腹痛有作止者蟲嚙則痛不嚙則止也耕起往來者蟲不安其位也

大黃

炒兩半

鶴虱

炒

檳榔

訶子皮

蕪荑

炒木

香

乾薑

炒

附子

七錢五分

蜜丸食前烏梅湯下

婦人醋湯下

蟲喜溫惡酸而畏苦故用薑附之熱以溫之烏梅訶皮之酸以伏之大黃檳榔蕪荑鶴虱之苦以殺之木香辛溫以順其氣也

蠟蟲丸

治諸蟲積腹痛黃瘦等病

蕪荑

雷丸

桃仁

乾茶

炒煙盡

雄黃

微炒

錫灰

皂角

炒煙盡

檳榔

使君子

等分

輕粉

減半

細樅肉

加倍

如蟲積堅固者加巴豆霜與輕粉同湯浸

蒸餅丸綠豆大每服五七分滾白湯下陸續服

之

使君子丸

治蠱脹腹痛及食勞發黃喜食茶米

炭土等物

飲食停滯，墜熱蒸鬱，則生諸蟲。至脹滿，噉痛，或發黃，身腫，喜食生米、茶葉。

土炭者，蠱之所嗜也。

使君子

去殼二兩

南星

薑製，檳榔一兩

右藥合炒如喜

食生米，用麥芽一觔炒，喜食茶葉，用茶葉炒，喜

食炭土，用炭土炒，取藥爲末，蜜丸，每晨砂糖水下。

下

誘之以其與炒以所嗜諸物同意。

獺肝丸

後

治鬼疰傳尸勞瘵

此五疰之一，其證使人寒熱沉沈，默

默不知所苦而無處不惡死後傳人乃至滅門

獺肝

一具須從獺身取下不爾多偽

陰乾爲末滾水服二錢

日三

吳鶴臯曰獺肝治鬼疰此何以故凡物惡人而僻處晝伏而夜出者皆陰類也故假之以治陰疾獨用其肝者肝爲厥陰藏魂之臟也按物之惡人僻處晝伏夜出者狐鼠皆然不獨獺也諸肝皆有葉數唯獺肝一月一葉其間又有退葉獨異於他獸此其所以能治鬼疰也與

掃蟲煎

治諸蟲上攻胸腹作痛

青皮

小茴香

吳茱萸

檳榔

烏藥

一錢五分

細樵肉

三錢

烏梅

二錢

甘草

八分

硃砂

雄黃

五分

細末

將前八味用水一鍾半煎八分去渣隨

入後二味末再煎三四沸攪勻徐徐服之如

惡心作吐加炒乾薑一二錢或先啖牛肉脯少

許俟一茶頃頓服之更妙

化蟲丸

治腸胃諸蟲爲患

所以腸胃之中無物不容

正氣虛衰或誤食生蟲之物或淫熱蒸鬱而成猶物必先腐而後蟲生之義也

鶴虱

胡粉

炒

苦楝根

東引未

檳榔

出土者

燕萸

使君子

錢五

枯礬

二錢五分

爲末亦可麪糊作丸量

人大小服之一歲兒可五分

消渴殺蟲方

夷堅志

治消渴有蟲

苦楝根

取新白皮一握切焙入麝香少許煎

空心服雖困頓不妨取下蟲三四條類虵而色紅其渴乃止

消渴一證有蟲耗其津液而成者蓋飲醇食炙

積成胃熱溼熱生蟲理固有之臨病宜諦審也

雄檳丸

治腹痛胃痛乾痛有時

乾痛者不吐不瀉而但痛也有

時者淡食而饑則痛厚
味而飽則否此爲蟲也。

雄黃 檳榔 白礬 等分飯丸每服五分

雄黃之辛毒檳榔之苦降白礬之酸礪皆殺蟲

之品也故合用以治之

吳鶴皋曰古方殺蟲如雷丸貫衆乾漆蠅塵百

部鉛灰之類皆其所常用者也。有加附子乾薑者壯正氣也。加苦參黃連者蟲得苦而伏也。加烏梅調子者蟲得酸而軟也。加藜蘆瓜蒂者欲其帶蟲吐出也。加芫花黑丑者欲其帶蟲瀉下也。用雄黃川椒蛇牀樟腦水銀檳榔者治瘡疥之蟲也。用胡桐淚葇荑子韭子蟾酥者治齧齒之蟲也。用川極皮海桐皮者治風癰之蟲也。用青箱子覆盆葉者治九竅蠹蝕之蟲也。用敗鼓心桃符板虎骨死人枕獾爪鶴骨者驅勞瘵之蟲也。