

外科選要

下

中國醫學大成第八集

外科叢刊之一
外科類甲

外科選要

下

上海大東書局印行

外科選要

清 崑山 唐 燮芹洲輯著

鄞縣 曹赤電炳章圈校

卷下

經絡

人身之有經絡。猶地理之有界分。治病不知經絡。猶捕盜不知界分。其能無誅伐無過之咎乎。岐黃問答。以經絡爲主。惟經絡一明。然後知症。見何經用何經之藥以治之。了然無謬。如古之善射御者。自有得心應手之妙焉。

陀云。癰疽之作。其行也有處。其主也有歸。如心之發於喉舌。肺之發於皮膚。脾之發於肌肉。肝之發於筋肋。腎之發於骨髓是也。陰毒發於下。陽毒發於上。腑之發於外。臟之發於內。發於下者得之緩。發於上者得之速。感於腑者易治。感於臟者難療。故內曰壞。外曰潰。上曰從。下曰逆。近骨者多冷。久而不愈。化血生蟲。蟲則多癢。少疼。或先癢後疼。近膚者多熱。久而不愈。傳氣成漏。漏則多疼。少癢。或不疼不癢。發於虛處者多險。發於節而相應者不治。應爲內外通價也

十二經補瀉藥品

手少陰心經

補 當歸

生地黃

茯神

遠志

酸棗仁

麥門冬

柏子仁

山藥

蓮肉

圓眼肉

人參

紅藍花

瀉

黃連

枳實

木香

貝母

天竺黃

鬱金

赤茯苓

元胡索

溫

石葛蒲

藿香

沉香

木香

桂枝

麻黃

涼

連翹

丹參

石蓮子

梔子

犀角

牛黃

硃砂

石膏

引經

獨活

細辛

燈心

圓眼

手厥陰心包絡經

補

人參

黃耆

肉桂

沉香

兔絲子

破故紙

瀉

大黃

朴硝

梔子

烏藥

溫

大附子

肉桂

乾薑

沉香

川芎

白豆蔻

柏子仁

烏藥

涼

黃連

梔子

丹皮

柴胡

薄荷

滑石

引經

柴胡

桂佐之

川芎

青皮

手太陽小腸經

補

石斛

牡蠣

甘草梢

瀉

木通

赤茯苓

車前子

紫蘇

羌活

藁本

檳榔

大黃

瞿麥

溫

巴戟天

茴香

烏藥

砂仁

益智仁

涼

滑石

木通

梔子

茅根

車前子

豬苓

澤瀉

芒硝

引經

羌活

藁本

黃柏

足厥陰肝經

補

當歸

熟地黃

酸棗仁

阿膠

木瓜

沙參

薏苡仁

枸杞子

兔絲子

山茱萸

白朮

蓮肉

甘草

蒺藜

瀉

白芍藥

赤芍藥

柴胡

青皮

枳實

青黛

羌活

木賊

甘菊

蒲黃

桃仁

蔓荊子

常山

五靈脂

益母草

前胡

溫

木香

肉桂

香附子

涼

黃連

黃柏

胡黃連

龍膽草

草決明

牛黃

羚羊角

車前子

甘菊花

地榆

引經 川芎 行上

青皮 行下

柴胡

烏梅

足少陽膽經

補 當歸

酸棗仁

山茱萸

五味子

瀉 柴胡

青皮

黃連

白芍藥

川芎

貝母

瓜蒌

鉤藤

天竺黃

溫

乾薑

肉桂

陳皮

半夏

涼

黃連

黃芩

柴胡

竹茹

甘草

引經

川芎行上

青皮行下

柴胡

足太陰脾經

補

人參

白朮

茯苓

甘草

白芍藥

山藥

蓮肉

白扁豆

木瓜

蒺藜

當歸

黃耆

薏苡仁

芡實

陳皮

大棗

圓眼肉

瀉

枳實

大腹皮

山查

麥芽

神麴

半夏

南星

檳榔

三稜

萊菔子

升麻

防風

石膏

猪苓

元胡索

桑寄生

溫

砂仁

白豆蔻

藿香

破故紙

黑乾薑

官桂

大附子

蘇葉

肉果

木瓜

蒼朮

吳茱萸

丁香

涼

黃連

元明粉

竹瀝

連翹

大黃

引經白芍

麻黃

大棗

蓮肉

足陽明胃經

補人參

白朮

黃耆

石斛

山藥

蓮子

芡實

薏苡仁

糯米

白糖

瀉

枳實

厚朴

大腹皮

前胡

三稜

莪朮

檳榔

大黃

石膏

礞石

溫

肉桂

肉果

大附子

砂仁

藿香

半夏

蒼朮

白豆蔻

川芎

香附

乾薑

涼

葛根

知母

石蓮子

梔子

滑石

竹茹

胡黃連

引經 葛根

升麻

白芷

手太陰肺經

補 人參

沙參

黃耆

麥冬

阿膠

五味子

紫苑

百部

知母

款冬花

木瓜

山藥

茯苓

蒺藜

瀉

防風

蘇梗

羌活

前胡

生薑

桑白皮

蘇子

橘紅

石膏

杏仁

貝母

瓜蒌

南星

枳殼

薄荷

白芥子

白芍

元胡索

葶藶

鼠粘子

萊菔子

香薷

荊芥

溫

乾薑

生薑

半夏

白豆蔻

縮砂

木香

藿香

桂枝

香附

麻黃

涼

枯芩

竹葉

竹瀝

童便

羚羊角

馬兜鈴

山梔

天門冬

元參

桔梗

藕節

枇杷葉

元明粉

地骨皮

引經

白芷

升麻

葱白

生薑

手陽明大腸經

補 蓮肉

糯米

白砂糖

薏苡仁

栗殼

木香

肉豆蔻

龍骨

牡蠣

瀉 大黃

芒硝

枳實

桃仁

檳榔

葱白

麻仁

溫 人參

乾薑

半夏

肉桂

吳茱萸

涼 黃芩

槐花

大黃

地榆

胡黃連

連翹

石膏

秦艽

引經 葛根

升麻

白芷

足少陰腎經

補 杜仲

兔絲子

菴藜

破故紙

山茱萸

山藥

石斛

巴戟天

人參

白朮

當歸

熟地

枸杞

五味

牛膝

龜板

淫羊藿

何首烏

鱉甲

鹿茸

鹿角

龍骨

牡蠣

續斷

肉蓯蓉

韭子

覆盆子

瀉

澤瀉

猪苓

知母

元胡索

甘草

茯苓

木通

溫

大附子

桂心

破故紙

黑乾薑

縮砂

仙茅

沉香

涼

黃柏

知母

丹皮

天門冬

地骨皮

山梔

元參

竹瀝

引經

獨活

肉桂

牛膝

鹽

酒

足太陽膀胱經

補

龍骨

續斷

益智仁

橘核

瀉

猪苓

澤瀉

滑石

車前子

木通

瞿麥

茯苓

溫

茴香

烏藥

沉香

山茱萸

桂枝

麻黃

縮砂

涼

膽草

石蓮子

防風

羌活

蔓荊子

茵陳

葶藶

大黃

黃柏

石膏

引經 藁本

羌活

黃柏

手少陽三焦經

補 人參

黃耆

白朮

藿香

瀉 柴胡

枳殼

枳實

青皮

山慈菇

溫 大附子

厚朴

乾薑

沉香

涼 連翹

滑石

膽草

地骨皮

引經 柴胡

川芎

青皮

散口印

凡藥之性輕虛者。諸臟腑皆能發散。是以不屬經絡也。

羌活

獨活

升麻

防風

荊芥

細辛

藁本

麻黃

秦艽

防己

牛蒡子

香薷

夏枯草

山豆根

五靈脂

射干

青蒿

葱白頭

漏蘆

蟬蛻

走品

凡藥之體重濁者。諸臟腑皆能走瀉。是以不屬經絡也。

川烏

草烏

三稜

莪朮

威靈仙

穿山甲

葶藶

海藻

昆布

五加皮

撫芎

常山

青黛

巴豆

益母草

桑寄生

標使治宜

如腫瘍初起。審症處分。必以一藥爲標使。如神授衛生散。用金銀花、當歸、蒼朮、復煎散。用蒼朮、十全大補湯。用夏枯草、蠟礬丸。用菊花湯。通聖散。用漏蘆之類。每用一兩煎湯。復煎羣藥。其應如響。此飛霞子之祕訣也。丹溪云。阿膠飲。牛膠丸。屬金屬土。補肺氣。實大腸。壯胃止瀉。黃蠟丸入大腸有補。國老膏化毒行經。遠志酒。金銀花酒。皆有補性。歸血歸心。善用者以之配入腫瘍之散結。潰瘍之補虛。亦奏捷效。宜觸類而長之可也。又如諸毒生於巔頂者。諸藥俱宜酒浸、酒炒、酒煎、酒服。爲使爲因。所爲在上者。因而越之也。

汗

書云。汗之則瘡已。爲外有六經之形症。內無便溺之阻隔。飲食如故。兩便自調。知不在裏也。左脈洪緩。關脈帶弦。外感客邪也。故宜汗之。使榮衛通。邪氣去矣。如冬月寒。綴腠理。必用辛溫之劑以托之。如托裏溫中湯。紺珠丹之類。又云。助表不以取汗爲功。爲蟾酥硃砂雄黃等解毒之類。乃取汗之峻劑也。又云。瘡家雖身疼痛。不可發汗。汗之則瘳。爲無表症也。卽有表症。然亦不可大汗。大汗則表虛不膿。後必難治。汗出不利小便。汗止則陽氣復。小便自利也。

下

腫瘍時見五寶者。爲邪氣在裏。宜寒涼藥攻利之。如內疎黃連湯之類。次以托裏排膿之藥補之。潰瘍時雖有口乾便閉等症。由內亡津液所致。必脈細而數。口和而乾。食少喜熱。乃虛火也。惟補氣血。養津液。健脾胃。則二便自和。庶無變。

症。如小便閉。雖腫瘍時不必猪苓澤瀉以導水。惟用參耆歸芍。及托裏消毒散。消息之自效。瘡瘍面赤。火鬱也。發之。見風脈風症者。散之。大便燥急者。潤之。鬱冒者。爲昏迷也。俱宜汗之。以上之症。慎不可下。是以瘡瘍惟在閉而不結。通而不瀉爲規。

渴

瘡瘍作渴。不問腫潰。但脈數發熱而渴。用竹葉黃耆湯。脈不數。不發熱。或脈數無力而渴。或口乾。用補中益氣湯。若脈數便秘。用清涼飲。尺脈洪大。按之無力而渴。用加減八味丸。若治口燥舌黃。飲水不歇。此丸尤妙。大法

瘡瘍作渴。若焮痛發熱。便利調和者。上焦熱也。用竹葉石膏湯。腫痛發熱。大便秘澀者。內臟熱也。用四順清涼飲。焮腫痛甚者。熱毒蘊結也。用仙方活命飲。漫腫微痛者。氣血虛壅也。用補中益氣湯。若因胃火消燦。而津液短少者。用竹葉黃耆湯。

若因胃氣虛。而不能生津液者。用補中益氣湯。若因胃氣傷。而內亡津液者。用七味白朮散。若因腎水乾枯作渴。或口舌乾燥者。用加減八味丸。或先口乾作渴。小便頻數。而後患疽。或疽愈後。作渴飲水。或舌黃乾硬。小便數而疽生者。尤惡候也。苟能逆知其因。預服加減八味丸。補中益氣湯。以滋化源。可免後患。薛氏

癰疽發渴。乃氣血兩虛。用參耆以補氣。歸芍以養血。或忍冬丸。黃耆六一湯。丹溪瘡作渴甚急。與神仙追毒丸。取下惡毒。清臚湯。千金漏蘆湯。五香連翹湯。六味車螯散。萬金散。皆可選用。利後仍渴。却用生津補氣藥。津液生。氣血完。渴自止。伍氏大渴而與利藥。非明示脈證。何以知其當下。後言利後仍渴。却用補藥。又不明示脈證。恐是但有大渴。必下。下後尚渴。方與補藥。古人治未病如此。用藥可乎。況渴屬上焦。當腫瘍時。猶或可用。若潰後渴。多因氣血之虛。何待利後方議其虛也。丹

口乾與口渴不同。不宜用丹溪鎮墜。用之其禍如反掌。用桑枝煎。五味湯。以救陰水。精要丹溪曰。此妙方也。而不言食味起火。怒氣生火。房勞激火。吾恐渴亦未易除也。

病疽愈後發渴。多致不救。惟加減八味丸最妙。蓋癰疽多因虛而得。疽安而渴者。服此丸則渴止。安而未渴者。服此丸永不發渴。或未疽而先渴者。服此不惟渴止。疽亦不作。李氏

前證屬腎水枯涸。虛火上炎。口乾作渴。飲水無度。或舌黃作裂。小便頻數。或痰氣上壅。煩躁不寧。或二三年先作渴。飲水。或口舌生瘡。兩足發熱。痰氣上壅。或瘡愈三四年。而口乾作渴。小便頻數。急用前藥。多有復生者。能逆知其因。預服前丸。可免此患。若兼手足厥冷。真陽虛也。宜服八味丸。大凡瘡後審其腎水不足。用加減八味丸。中氣虛弱。用補中益氣湯。氣血虛弱。用十全大補湯。陽氣虛寒。加薑桂。如

不應。用八味丸。薛氏

托裏消毒散加減法

飲冷作渴。熱毒也。加赤小豆知母。如不應。暫用竹葉黃耆湯。善食作渴。胃火也。加石膏山梔天花粉。如不應。暫用竹葉石膏湯。食少體倦作渴。胃氣虛也。去連翹金銀花。加人參白朮。如不應。暫用補中益氣湯。膿多作渴。氣血虛也。去三味。加熟地五味子。如不應。暫用十全大補湯。加五味子麥門冬。口乾舌燥。腎氣虛也。去三味。加熟地山茱萸山藥。如不應。兼六味丸。又不應。佐以補中益氣湯。自汗內熱口乾。胃氣虛也。去三味。加參耆歸朮。如不應。暫用六君子湯。盜汗內熱口乾。陰血虛也。去三味。加熟地麥冬五味子。如不應。暫用當歸六黃湯。

竹葉黃耆湯 治癰疽大渴。發熱或瀉。或小便如淋。薛氏曰。渴乃七惡中之一也。

此方治之。其功甚捷。亦有左手脈浮大而熱。或渴者。宜發散表邪。右手脈沉實而熱。或渴者。宜疎去內邪。若潰後作渴。或小便如淋。或脈大無力者。屬氣血虛也。宜大補氣血。亦有潰後熱不止。或作渴。遂以爲敗證不治。若素有胃火。或胃經熱毒未盡。胃脈尙數者。仍宜服前湯。服而脈反大。熱渴愈作。斯爲敗證。蓋因真氣虛而邪氣實也。今之潰瘍。畏石膏黃芩二藥性冷。多不肯服。若胃脈未靜。非此藥莫能治也。若因循日久。煎熬氣血。膿血愈多。氣血愈虛。反成敗證矣。治者當捨證從脈可也。大抵瘡瘍之證。七惡內見一二惡者。甚爲可畏。虛中見惡證者不治。實證無惡候者自愈。

托裏黃耆湯

薛氏曰。愚用此方。治氣虛作渴甚效。若氣血俱虛。或膿血大泄作渴。或兼發熱者。宜托裏養榮湯。

托裏養榮湯

黃耆六一湯 常服終身可免癰疽。實治渴補虛之要劑也。

七味白朮散 治胃氣虛。或因尅伐。或吐瀉。口乾作渴。飲食少思。

竹葉石膏湯 治癰疽胃火盛。腫痛作渴。

元參散 治癰疽成膿水。不能下食。心煩口乾。煩渴飲水。四肢羸瘦。

葛根散 治癰腫熱盛。口乾煩渴。或時乾嘔。

乾葛飲 治發背作渴。

忍冬丸 治渴疾既愈。預防發疽。先將忍冬草入瓶內。後入無灰酒。微火煨一宿。

取出曬乾。少加甘草。俱爲末。又以所浸餘酒糊丸。如梧桐子大。每服六七十丸。

溫酒下。又治五痔諸癭。

桑枝方。大治口渴。取嫩桑枝細切一升炒。以水三升。煎一升。日服五七劑。更多尤

妙。抱朴子云。療風痺乾燥。臂痛脚氣。四肢拘攣。上氣眩暈。久服補肺消食。利小便。輕身聰明。令人光澤。其功不能盡述。

薛氏曰。桑枝補血氣。生津液。輕身明目。補肺腎之良劑也。

五味子湯 治腎水枯涸。口燥舌乾。

薛氏曰。此方乃六一湯生脈散之複方。滋化源之良劑。若腎水既涸。虛火上炎。而口燥作渴者。須佐以加減入味丸。

加減入味地黄丸

李氏曰。一貴人病疽。未安而渴作。日飲水數升。予用前方。諸醫大笑云。此藥若能止渴。我輩不復業醫矣。仍用木瓜、烏梅、百藥煎等。渴愈甚。不得已用此丸。三日渴止。久服氣血益壯。飲食加倍。

嘔

精要云。嘔逆有二證。一證爲初發不曾服內托散。伏熱在心。一證爲氣虛脾氣不正。其伏熱在心者。與內托散三兩貼。氣虛者宜嘉禾散。有寒熱宜正氣散。兼與山藥丸以補腎。丹溪曰。諸逆衝上嘔噦。皆屬於火。內托散性涼。故有降火之理。若嘉禾散。補力已少。徒溫煖以助火耳。山藥丸補腎以壯下焦之陰。粗爲近理。然治嘔須分先後。腫瘍時當作毒氣上攻治之。潰瘍後當作陰虛治之。若年老因疽潰後。嘔逆不食者。宜參朮膏峻補取效。佐使藥隨時隨證加減。恐用山藥丸。緩急未易得力。河間謂瘡瘍嘔者。溼氣侵胃也。藥中宜倍加白朮。瘡瘍作嘔。不可泥於毒氣內攻。而概用敗毒等藥。如熱甚。噤痛。邪氣實也。仙方活命飲解之。作膿。噤痛。胃氣虛也。托裏消毒散補之。膿熟脹痛。氣血虛也。先用托裏散。後用針以泄之。噤痛便秘。熱蘊於內也。內疎黃連湯導之。若因寒藥傷胃而嘔者。托裏健中湯。胃寒少食而嘔者。托裏益中湯。中虛寒溼而嘔者。托裏溫中湯。肝

木乘脾土而嘔者。托裏抑青湯。胃脘停痰而嘔者。托裏清中湯。脾虛自病而嘔者。托裏益黃湯。鬱結傷脾而嘔者。托裏越鞠湯。若不詳究其源。而妄用攻毒之藥。則腫者不能潰。潰者不能斂矣。薛氏 丹溪雖云。腫瘍當作毒氣攻心治之。潰瘍當作陰虛治之。亦大概之言耳。今之熱毒內攻而嘔者寡。脾胃虛寒而嘔者多。豈可膠柱而鼓瑟哉。又曰。欲嘔作嘔。或外搽內服寒涼。或痛甚。或感寒邪穢氣而嘔。皆胃氣虛也。托裏消毒散。去三味。加藿香。倍參朮。三味白銀芷連翹花熱盛脈數。精要與漏

蘆湯。單煮大黃湯等。若不甚熱。脈緩弱。只投五香連翹多。熱盛脈數。去死已近。豈湯。丹溪曰。熱盛脈數。若腫瘍時。臟腑祕而體實者。猶可與也。若潰瘍膿血出可下乎。緩弱之脈。古人皆以爲邪毒已散。五香之飛走升散。其可用乎。準上

瘡瘍作嘔。不問已潰未潰。惟以脈實而數。喜飲冷者。爲毒氣內攻。下之。脈弱而喜溫者。爲陽氣不足。補之。大成

痛

夫瘡瘍之證候不同。寒熱虛實。皆能爲痛。止痛之法。殊非一端。世人皆謂乳沒可以止痛。殊不知因病制宜。自有活法。故因熱而痛者。以寒涼之劑折其熱。則痛自止也。因寒而痛者。以溫熱之藥熨其寒。則痛自除也。因風而痛者。除其風。因溼而痛者。除其溼。燥而痛者。潤之。塞而痛者。通之。虛而痛者。補之。實而痛者。瀉之。膿鬱而閉者。開之。惡肉浸潰者。引之。陰陽不和者。調之。經絡滯澀者。利之。憂愁者。遠志酒飲之。虛寒而痛者。乳香沒藥止之。大抵癰疽不可不痛。不可大痛。若大痛悶亂者危。

薛新甫云。瘡瘍之作。由六淫七情所傷。其痛也。因氣血凝滯所致。假如熱毒在內。便秘而作痛者。內疎黃連湯導之。熱毒熾盛。焮腫而作痛者。黃連解毒散治之。不應。仙方活命飲解之。瘀血凝滯而作痛者。乳香定痛散和之。作膿而痛者。

托裏消毒散排之。膿脹而痛者針之。膿潰而痛者補之。若因氣虛而痛。四君加歸耆。血虛而痛。四物加參耆。腎虛而痛。六味地黃丸。口乾作渴。小便頻數者。加減八味丸。此皆止痛之法也。

托裏消毒散加減法

若高腫焮痛。熱毒也。加黃連。漫腫微痛。氣虛也。去金銀花連翹。加參朮。腫赤作痛。血凝滯也。加乳香沒藥。如不應。暫用仙方活命飲。膿出反痛。氣血虛也。去金銀花連翹白芷。加參耆歸地。漫腫不痛。或肉死不潰。脾氣虛也。去三味。加人參白朮。如不應。加薑桂。更不應。急加附子。準繩三味金銀花連翹白芷寒熱虛實。皆能爲痛。止痛之法。殊非一端。隨症施之。其痛自止。不必拘拘於乳沒也。又瘡瘍不可不痛。不痛爲胃氣虛極也。不治。不可大痛。兼煩悶者。不治。再麻

癢者更爲惡候。大成

出血

瘡瘍出血。因五臟之氣虧損。虛火而錯經妄行也。當求其經。審其因而治之。若肝熱而血妄行者。四物炒山梔丹皮苓朮。肝虛而不能藏血者。六味地黃丸。心虛而不能主血者。四物炒連丹皮苓朮。脾虛熱而不能統血者。四君炒梔丹皮。若脾經鬱結。用歸脾湯加五味子。脾肺氣虛。用補中益氣加五味子。氣血俱虛。用十全大補湯。陰火動。用六味丸加五味子。大凡失血過多。見煩熱發渴等證。勿論其脈。急用獨參湯以補氣。經云。血生於氣。苟非參耆歸朮甘溫等劑。以生心肝之血。決不能愈。若發熱脈大者不治。凡患血症。皆當以犀角地黃湯爲主。

芹洲氏云失血症有瘀者寒涼慎用

僵肉

治背瘡肉長疾。皮不及裏。見風卽成僵。以寒水石燒研。爲細末敷瘡上。再用銅綠細末上之。肉卽不作僵矣。梅

瘡癰急牽陰入腹

古方療惡瘡癰腫。或連陰髀間疼痛急攣。牽入小腹不可忍。一宿則殺人。用茴香苗葉。搗取汁一升服之。日三四。用其滓以貼腫上。冬月根亦可用。此外國方。永嘉以來用之。起死神效。圖經

寒熱

身熱而欲衣者。熱在皮毛。寒在骨髓。溫之。身不熱而欲去衣者。寒在皮毛。熱在骨髓。清之。

飲食

腫時不食。爲痛傷胃氣。潰後痛止。自能食也。垣云。瘡瘍食肉。反補胃氣。乃自棄也。此禁之膏梁丹石之變。非藜藿及虛弱者之通論也。若脾胃弱者。卽有所禁忌。亦當少與之。不與則逆其胃氣。反不思食。禁忌之要在生冷傷脾。硬物難化。肥膩滑腸。惟宜斟酌與之可也。又服藥後。忌飲冷水。犯之效遲。膿必再作。

藥忌

用藥之法。如執權衡。若大勢已退。仍用悍霸之藥。爲誅伐無過。失內經之旨矣。如敗毒散。有表症者宜之。多則損氣。流氣飲。氣結胸滿者宜之。多則敗血。內補十宣散。在冬月可助內托之功。能移深居淺。然燥榮瀉衛之藥太多。在夏月及虛之甚者勿用。五香散腫瘍時用之。似有暢達之理。潰瘍時用之。則犯重虛之戒。護心散能解丹石之毒。若不因此。及老年病深症。僊者禁用。蟾酥等丸。皆有砒礪之輩。乃取汗之峻劑也。治初起寒熱拘急。疼痛脈沉細者。爲

毒氣內陷者宜用。若身熱脈洪。及已潰者。禁與。玉樞丹爲下毒之藥。無取膿之功。而體虛者已成者。勿用。垣云。一經受病。止責其一經。不可干擾餘經。如流氣飲通行十二經。則諸經皆爲所損矣。禁之。

辨舌

舌紅溼潤如常者吉。青黃赤白黑胎者重。乾燥碎裂疼痛者死。

內陷

始則高腫。至十數日內外。忽平塌者。此內攻之候也。急宜托裏。

生肌

肌肉者。脾胃之所主。收斂遲速。由氣血之盛衰。惟補脾胃。此內治也。瘀腐不盡。不可以生肌。如驟用生肌。反增潰爛。務令毒盡。則肌自生。加生肌藥。此外治也。如肌生如榴子紅艷。或有白膜爲善。若肌白而平。且無紋理。或膿清氣穢。爲毒

連五臟。氣血枯竭也。危。

驗膜

潰瘍驗膜。用軟薄綿紙封瘡口。令患者用意呼吸之。紙不動者。未透膜也。忌用噴法。恐鼓破膜不救。

陽症變陰

陽症變而爲陰者。草醫涼藥之過也。於十一日之前未有膿時。投溫中健脾之藥。如不應。爲純陰不治。至十五日之後。已出膿時。投托裏溫中湯。及十二味異功散。輕者十全大補湯。倍加參耆桂附以救之。須得瘡熱作痛膿出。食進身溫。脈起爲吉。所爲原本於陽者。故生。

陰症變陽

陰症變而爲陽者。大方熱藥之驟也。雖得微腫微紅。微痛微膿。終不似真陽紅。

活。亦不得稠厚黃膿。其瘡不久復歸陰矣。所爲原本於陰者。故死。

潰瘍外治附

腫瘍針口治法

腫瘍初潰。或已開針。恐針口易合。隨用綿紙撚蘸元珠膏插之。或用黃蠟化開。入香油少許。作撚如釘。須裹線一條爲心。將蠟撚插入針口內。留線頭在外。以膏蓋之。次日換插如前。

瘡口去腐肉法

瘡口腐肉不出者。用綿紙做撚。取撚毛頭於腐上絞之。絞住瘀肉。徐徐拔出。如未淨。再取之。次塗元珠膏。如腐已淨。塗絳珠膏。四圍腫處。貼紺珠膏。瘀膿壅腫不出。搗大蒜調松香末敷之。

瘡潰口中有黑疔治法

瘡已潰爛。中有黑疔。突兀如筋頭。堅痛不可忍者。用紫絳真香剉豆大。炒焦黑爲末。摻疔上。其四圍潰處。用蘭雪散摻之。黑膏蓋之。三二次。則疔盡去。次換生肌藥。

頑肉不去治法

頑腐不去。壯實者。用生南星末。加冰片摻之。膏蓋過宿。去腐如井。隨換生肌等藥。虛弱者。用人參末摻之。過宿洗之。三二次。腐肉自脫。且易收斂。

瘡口努肉治法

瘡口努出如蛇頭者有四。著風、著水、著怒、著手擠。皆能致之。風邪乘襲者。補中益氣湯。加防風天麻。風寒凝滯者。十宣散。加羌活天麻。肝火血燥生風者。加味逍遙散。加羌活天麻。如小兒其母肝火生風者。加味小柴胡湯。次用加

味逍遙散。加漏蘆天麻。更外兼熨法。或用烏梅煨存性。加輕粉少許。摻之。卽收。有翻花如石榴者。用銀針於珠上刺去黑血。三五次卽收平復。

瘡不生肌治法

頑瘡、疔瘡、臙瘡、杖瘡。久不生肌者。瘡有膜也。用玉簪花根於石臼內杵爛敷之。紫緊。三日一換。五七次而愈。

瘡不收口

瘡不收口。因於虛者。須大補之。外用人參珍珠等分爲末。摻之卽痂。凡生肌藥必用人參湯浸過晒乾。再用人乳浸過。其功始捷。

瘡口皮嫩

瘡雖收口而皮嫩。外惡風寒者。用小米煮飯。乘熱盛碗內。以絹帛罩之。覆於患處蒸之。三五次愈。

瘡潰誤入毒水

瘡潰時。誤入毒水。或誤入刺至骨。腫痛者。用皂角子七箇。大乾蝦蟆一箇。胡椒十五粒。入鍋內瓦蓋。文火煅。烟盡取出爲末。先用溫水洗淨。拭乾摻之。膏蓋良久。毒水盡出。有刺者自見。一用黃丹蛤粉等分。炒變色摻之。誤入一切毒水。及皂角水。驢馬尿糞。以致疼痛者。用糯米粉砂糖各三兩。生甘草一分。爲膏貼之。毒水自出。

馬汗入瘡

馬汗入瘡。腫痛者。用馬鞭子。取手執處。燒灰存性爲末。和諸膏塗之。或猪脂和塗。或用冬瓜皮陰乾爲末敷之。

張景岳云。凡癰毒。焮腫赤痛甚者。雖內治之法已具。然煎劑功緩。而急痛難當者。必須外用敷藥。既欲止其痛。又欲散其毒。則無如降癰散之神妙也。

降癰散

景岳新方

治癰疽諸毒。消腫止痛散毒。未成者即消。已成者斂毒速潰可愈。

若陽毒熾盛而疼痛。勢凶者宜先用此方。其解毒散毒之功。神效最速。若堅頑深固者。宜用後方。

薄

荷辛者佳用葉

野菊花連根葉各一握

土貝母半握

茅根一握

右乾者可爲末。鮮者可搗爛。同貝母研勻。外將茅根煎濃湯。去渣用。調前末。乘熱敷患處。仍留前剩湯頓煖。不時潤於藥上。但不可用冷湯。冷則不散不行。反能爲痛。約敷半日。即宜換之。真妙方也。後方。凡疽毒堅頑深固。及結核痰滯。宜用此方。

薄

荷倍信用

半南星

土貝母

朴硝各等分

石

灰風化者亦倍信用之

右同爲末。用鹽溲調杵稠粘。敷患處。經宿乾即易之。不必留頭。若膿成者。留頭

亦可。或炒熱攤絹上。隔絹貼之亦可。或用麻油調。或用熱茅根湯調亦可。若欲止痛速效。加麝香或冰片少許。更妙。

芹洲氏云。古方治疔瘡。俱用野菊花。余每治類疔毒瘡。單用野菊花。內服外敷。甚效。陰寒症忌之。益母膏活血散瘀效。

用針勿忌尻神

立齋曰。針灸之法。有太乙人神周身血忌。逐年尻神。逐日人神。而其穴有禁針禁灸之論。犯者其病難瘳。理固然也。但瘡瘍氣血已傷。肌肉已壞。急宜迎而奪之。順而取之。非平人針灸之比。何忌之有。外科精義云。瘡瘍之症。毒氣無從而解。膿瘀無從而泄。反攻於內。內既消敗。欲望其生。豈可得乎。危惡之證。發於致命之處。禍在反掌。腹癰囊癰。二便不通。胸腹脹悶。昏疔喉痺。咽喉腫塞。其禍尤速。患者審之。

薛氏治鄰人手指患疔。麻癢寒熱惡心。左半體皆麻。脈數。用奪命丹不應。又用解毒之劑。麻癢始去。乃作腫痛。欲針而值尻神。病家不從。愈腫。強針之。諸證頓退。又用解毒之劑而愈。

油紙法

一用天麻子仁數粒。鉛粉錢許。研爛入桐油碗許。打勻。棉花蘸刷令遍。與不油紙相間。鋪之壓之。須頻揭換不粘。一以生桐油熟猪油平兌。如法油紙。

外科選要 卷下 油紙法

外科選要

清 崑山 唐 巽 芹洲 輯 著

鄞縣 曹赤電 炳章 圈校

補遺方

竹葉黃耆湯 見心法腫潰門

托裏黃耆湯

黃耆 六錢

甘草 炙

栝樓根 各一錢

水二鍾煎八分頻服之。加人參一錢尤妙。

托裏養榮湯

人參

黃耆炙

當歸酒拌

芍藥炒

熟地黃

麥門冬去心

川芎

白朮各一錢

五味子研

炙甘草各五分

水二鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食遠服。

黃耆六一湯

綿黃耆六兩用淡鹽水
燂飯上蒸焙乾

甘草生一兩半炙

每剉一兩。水二鍾。煎八分。食遠服。

或爲細末。每服二錢。早晨日午。白湯調服。

或加人參尤妙。

七味白朮散

白朮

茯苓去皮

人參各七錢

甘草一兩五錢炙

木香二錢五分

藿香葉

葛根半兩

右爲細末。每服三五錢。白湯調下。

竹葉石膏湯

淡竹葉

石膏

桔梗

木通

薄荷

甘草炙

右薑水煎服。

元參散

元參

黃連去鬚

土瓜根

麥門冬去心

赤芍藥

白芍皮各一兩

升麻七錢五分

火麻仁

川朴硝

川大黃各一兩剉炒

右剉。每服三錢。水一盞。入生地黃一錢細切。同煎。至六分。不拘時服。

葛根散

葛根

黃耆

升麻

麥門冬

瓜蒌根

赤芍藥

梔子仁

生地黄各一兩

黃芩七錢半

甘草半兩

右剉。每服四錢。水一鍾。盞煎六分。去滓。無時溫服。

乾葛飲

黃芩

朴硝各一兩二錢半

乾葛一兩

右剉散。每服三錢。用枇杷葉去背上白毛。淨洗同煎。不拘時服。

五味子湯

黃耆三錢蜜炙

人參二兩

五味子

麥門冬各一兩去心

粉甘草五錢炙

每服五錢。水煎。日夜服五七劑。

加減八味地黃丸

熟地黃蒸八兩

乾山藥

山茱萸肉

五味子各四兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉各三兩酒浸蒸焙肉桂二兩

右各另爲末。入地黃和勻。加煉蜜丸。如梧桐子大。每服七八十九。空心食前白湯下。

橘半胃苓湯

橘紅

半夏各一錢薑製

蒼朮米泔浸炒

白朮炒

厚朴薑製

甘草炙

茯苓

人參

澤瀉

茅根各二錢薑汁數匙

水二鍾。煎一鍾。入薑汁。一二沸。作十餘次飲之。

加減托裏消毒散

胃氣虛者。去白芷連翹金銀花。加參朮藿香。

托裏健中湯

人參

白朮

茯苓錢各二

半夏

炮薑錢各一

炙甘草五分

黃耆錢各五分

肉桂三分

右薑棗。水煎服。

托裏益中湯

人參

白朮

陳皮

半夏

茯苓

炮薑錢各一

木香

炙甘草錢各五

右薑棗。水煎服。

托裏抑青湯

人參

白朮

茯苓

半夏錢各一

芍藥

柴胡

甘草各五分

陳皮一錢

右薑棗。水煎服。

托裏清中湯

人參

白朮

陳皮

茯苓各一錢

半夏八分

桔梗七分

甘草五分

右薑棗。水煎服。

托裏益黃湯

人參

白朮

陳皮

茯苓

半夏各一錢

丁香

甘草炙

炮薑各五分

右薑棗。水煎服。

托裏越鞠湯

人參

白朮各二錢

陳皮

半夏各一錢

山梔

川芎

香附米

蒼朮各七分

炙甘草五分

右薑棗水煎服。

人參理中湯

白朮

人參

乾薑

甘草各等分炙

右薑棗水煎服。

加味解毒湯

黃耆炒鹽水拌

黃連炒

黃芩炒

黃蘗炒

連翹

當歸各七分酒拌

甘草炙

白芍藥

梔子仁各一錢炒

作一劑。水二鍾。煎七分服之。藥下痛即止。

內補黃耆湯

見心法腫痛門

當歸和血散

當歸二錢

乳香半錢

沒藥半錢

白芍藥三錢

右爲細末。每服一錢。水一盞。煎七分。和滓溫服。

迴瘡金銀花散

金銀花

連枝葉俱用剉研二兩

黃耆四兩

甘草一兩

右咬咀。用酒一升。同入壺瓶內。閉口。重湯煮三兩時辰。取出去滓。頓服之。又一方。無黃耆。

郭氏定痛托裏散

栗殼二兩

去炒

當歸

白芍藥

川芎各五錢

乳香

沒藥

桂枝各三錢

右咬咀。每服五錢。水煎。

乳香止痛散

栗殼六兩製

白芷三兩

陳皮

甘草炙各兩半

乳香

沒藥各一兩

丁香五錢

右咬咀。每服三錢。水一盞半煎。

乳香黃耆散見心法腫續門

人參內托散

人參

黃耆

當歸

川芎

厚朴

防風

桔梗

白芷

官桂

紫草

木香

甘草

右入糯米一撮。水煎服。

乳香丸

乳香另研

沒藥另研

羌活

五靈脂各三錢

當歸

真萊豆粉

交趾桂各兩半

獨活三錢

川芎

川白芷

白膠香各兩半

右爲細末。煉蜜丸。如彈子大。每服一九。細嚼。薄荷湯送下。手足損痛。不能起者。加草烏。用木瓜鹽湯送下。

乳香定痛散

乳香

沒藥各五錢

寒水石

滑石各一兩

冰片一錢

右爲細末。擦患處。痛卽止。

豆豉餅見心法首卷

乳香膏

乳香一兩另研

食鹽

松脂

杏仁去皮尖研各一兩半

生地取汁三合

白羊腎脂半斤黃蠟三兩

右先熬脂令沸。下杏仁地黃汁蠟煎。候蠟鎔盡。入香鹽松枝煎。以柳箆攪令勻。稀稠得所。磁盒盛。

又乳香膏

木鱉子去殼細剉

當歸各一兩

柳枝二八寸剉同以清油煎令黑色次用後藥

乳香

沒藥各半兩

白膠香明淨者四兩同研細入油煎化用棉子濾之

右煉藥鐵銚令極淨。再傾前藥油蠟在內。候溫入黃丹一兩半。以兩柳枝攪極得所。再上火煎。不住手攪。候油沸起。住攪。注在水中。成珠不散爲度。秋冬欲軟。

春夏欲堅。傾在水中出火毒。搜成劑收之。

東垣聖愈湯

熟地

生地各三錢

歸身錢半

川芎二錢

黃耆五分

人參三分

右咬咀。都作一服。水一盞半。煎至一盞。去滓稍熱服。無時。

濟生犀角地黄丸

犀角鎊末

生地

赤芍

牡丹皮各錢半

升麻

黃芩各一錢炒

右水煎熟。入犀角末服。

獨參湯見心法腫瀆門

托裏消毒散加減法

膿多帶赤。血虛也。去金銀花、連翹、白芷。加歸、地、參、朮。如不應。用八珍湯。加牡丹皮。

內消沃雪湯

治發背。並五臟內癰。尻臀諸腫。大小腸癰。肛門臟毒。初起但未出膿。堅硬疼痛。不可忍者並服。

青皮

川山甲

貝母

陳皮

連翹

白芍

乳香

沒藥

黃耆

甘草節

白芷

射干

天花粉

金銀花

皂角刺各八分

木香四分

當歸

大黃各二錢

水酒各一碗。煎八分。量病上下。食前後服之。

二蛟散

治生冷惱怒傷脾。致胸膈不寬。小水不利。面目四肢浮腫。諸藥不效。用三年老黃米炒焦黃色爲末。提淨芒硝三兩。鍋內鎔化。炒乾爲末。每料一平杯和勻。再碾極細。大人壯實者。每服三錢。小兒十歲上下者。一錢二分。俱赤砂糖三茶匙。和白滾水半茶鍾。空心調服。至午大便一次。至晚便一次。其疾先從眼胞消起。日久元氣虛者。與加味胃苓湯。間服。至重者不過五服愈。

解毒木通湯

治男婦房術。熱藥所傷。致玉莖陰戶癢痛。小水澀痛。白濁滑精。至夜陽物興舉。不得眠者服之。

木通

黃連

龍膽草

瞿麥

滑石

山梔

黃柏

知母各一錢

蘆薈

甘草各五分

水二鍾。燈心二根。煎八分。食前服。

天漿散

治腦疽積毒日深。堅腫木痛。口燥舌乾。惡心煩渴。六脈沉實有力。大便閉結不通者。並宜服之。

石決明生研

僵蠶

川山甲土炒

防風

連翹

羌活

乳香

金銀花

黃連

歸尾各一錢

大黃三錢

天花粉

新鮮未晒者四兩。石臼內搗爛。投水一碗。攪勻。絞去渣用。

右花粉淨汁一碗半。同藥煎至八分。入酒一杯。空心熱服。行過三次。方用飲食。忌食煎炒發物。

黃耆湯

治溼熱腿內近膝股患癰。或附骨癰。初起腫痛。此太陽厥陰之分也。脈細而弦。按之洪緩有力。

黃耆鹽水拌炒

當歸

柴胡

木瓜

連翹各一錢

羌活

肉桂

生地黄

黃柏各五分

水酒各一鍾。煎一半。空心熱服。

獨參湯

治潰瘍膿水出多。血氣虛極。或惡寒。或自汗。冷汗。手足指甲青冷。或身涼脈細。並宜。

人參二兩切片

作二劑。水二鍾。棗十枚。煎一鍾。徐徐服之。若煎至稠厚。卽爲膏矣。作三次。用好溫酒化服亦可。

神應異功散

治潰瘍陰盛陽虛。發熱作渴。手足並冷。脈虛無力。大便自利。至飲沸湯而不知其熱者。必服之。

木香

官桂

當歸

人參

茯苓

陳皮

白朮錢各一

半夏

丁香

肉豆蔻

附子

厚朴各五分

水二鍾。薑五片。棗三枚。煎八分。不拘時服。此方癰疽陰症。凡雜症陽氣脫陷。與寒氣逼陽於外者。發熱煩燥。口乾作渴。投以薑桂附子之類。津液頓生。煩熱頓退。其應如響。人但不習而察之。

參朮膏

治癰疽發背等症。大膿後氣血大虛。急宜用此。

上好人參

半劬切片用水五大碗銀鍋內慢火熬至三碗將渣再煎汁一碗共用蜜糊濾清復熬至厚磁碗內收貯聽用

雲片白朮 六兩

懷慶熟地 六兩俱蒸同上法

以上三膏。各熬完畢。各用磁碗盛之。頓入水中。待冷取起。蓋勿泄氣。如患者精神短少。懶於言動。短氣自汗者。以人參膏三匙。白朮膏二匙。地黃膏二匙。俱用無灰好酒一杯。頓熱化服。如脾氣虛弱。飲食減少。或飲食不化者。用白朮膏三匙。人參膏二匙。地黃膏一匙。好熟酒化服。如患者腰膝酸軟。腿脚無力。皮膚手足羸瘦枯槁者。用地黃膏三匙。人參白朮膏各三匙。化服。如氣血脾胃相等。無偏勝負者。三膏每各二匙。熱酒化服。此膏用於清晨。並臨睡時。各進一次。自然強健。精神頓生。氣血新肉易生。瘡口易合。若瘡危險。勢大膿多者。可保終無變。

症。夏天炎熱。恐膏易變。分作二次熬用亦好。愈後能服。鬚髮變黑。返老還童。
清咽利膈湯

治積熱。咽喉腫痛。痰涎壅盛。及乳蛾喉痺。喉癰重舌。或胸膈不利。煩躁飲冷。大便秘結等症。

連翹

黃芩

甘草

桔梗

荊芥

防風

黨參各一錢

大黃

朴硝各二錢

水二鍾。煎八分。食遠服。

人參五味湯

治氣血勞傷。咳膿。或咯血。寒熱往來。羸瘦困乏。一切虛損之症。並效。

人參

五味子

前胡

陳皮

白朮

桔梗

當歸

茯苓

熟地

甘草各一錢

黃耆

地骨皮

桑白皮

枳殼

柴胡各五分

水二鍾。薑三片。煎八分。食後服。

人中白散

治小兒口疳走馬疳。及牙齦腐爛黑臭者。極效。

人中白

溺壺者佳
煨紅二兩

孩兒茶一兩

黃柏

薄荷

青黛

各末
六錢

冰片五分

共研極細。先用溫湯漱淨。吹藥疳上。日用六七次。藥涎從外流爲吉。內收涎毒

入裏爲凶。

珍珠散

治下疳皮損腐爛。痛極難忍。及諸瘡新肉已滿。不能生皮。又湯潑火燒。皮損肉爛。疼痛不止者。

青釭花

五分如無用頭刀釭花輕虛色翠者代之終不及釭花爲妙

珍珠

一錢不拘大小以新白爲上真輕粉一兩入豆腐內煮數滾研爲極細

右三味共研千轉。細如飛麵。方入罐收貯。凡下疳初起。皮損搽之卽愈。腐爛疼痛者。甘草湯洗淨。猪脊髓調搽。如諸瘡不生皮者。用此乾搽。卽可生皮。又婦人陰蝕瘡。或新嫁內傷痛甚者。亦用此搽極效。湯潑火燒痛甚者。用紅膏調搽之。普濟消毒飲

治疫癘憎寒壯熱。頭面腫盛。目不能開。上喘咽喉不利。口乾舌燥。俗云大頭瘟病。諸藥不效。元泰和二年。東垣製以濟人。活甚衆。時人皆曰天方。

黃芩

酒炒

黃連

五錢各

人參

三錢

橘紅

元參

生甘草

桔梗

柴

胡

錢各二

薄荷葉

連翹

牛蒡子

馬屁勃

錢各一

白殭蠶炒

升

麻各七分

右爲細末。半用湯調。時時服之。半用蜜丸。噙化服盡良愈。或加

防風

川芎

當歸

薄荷

細辛

水二鍾。煎一鍾。食遠稍熱服。如大便鞭。加酒蒸大黃一二錢以利之。或熱腫甚者。以針砭刺出血。

六和湯

治夏秋暑溼傷脾。或飲冷乘風。多食瓜果。以致客寒犯胃。食留不化。遂成痞膈。霍亂嘔吐。及廣南夏月瘴疾。寒熱等證。

半夏

人參

炙甘草

砂仁

杏仁錢各一

赤茯苓

扁豆

藿香

木瓜錢各二

右咬咀。每服五錢。水二鍾。生薑三片。棗二枚。煎溫服。一方有白朮、香薷、厚朴、各一錢。名六和半夏湯。

嘉禾散一名穀神散

治脾胃不和。胸膈痞悶。氣逆生痰。不進飲食。五膈五噎。

白茯苓

砂仁

薏仁炒

枇杷葉去毛

桑白皮炒

沉香磨汁

五味子

白豆蔻

炙甘草

丁香

人參

白朮各五分

木香磨汁

青皮

陳皮

杜仲薑汁炒

穀芽炒

藿香

大腹皮洗

石斛酒炒

半夏麴炒

神麴炒

隨風子

檳榔各三分

右水二鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食遠服。五噎入柿乾一個。膈氣吐逆。入韭白三寸。棗五枚同煎。

遠志酒 能托散諸毒。治女人乳癰尤效。

遠志 不拘多少。用米泔浸洗。槌去心。

右爲末。每服三錢。用好酒一鍾調。少頃澄清飲之。以滓敷患處。

替針丸

治膿成不潰者。

白丁香

硃砂另研

真沒藥

乳香各一匙

糯米卽紅米四十粒。先以礬灰拳大一塊。置磁碗內。量入井水。待熱氣將息。以米

排入灰中良久。候米如水晶狀。取去用之。如米未就。再用灰製。右各另爲末。然後和勻收貯。用時以飯丸麥粒大。每用一粒。水溼粘瘡頭上。其膿自出。凡瘡瘍血氣壯實。膿成不潰者。宜用此藥以洩其毒。則肌肉易生。瘡口易斂。若氣血虧損者。須用甘溫之劑。以培根本。否則不惟不潰。且難收斂。若附骨疽及緊要之地。當及時針砭爲善。

漏蘆湯

治腦疽癰疽。毒盛實者。

漏蘆

黃耆

甘草

連翹

沉香

各五錢

大黃

一兩微炒

右每服四五錢。薑棗水煎服。

破棺丹

治瘡瘍熱極汗多。大渴便秘。譫語發狂。

大

黃生三兩半半熟

芒硝

甘

草各二兩

右爲末。煉蜜九。彈子大。每服一九。童便酒化下。白湯亦可。

萬金散 一名內托散

治癰疽已潰未潰者。有消毒破血之功。

栝

樓一個碎

沒藥一錢研

大甘草節二錢

右酒二碗。煎去一碗。後入沒藥服。

牛膠散

治癰疽。使毒不內攻。不傳惡證。有益無損。

牛皮膠

廣中明者四兩

右用酒一碗。重湯煮化。加酒服至醉。不能飲者加白湯。

會膿散

治惡毒便毒初起妙方。

白芷

僵蠶炒

川山甲煨各二錢

大黃四錢

乳香

沒藥各一錢

右爲末，以當歸四錢用酒水各二鍾煎一鍾去渣。量人強弱或全用或一半調服之。此藥若嫌太多則咬咀爲飲。大黃生加煎服之尤妙。

生脈散

治瘡瘍胃氣虧損。陰火上衝。口乾喘促。或肢體倦怠。肌肉消瘦。面色痿黃。汲汲短氣。汗出不止。食少作渴。或膿水出多。氣血俱虛。煩躁不安。睡臥不寧。或溼熱大行。火土合病。脾胃虛弱。身重氣短。或金爲火制。絕寒水生。生化之源。肢體痿軟。脚欹眼黑等症。

人參五錢

五味子

麥冬各二錢

水煎服。

香連丸

治熱瀉痢疾。赤白膿血。溼熱侵脾。裏急後重。

黃連淨十兩

切如豆粒。用淨吳茱萸五兩。二味用熱水拌和。入磁罐內。置熱湯中。頓一日。炒至黃連紫色爲度。去茱萸不用。

木香

每製淨黃連一兩。木香二錢半。

右爲末。醋糊丸。桐子大。每服七十九。食前空心米飲下。

滋腎丸

降腎火。桂與火邪同體。此寒熱用法也。凡不渴者。病在下焦。宜用之。夏方云。或腎虛足熱。小便不利。肚腹腫脹。皮膚脹裂。眼睛突出。此神劑也。

黃柏二兩酒拌陰乾 知母同上 肉桂二錢

右爲細末。熟水爲丸。百沸湯空心送下二百丸。

小柴胡湯

治邪在肝膽。半表半裏之間。寒熱往來喜嘔。或日晡發熱。脇痛耳聾。鬱怒痰瘧等證。按古方較重。今方減用。

柴胡錢二三 半夏 人參 黃芩各一錢

生薑 甘草五分 大棗五枚

水煎溫服。若胸中煩而不嘔。去半夏人參。加枳實。若渴者去半夏。加人參。若腹中痛者。去黃芩。加芍藥。若脇下痞硬。去大棗。加牡蠣。若心下悸。小便

不利者。去黃芩。加茯苓。若不渴。外有微熱者。去人參。加肉桂。溫覆取微汗愈。若
欬者。去人參。大棗。生薑。加五味子。乾薑。

加味逍遙散

治瘡瘍肝脾血虛。內熱發熱。或遍身搔癢寒熱。或肢體作痛。頭目昏重。或怔忡
煩赤。口燥咽乾。或發熱盜汗。食少不寐。或口舌耳內作痛。或胸乳腹脹。小便不
利。

當歸

芍藥

白朮

茯苓

丹皮

柴胡

各等分

甘草

梔子

各七分

薑水煎服。

三品錠子

上品 去十八種痔。

白明礬二兩

白 砒五錢

乳 香

沒 藥各三錢半

牛 黃三錢

中品 去五漏。及翻花瘤氣核。

白明礬二兩

白 砒三錢

乳 香

沒 藥各三錢半

牛 黃二錢

下品 治療癰氣核。疔瘡發背。腦疽諸惡證。

白明礬二兩

白 砒半兩

乳 香

沒 藥各二錢半

牛 黃三分

右將砒末入紫泥罐內。次用礬末蓋之。以炭火煨令烟盡取出。並各藥俱研極細末。用糯米糊和爲挺子。狀如線香。陰乾。絛瘡內三四次。年深者五六次。其根自腐。如瘡露在外。更用蜜水調搽。乾上亦可。

嘗有一老嫗。用此治瘰癧。索重價始肯治。其方法乃是中品錠子。絛瘡內。以膏藥貼之。其根自腐。未盡再用。去盡更搽生肌藥。數日即愈。人多異之。凡見其治氣血不虛者果驗。惟氣血虛者。雖潰去亦不能愈。蓋此與必效散相爲表裏。皆攻毒去邪之藥也。

如神千金方

治痔無有不效。

好信石

黃明者三錢打如豆粒

明白礬

爲一兩末

好黃丹

飛炒五錢

蠟

梢七個洗淨瓦上焙乾爲末

草

烏生實者去皮研五錢

右用紫泥罐。先將炭火煨紅。放冷拭淨。先下明礬燒令沸。次下信入礬內拌勻。文武火煨。候沸再攪勻。次看罐通紅烟起爲度。將罐掇下。待冷取研爲末。方入黃丹草烏蠟梢三味。再同研極細。以磁罐收貯。如欲敷藥。先煎甘草湯或蔥椒

湯洗淨患處。然後用生麻油調前藥。以鵝毛掃藥痔上。每日敷藥三次。必去黃水如膠汁。則痔頭漸消。其年遠者。不出十日可取盡。日近者俱化爲黃水。連根去淨。更搽生肌之藥。凡五痔皆可去之。此乃臨安曹五方爲高宗取痔。封曹官至察使。

透骨丹

此潰膿藥。外科不可缺。

蟾酥

礪砂

輕粉

巴豆各五錢

蝸牛二個

麝香一分

右先將巴豆研如泥。次入蝸牛麝香再研。後入各藥研極細。以小磁瓶收藏。每用少許。以乳汁化開。先用針輕輕撥破毒頭。挑藥米粒許。納於瘡口。外用清涼膏貼之。

金銀花酒

治一切癰疽發背。疔瘡喉痺等證。

金銀花藤葉搗爛。取汁半鍾。和熱酒半鍾溫服。甚者不過三五服。可保無虞。

烏金膏

治發背中央肉死。塗之卽腐。未死塗之卽生。若初起腫痛。用點數處。則解毒頓消。若瘀肉腐黑。塗之卽潰。若惡瘡頑瘡。元氣無虧。久不收斂者。內有毒根。以紙撚蘸絛其內。有等發背。因元氣虛弱。或因尅伐。元氣虧損。毒氣散漫。中黯外赤。不腐不潰。須服大補之劑。中塗三四寸許。至五六日間。赤黯之界。自有裂紋。如刀劃之狀。中央漸潰腐脫。內用純陽之藥。以接元氣。庶能收斂。若妄用刀鍼去肉出血。則陽隨陰散。元氣愈傷。或塗涼藥。則毒氣不解。氣血愈虛。非徒無益。適以害之矣。其方用巴豆肉炒黑。研爲膏。點腫處。或塗瘀肉上。則自化。或加乳

香少許亦可。如塗瘡肉。或加香油少許。調稀可用。若餘毒不斂者。以此絰之。不致成痛。

車螯散

治癰疽初發腫痛。或少年熱盛。發背等症。急宜宣毒。利下熱退爲度。大人小兒。四季皆可服之。

紫背車螯

一隻鹽泥固。臍火服。紅地上出火毒用。

輕粉

甘草

各二錢

大黃

五錢

黃芩

漏蘆

去鬚

瓜

根

各半

右爲末。每服二錢。薄荷湯下。速利。酒亦可。

蠟攀丸

服過一兩以上。無不取效。最止疼痛。不傷臟腑。活人不可勝數。

白攀

一兩

黃

蠟

半兩

白

蜜

二錢

右和丸。如桐子大。每服十九丸。加至五十丸。溫酒送下。如未破即消。已破即合。一日服百粒。則有效能。防毒氣內攻。尤能護膜。始終須服半觔。瘡愈後服之尤佳。治蛇咬。溶化白礬。乘熱滴傷處。痛即止。一方用明礬飛過研細。以雞子二個取清。調礬末稀稠如糊。用無灰陳好酒放開服之。膿未成者即消。已成者從大。小便出。神效。其功大勝黃礬丸。

五香連翹湯

治諸瘡腫。初覺一二日。便厥逆。咽喉塞。發寒熱。

沉香

木香

麝香

丁香各一兩

乳香二兩

連翹

射干

升麻

獨活

桑寄生

甘草炙各一兩

大黃半兩

木通二兩

右咬咀。每服五錢。水鍾半。煎七分。溫服。取利。按丹溪曰。精要第一論云。不問癰疽瘡癤。虛熱冷熱。先與內托散。五香連翹湯。沉麝湯等諸方。不冷不熱。不問老幼少壯。陰陽虛實冷熱。多服爲妙。夫癰疽瘡癤。臟腑陰陽。有淺深虛實冷熱。用藥有補瀉溫涼。老幼少壯。其稟受厚薄。形志苦樂。隨年而增損。奈何欲以不冷不熱。四五方而通治之。又以多服爲妙。此不能無疑也。學者當審經絡。察病機而處治。豈可仗此爲通治之法乎。

隔皮取膿法

治諸般腫毒。

驢

蹄細切一兩

蕎麥麵一兩

白

鹽半兩

草

烏四錢

右爲末。水調作餅子。慢火炙黃。出火毒。研米醋調成膏。用白紙攤貼患處。毒自毛竅而出。其腫自退。

滴滴金 治疔瘡。

硃砂

輕粉

人言

雄黃

硃砂

麝香少許

右爲細末。每用些少。先以針刺開瘡頭貼藥。黃水出效。

拔黃藥

治疔瘡走黃。

用蟾酥飛羅麵爲丸。梧桐子大。可將一丸放在面前舌下。卽時黃出。追膿錠子藏海膿內潰不出。此藥追之。

雄黃二錢

巴豆肉半錢

輕粉一字

共爲細末。飯和成錠。

治疔破棺丹

疔瘡走黃不止。

當歸

赤芍藥

山梔子

牽牛各二兩半

連翹

牡蠣

金銀花

紫花地丁

京三稜

甘草各二兩

便秘加大黃三兩

右爲細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。食前用童便化開服。忌飲酒及生冷硬物。

治暑天癰瘡方

朴硝開水泡洗。三二次愈。

小兒走馬牙疳

桑樹白汁。擦之自愈。永不再發。

外科選要終



編號·醫1477
售價·三——角