

女科切要

下

中國醫學大成第九集

婦科類

女 科 切 要
下

上海大東書局印行

女科切要

清海虞 吳道源本立纂輯

鄞縣 曹赤電炳章圈點

卷五

難產

〔難產生死歌〕欲產之婦脈離經。沉細而滑腹又疼。定知半夜應分娩。脈法由來載內經。大凡臨產應如此。產婦安然切勿驚。身重寒熱痛頻頻。脣甲之色黑復青。子死腹中從此驗。舌青冰冷母歸陰。面赤舌青須細看。母活子死定分明。唇口俱青白沫出。子母俱亡自可憑。面青舌赤沫又出。母死子生定知真。臨症過來俱應驗。方知前哲不虛陳。

難產之症。宜服童便。磨神仙聚寶丹服之。或有不順者。用草麻子肉十四粒。硃砂雄黃各五分。蛇殼尺許燒灰。加麝香一分。共爲末。將水和作一丸。用川椒湯淋產

婦臍內。次將丸藥納臍中。用綿紙數層覆其上。再用闊布縛住。待胎下。卽去其藥。推腸生者。若腸不收。用新汲水入醋少許。三噴其面。卽自縮而上矣。若腸下時。須用溫湯洗濕。米篩盛之。若沾染塵垢。及着乾物。卽不肯上。且粘住斷絕。而母命不保矣。又法。將產婦頂心髮分開。用草麻子肉搗爛。敷於顛頂。將腸溫水養之。其腸卽收。則母命全矣。又有橫生逆產。手足先出者。用細針連刺兒手足。將鹽擦其刺處。卽便縮上。俗謂討鹽生也。

有頭胎生。曾二三個月墮。嗣後第二三胎。仍前復墮。名曰滑胎。不可復安矣。必須於有胎之後。曾有正產一次。後無此患矣。

按紫蘇飲一藥。能治臨產驚恐氣怯。累日不下。乃妊娠之要劑也。

壬午年間。曾有某室懷孕。十月滿足。忽然腹中大痛。卽喚穩婆守候。穩婆欲圖大望。假意探胎消息。將指摘破胞衣。水流不止。胞水流乾。胎元乾攔。不能轉運。日夜無眠。痛亦不已。約四五日矣。邀余往視。診其脈。六脈離經。或曰六脈已散。命將危矣。余察其舌色鮮紅。毫無青色。謂曰不妨。將臨盆矣。或曰胞漿已乾。有何生理。答曰。古有急開支河之法。卽大劑四物人參。加入車前五錢。柞枝一兩。煎湯代水煎。

服房中穩婆三個。議論紛紛。或欲早用鉤割。以全母命。余曰。各人不可動手。瓜熟蒂落。可保子母兩全。服過藥後。少頃。腹中大痛。喚人扶掖走動。兒卽墮地。今已十二歲矣。

臨產

〔臨產歌〕臨產之時勿易看。驀然氣湊目珠翻。唇青口噤流涎沫。子母雙雙入死關。舌色鮮紅唇面黑。子存母死片時間。面紅舌黑兒難保。佛手仍須奪命丹。橫逆催生龍蛻散。滑胎可救漏胎乾。死胎欲下芎歸飲。更搗草麻脚底攤。血入胞中時脹悶。上冲心胃死何難。朴硝散共紅花酒。奪命神丹逐下安。產下血逆成血暈。清魂急灌命須還。血由一倒心無主。目暗神昏汗雨漫。氣隨血脫多難救。桂附參耆大劑堪。血冲心悶成狂妄。喘促蒲黃不等閒。兒枕痛知緣惡露。當歸失笑效非凡。忽然口噤言顛倒。見鬼原非風與寒。敗血上冲心血耗。妙香散共黑龍丹。夫婦人臨產。死生反掌。若善於救治者。實可以起死回生。稍不急救。多致夭枉。救之不得其法。藥之不能應手。亦莫全其生也。將產努力過多。兒轉未逮。以致胎落。

於胯。不能育者。有因子橫子逆而難產者。有體肥脂厚。平素逸而難產者。有子壯大而難產者。有年長遣嫁。交骨不開而難產者。有胞水先破。胞內乾澀而難產者。有胎死腹中而不下者。其腹冷舌黑可驗。有胞中積水。其腹大異常。脈息細弱。名曰胞水。時醫不識。疑爲雙胎。臨產必去水斗餘。方產。其兒手足。必然軟短殘疾。蓋水漬其胎故也。醫者識此。早用去水之藥。兒斯無恙矣。有兒下地。去血太多。產下卽死者。有血奔上而昏暈者。有子下而胞不下者。有敗血灌滿胞中者。如胞不下。須行去胞血。則自下也。有因穩婆取胞。誤傷內臟。輕則帶疾。重則傷命。慎之慎之。大抵貧賤婦人生育極易者。以其勞役。胎氣流動故也。富貴之家。厚養安逸。身體肥壯。每難生育也。

脈經曰。臨產六至。脈號離經。或沉細滑。若無卽生。浮大難產。寒熱又煩。此時急候。急於色徵。面頰唇舌。忌黑與青。面赤母活。子命必傾。若胎在腹。子母歸真。臨產之時。切不可喧鬧。選一善熟穩婆。或得力使女。無使揮霍荒張。致令產婦驚恐。宜食軟飯稀粥。若腹中痛。且令扶行。或痛或止。名曰弄胎。不可使穩婆手探。尤不可屈腰臥眠。如連引腰痛。眼前如見火光。此是兒轉運。須扶掖徐行。起若艱難。

卽持物立住。須臾直至腰腹相引。難以行立。然後坐草。切勿太早。恐兒在腹。難以轉動。及胞水先破。子道乾澀。皆主難產。若心中熱悶。將生雞子一枚。打破吞服。抱腰之人。不可傾斜。則兒自然順下。若臨事倉惶。用力失宜。隨有難產之患。小兒已出。勿令便睡。宜閉目而坐。少頃。方扶上牀。仰臥立膝。勿令熟睡。宜頻喚醒。切不可。以得男爲喜。喜則傷心。恐生紅汗之症。亦不可以得女爲憂。憂則致敗血攻心之患。房中常以醋烟薰之。以防暈悶血升。數日之外。不可勉強下牀。一月之外。莫犯房事。謹之慎之。

妊娠臨產。有兒湊心不下者。其兒手必捧母心。多致母子俱亡。必用藥引入心分。解開兒手。方得產下。蓋兒手捏物最緊。藥氣一到。其手自軟。故曰解開。有產後胞衣不下。不可視以爲細。故而忽之。多有升至心而死者。不可不知。

兒捧母心

兒捧母心者。急用猪心血。調乳香五錢。煮酒送下。兒手遂開。如胞衣不下。用花蕊石一兩。硫黃四兩。入礬。鹽泥固濟。煨過爲末。童便酒調一錢。卽下。胞衣未下時。產婦將已髮推入口中。似欲作嘔勢。胞衣卽下矣。

有胞水放乾。兒不肯下者。急以大劑四物。加車前一二合。流水煎。頻頻服之。兒卽隨水而下。此急開支河法也。虛者加人參。

胞衣不下

準繩云。胞衣不下。用瓦油盞烘熱。仰放產婦臍上。令男人以脚抵住油盞。其胞卽下。乃鄉村之法。果驗。

交骨不開

交骨不開。有因元氣素弱。胎前失於調養。以致氣血不能運達而然。用加味芎歸湯。加柞樹枝一兩。大劑服之。外以麻油調滑石末。塗入產門。交骨漸開。達生散。卽紫蘇飲。胎前之妙劑。催生之良方。

大腹皮三錢

人參

紫蘇

陳皮

歸身各五

白朮

白芍各一錢

炙甘草二錢

加黃楊頭七箇。枳殼。砂仁五分。青葱五莖。水煎服。此方補中行滯能下死胎

胃苓湯

蒼朮

厚朴

廣皮

白朮

茯苓錢半

猪苓一錢

甘草六分

官桂五分

薑一片。水煎。

防風通聖散

防風

荊芥

麻黃

山梔

赤芍

大黃

朴硝

甘草

桔梗

川芎

歸身

滑石

薄荷

黃芩

白朮

石膏

連翹

黑神散 治胞衣不下。

熟地

歸尾

赤芍

蒲黃

肉桂

炮薑

甘草

黑豆半升

童便冲服。

神仙聚寶丹

熟地

川芎

乳香

五苓脂

琥珀 當歸

硫黃

花蕊石

夏薑 黑龍

百草霜

奪命丹 治子死腹中不下。

桃仁 赤芍

官桂

茯苓

丹皮

養胃湯 治惡阻。

當歸 白朮

半夏 藿香

砂仁 白芍

茯苓 陳皮

神麴 香附

薑三片。大棗二枚。

五積散 見前

安胎飲 見前

苦練丸

苦練 打碎

茴香 炒

當歸 等分

共爲末酒糊丸。

妙香散

見產後

清魂散

見產後

難產縮胎法

丹溪曰。世之難產者。往往見於鬱悶安佚之人。富貴養之家。若貧賤辛苦者。無有也。古方書止有瘦胎飲一論。而其方爲湖陽公主作也。實非極至之言。何者。見其有用此方者。其難自若。予表妹苦於難產。後遇胎孕。則觸而去之。予甚憫焉。視其作爲。惟勤於針指。搆思旬日。忽自悟曰。此正與湖陽公主相反。彼奉養之人。其氣必實。耗其氣使平和。故易產。今形肥。知其氣虛。久坐則氣不運。必氣愈弱。兒在胞胎。因母氣不能自運耳。當補其母之氣。則兒健易產矣。令其有孕至五六個月來告。卽與全方紫蘇飲。加補氣藥。與數十帖。果得男而甚快。遂以此方。隨母形色性稟。參時令加減與之。無不應者。因名其方達生散。

白朮散 治子腫。

白朮一錢

薑皮

陳皮

茯苓皮

大腹皮

桑皮各五

爲末。米飲調服。

竹葉湯 治子煩。

淡竹葉

麥冬肉

黃芩

人參

茯苓

防風

知母

水煎服。

參朮飲 治轉胞。

當歸

熟地

川芎

白芍

人參

白朮

陳皮

半夏

甘草

薑三片。水煎。

參朮膏 轉胞屢驗。

人參半錢

白朮二錢

黃耆錢半

茯苓一錢

陳皮一錢

桃仁一錢

炙草五分

用羊猪胞煎湯代水。

婁氏十產論

一曰正產。婦人懷胎十月滿足。忽腰腹作陣疼痛。相次胎氣頓陷。至於臍腹痛甚。乃至腰間重痛。穀道挺進。繼之漿破出血。兒子遂生。此名正產。

二曰傷產。婦人懷胎未產一月之前。忽然臍腹疼痛。有如欲產之狀。仍却無事。是名試月。非正產也。但一切產母未有正產之候。即不可令人抱腰。亦不可令產母亂動用力。若兒身未順。纔方轉動。便教產母虛亂用力。使兒錯落。忽橫忽倒。不能正生。皆緣產母用力未當。用力之所致也。直待兒身順。臨逼產門。方始用力一送。令兒下生。此名傷產。

三曰催產。孕婦欲產。漿破血下。已見是正產候。但却未服藥不生。即可服催生藥試之。或有經及數日而不產。則產母困倦。亦可服藥。助產母之正氣。令兒速生。此名催生。

四曰凍產。乃冬月寒冷。產母經血得冷則凝。以至兒不能生下。此害最深。若冬月生者。下部切不可脫棉衣。并不可坐臥寒處。當滿房着火。常有暖氣。令產母背身向火。令臍下腿膝間嘗暖。血得熱則流行。兒便易生。名曰凍產。

五曰熱產。時當夏令。威焰酷烈。產婦要溫涼得所。亦不恣意取涼。傷損胎氣。又不可房中人多。熱氣逼襲產母。使產母血沸。發熱頭疼面赤。昏昏如醉。乃至人事不省。此名熱產。

六曰橫產。兒先露手。或先露臂。此由產母未當用力。而先用力故也。兒身未順。用力一逼。遂致身橫不能生下。當令產母安然仰臥。然後推兒徐徐先推其手。令人直上漸漸逼身。以中指摩其肩。推上而正之。或以指攀其耳而正之。必須產母仰臥。以便推兒正之。候其兒身正。煎催生藥一盞服之。方可用力。令兒下生。此名橫產。

七曰倒產。產母胎氣不足。關鍵不牢。用力太早。致令兒不能迴轉。便直下先露兒足。當令產母仰臥。令穩婆推其足。漸漸入內。不可令產母用分毫力。亦不得令其驚恐。務必安慰。使兒自順。名曰倒產。

八曰偏產。兒身未正。產母用力一逼。致令兒偏柱左腿。或偏柱右腿。故頭先露偏柱一半。不能生下。當令產母仰臥。次令看生之婦。輕輕推兒近上。以手正兒頭。令兒頭正後。產母用力一送。即便生下。若小兒頭後骨偏柱穀道。只露其額。當令看生之人。以綿烘熱。裹手於穀道外旁。輕輕推兒頭端正。便令產母用力一送。兒即下也。此名偏產。

九曰礙產。兒身已順而露正頂。不能生下。蓋因兒身迴轉。臍帶攀其肩。因此露頂。而不能生下。當令產母仰臥。令看生之婦。輕輕推上。徐徐引手。以中指按兒肩下。撥其肚帶。仍須候兒身正順。方令產母用力一送。兒即生下。此名礙產。

愚按大凡橫產、倒產、偏產、礙產四法。若非穩婆精良妙手。不可依用此法。恐恣其愚蠢。以傷人命也。今世之倒產者。往往隨其倒足生下。名曰踏蓮花生。並無後患。子母雙全。不必依前條推足上法亦可。如礙產者。往往肚帶有纏在兒頭頂上。而兒頭自出在產戶外。穩婆以指撥其肚帶。從兒頭頂過下之者。又有肚帶纏住頭頂一匝。而兒與胞衣一齊同下者。倘漫用前法推入產門。轉恐誤事也。

十日坐產。言欲臨產時。高處繫一手巾。令產母以手攀之。輕輕屈足坐定。令兒生下。非坐在物上也。此名坐產。

昔有趙都運恭人。每產則大腸先出。然後則產。產後則大腸仍露。甚爲苦之。名曰盤腸生。醫不能療。偶在建昌得一良法。而可收之。用醋半盞。新汲冷水七分調勻。嚙產母面。每嚙一收縮。三嚙收盡。是良法也。

產母腸不收。用香油五斤。煎熱盛盆。候溫坐油盆上。約坐至半時。以皂角末次入鼻中。嚏作立收。斗門方又法。用半夏末搐鼻中。則腸立收上。又紙撚蘸香油點

燈吹滅。以烟熏產母鼻中。腸亦立上。

丹溪曰。胎前母滯。產後母虛。產後一切皆不可發表。產後不可早用白芍。以其酸寒。尅伐生發之氣故也。大凡產後。不可食物過多。恐成積滯。若未滿月。不可強起離床。不宜多言喜笑。及驚恐憂惶。悲思怒惱。不宜久坐久立。及作針工。恐滿月之後。卽成蓐勞。併油膩魚肉之類。皆不可犯。凡產後百日之外。方可交合。不爾。百病滋長。慎之。凡婦人患風氣。臍下虛冷。莫不皆早行房之故也。或曰。新產之婦。好血已虧。污血或留。彼黑神散非要藥乎。

答曰。至哉坤元。萬物資生。理之常也。初產之婦。好血未必盡虧。汚血未必盡積。臟腑未必寒。何以藥爲。飲食起居。勤加保護。何病之有。誠有汚血體怯而寒。與之幾劑。亦自簡便。或有他病。當求病起何因。病在何經。對症投劑。何用雜藥亂投。誠有性急形瘦。易怒火多者。夏月坐蓐。時行火令。薑桂皆爲禁藥。至於保護之法。尤爲悖理。肉汁發陰經之火。易成內傷之病。先定有訓戒。何胡爲羊雞濃汁作糜。而又服當歸丸。四順理中丸之類。雖是補藥。並是偏熱。若藏府無寒。何處消受。若夫兒子初生。母腹頓寬。思食雞子。而不思雞子難化。展轉生病。每見產母無疾者。却去黑神丹。不可與雞子肉食。且與之白粥乾菜。間以少些白鯢。半月方與別物。大能養胃却疾。彼富貴之家。驕恣之婦。卒有白帶頭風氣痛。膈滿痰逆口乾。經事不調等症。皆是陽盛陰虛之病。天生血氣。本自和平。又烏知其有此等謬迷。有以兆之耶。

女科切要卷五 婁氏十產論

女科切要

清海虞 吳道源本立纂輯

鄞縣 曹赤電炳章圈點

卷六

產後門

婦人產後。如無他症。不必服藥。三日之內。但以荊芥炭、益母草、砂糖煎湯。頻頻與飲。使惡露下盡。自無血暈腹痛之患。切不可飲酒及雞子牛羊猪肉之類。須以白粥乾菜調理。或松江淡鯊蒸熟食之。半月方可食鮮肉。漸漸加增。纔免陽盛陰虛之患。若去血過多。惡露未淨。或傷飲食。或感風寒。或夾氣惱。或三日蒸乳。皆能發熱增寒。身疼腹痛。當以意消息。不可偏執而用藥也。丹溪云。產後以大補氣血爲主。雖有雜症。以未治之。產後不可發表。又不可早用白芍。以其酸寒。恐伐生氣也。慎之。

凡婦人產後。陰血虛。陽無所附。而浮散於外。故多發熱。治宜四物補陰血。而炮乾薑之辛溫從治。收其浮散。使歸於陰。然產後脾胃俱虛。多有過服飲食所傷。滯而發熱者。誤作血虛。則不效矣。如遇產後發熱。須審問何物所傷。有食無食。胸膈可有飽悶。如惡食泄瀉。只作傷食治。若發熱而飲食自調者。方用補血藥。產後血暈。因虛火引血上行。漸覺昏暈。急以鹿角燒灰。出火毒研極細末。煮酒童便調和。灌下。卽醒。行血最快。

又法用鐵秤錘。炭火燒紅。以醋淬之。令產婦鼻嚙之。卽醒。

鄭艮棟曰。新產血暈。不省人事。大類中風。切不可遽以中風治之。急服琥珀丸。卽愈。如兒已下地。一時血暈。昏昏不醒。速扶起抱住。勿令臥下。快與童便灌之。如不醒。再以燒紅炭投醋中。使醋氣透入產婦鼻內。卽甦。因症用法。無不應效。產後子已在蓐。切不可使之卽臥。須扶坐片時可也。因初產之婦。血氣未定。恐其血乘虛而上逆。慎之。

新產飲酒大忌。乃第一證。但服童便爲妙。他藥苦寒。雖屬降下之品。却能凝滯敗血。且產後卽發熱。切不可服涼藥。以其伐生氣而血凝也。若童便乃人身之元氣。

所成。名曰還元丹。惟能降火。蓋以人補人之義。新產飲食最難尅化。如赤豆、沙雞、鴨蛋之類。蓋新產暴大下血。脾胃甚弱。最易成病。

新產之脈緩滑結實。大弦緊。鬼來侵。若得重沉小者活。忽覺堅牢。命不存。寸口澀疾不調死。沉細附骨不絕生。請看此候分明記。常須念此向心經。

新產胞衣不下。血暈不醒。腹中刺痛。敗血攻心。或眼閉口噤。或譫語狂言。困頓垂死者。以琥珀黑龍丹灌之。立效。或黑神丹亦可。

產婦敗血有衝胃衝心之辨。不可混治。衝心。顛狂作亂是也。衝胃者。飽悶嘔惡是也。二者俱屬危症。用藥不可不速。遲則不救。

王肯堂曰。產後敗血有衝胃衝心衝肺三者皆屬危症。用藥不可不速。衝胃則嘔。衝肺則喘。衝心則發狂跳躍。急令兩人扶住。急宜童便降香沉香當歸煎湯灌下。其惡血自下行。新血各歸經。卽時安寧矣。

皇甫中曰。產後敗血停蓄上干於心。心氣閉塞。故舌強不能言語者。八珍散。產後內因痰氣鬱滯。閉目不能語。用明礬一錢爲末。白滾湯沖服。

產後去血過多。暈悶不醒者。芎歸湯。產後虛火引血上行。血迷血悶。暈昏不知人。

清魂散。如不醒。以韭菜一二斤搗爛。入壺中。沸醋傾入壺內。覆壺蓋。以壺嘴放鼻間熏之。卽甦。或乾漆燒烟。令產婦嗜烟。如不醒。急掐其人中。提頂心頭髮。灌之以童便薑汁。自然甦醒。

黑龍丹 治產後一切血證。及胞衣不下。危急之症。

當歸二錢

五靈脂二錢

川芎二錢

熟地二錢

夏薑二錢

右藥一兩。以沙盆盛赤石脂。以紙包鹽泥封固。炭火煨令通紅。火候冷取開。看成黑色。研細入後藥。

百草霜五兩

硫黃錢半

乳香錢半

花蕊石一錢

琥珀屑一兩

後藥與前藥研極細。以醋糊爲丸。如彈子大。每服一九。炭火煨令通紅。投入老薑自然汁與童便。入酒漉出。烘乾研細。只以此酒下。

清魂散 治血迷血暈。昏迷不省。

澤蘭一兩

人參一兩

荊芥四兩

炙甘草八分

每服二錢。熱湯溫酒各半盞調服。

產後血暈

問曰。新產婦人有三病。一者病瘕。二者病鬱冒。三者大便秘結。何謂也。
師曰。新產血虛。多汗出喜風。故令病瘕。亡血復汗寒多。故令鬱冒。亡津液則胃燥。
故大便難。

產後血暈者。氣血暴虛。未得安靜。血隨氣上。迷亂心神。故眼前生花。甚者令人悶
絕。不知人事。口噤神昏氣冷。宜服清魂散即甦。

荊芥散

治產後血暈。精神昏昧。

荊芥三錢

桃

仁五錢

爲末。滾湯下三錢。如喘加杏仁甘草各三錢。

敗血衝心

婁氏曰。產後下血多而暈者。但昏悶煩亂而已。當補血。下血少而暈者。乃惡露不

下。上搶於心。則心下滿急。神昏口噤。絕不知人。當破血行血。

丹溪曰。婦人產後血暈。此乃虛火載血妄行。漸覺昏迷。以鹿角煨灰出火毒。研極細末。用童便煮酒灌下。卽醒。此物行血極妙。

獨行散 治產後血暈。昏迷不醒。衝心悶絕。五靈脂四錢。一半炒。一半生。共研極細末。溫酒調下二錢。卽甦。

產後鬱冒

仲景曰。產後鬱冒。其脈微弱。不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。以血處下厥。孤陽上出。故但頭汗出。所以產婦汗出者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。大便堅。嘔而不食者。小柴胡湯和之。

產後如狂喘滿

產後血搶心悶如狂。喘滿欲絕者。蒲黃散。惡露不盡。心腹痛。黑神散。惡露不盡。兒枕痛。當歸失笑散。產後忽然口噤。語言顛倒。如見鬼狀。此敗血攻心。非風寒邪祟。

也。妙香散。或用黑龍丹。煨過酒調下。

蒲黃散 治惡露不快。血上搶心等症。

乾荷葉二錢

甘草二錢

丹皮二錢

元胡二錢

生地三錢

挫作二劑。水煎。入蜜少許溫服。

黑神散 治惡露不盡。胞衣不下。腹痛不止。

黑豆炒半

熟地四兩

當歸四兩

肉桂四兩

乾薑炒四兩

生蒲黃四兩

炙甘草四兩

炒白芍四兩

共爲末。每服二錢。童便各半盞調服。

當歸失笑散 治產後心腹絞痛欲死。及兒枕作疼。

當歸五錢

炒蒲黃五錢

五靈脂五錢

共爲末。每服二錢。醋調熬成膏子。白滾湯下。

妙香散

麝香一錢

遠志肉去心一兩

黃耆一兩

人參五錢

茯苓一兩

茯苓神一兩

桔梗五錢

甘草五錢

木香二錢

硃砂三錢

淮山藥薑汁炒一兩

共爲末。每服二錢。開水調服。

滑胎散 治坐草太早。努力過多。以致難產。

滑石六錢

冬葵子五錢

甘草二錢

爲末。每服二錢。酒下。

神應散 治橫生逆產。胞漿先破。此藥如魚得水。

白芷一兩

百草霜一兩

爲末。童便酒調下三錢。

牛膝湯 治胞衣不下。臍腹堅痛。服此爛下。

牛膝四兩

瞿麥四兩

當歸三兩

通草六兩

滑石八兩

葵子五兩

水九升。煎至三升。三次服。

黃耆湯 治產後去血過多。自汗不止。

炙黃耆二錢

白朮一錢炒

防風一錢

熟地二錢

牡蠣錢半
研煨

茯苓一錢

麥冬五分

甘草五分

大棗二枚水煎服。

茯神散 治產後心虛怔忡不定神思不清。

人參一錢

茯神八分

甘草一錢

山藥一錢

當歸一錢

肉桂五分

遠志肉一錢

生薑五錢

大棗二枚水煎服。

當歸羊肉湯 治產後寒熱自汗肢體疼痛名曰葶勞諸藥無效者。

當歸七錢

人參七錢

黃耆一兩

生薑五錢

羊肉一斤煮汁五大碗入藥煎四碗作六服。

腹痛下血胃虛嘔逆砂仁二錢炒研末酒調下或佛手散。

血虛發熱

〔產後血虛發熱歌〕產下嬰兒血氣空。絲毫觸犯便傷營。倏然致疾如山重。不與

尋常一樣同。去血過多。因發熱。炮薑參朮與川芎。陰傷作熱。心煩悶。自汗黃耆可奏功。惡心嘔逆。傷脾胃。抵聖湯。醫腹脇膨。歸耆止汗。除身熱。不愈當歸。取效崇。風中愈。風湯立驗。扶神散。子治怔忡。諸風痿痺。筋搖擗。時世名醫。認血風。乍見鬼神。由血耗。調經散。服起疲癢。中風口噤。牙關閉。拘攣身張。似角弓。此是血虛筋癱癰。舉輕古拜配歸芎。產後經來。因適斷。感於異症。在其中。手牽足搖。牙關緊。昏胃柴胡視聽聰。陰虛發熱。增寒證。晝日清明。夜覺兇。加增四物。神功大。一服能令病脫躬。胞中誤損。成淋症。參朮煎膏。洩自通。浮腫必須分水道。憂思鬱結。在寬胸。痢初化滯。香連芎。積久須當用胃風。初感寒邪。微發表。熱邪不解。用黃龍。燥煩實熱。芩連理。渴甚人參白虎從。熱泄柴芩除半夏。便難議。與大柴攻。汗多表弱。宜行桂。裏弱中虛。用理中。發表內攻。須帶補。勿行猛浪。內傷營。小便淋瀝。行時痛。但用茅根。可治癰。泄瀉胃苓湯可用。寒加肉果桂薑同。若因熱瀉。并腸垢。薑炒黃連佐木通。

氣血大損病

夫產後氣血大損。卽易產力壯者。尙有感疾爲終身之患。產母不可恃健。不行保

重。勞碌以損其營。多食以傷其胃。外感六淫之邪。內受七情之氣。爲患莫測。古云。產後勿犯絲毫。感病重於山岳。信夫。或惡露未淨而發熱作疼。真元不復而痿頓。爲勞。比比皆然也。故產後諸疾。先以大補氣血。縱有他疾。以末治之。或欲祛邪。必兼補劑。殊爲切當。若以峻劑攻之。再損氣血。危可立待。或惡露當去者。亦須急去。故生新溫養爲主。斯得其正也。

舉輕古拜散

治產後中風。

荆芥炒燥

爲末。每服二錢。豆淋湯調服。

產後脈法

脈經曰。婦人新生乳子。脈沉滑小者生。實大弦急者死。又曰。婦人生產之後。寸口脈弦疾不調者死。沉細附骨不絕者生。婦人產後因中風傷寒發病。喘鳴而肩息。脈實而浮緩者生。小緊者死。

丹溪曰。胎前脈細小。產後脈洪大。皆死症也。又曰。產前當洪數。既產而洪數如故。

安得不死。脈經曰。產後緩滑沉細皆宜。實大堅牢瀉疾俱危。

產後蓐勞

婦人新產後自汗。肢體酸疼。虛眩無力者。名曰蓐勞。當歸羊肉湯。產後氣血大虧。失於調理。自汗發熱。虛羸飲食不化。時效發渴者。人參驚甲散。發寒熱。石子湯。鄭良棟曰。產後蓐勞虛損。頭痛氣短。小腹脹痛而寒熱者。增損柴胡湯主之。葉盛公曰。產後蓐勞。緣生產久坐多語。運動用力。致頭目四肢疼痛。寒熱如瘧。宜白茯苓散。

人參驚甲散 治產後蓐勞。寒熱如瘧。

驚甲

甲雨一

人

參五錢

肉

桂五錢

桑寄生五錢

當歸五錢

茯苓

苓五錢

白朮

朮五錢

大熟地五錢

桃仁五錢

麥冬

冬五錢

續斷

斷五錢

牛膝一兩

黃耆一

共爲末。猪腎一對去膜。生薑一片。水二盞。棗三枚。煎至一盞。入前末藥二錢。葱

白三寸。烏梅半箇。荊芥五穗。再煎數沸。去渣。空心服。

石子湯 治產後虛羸寒熱。自汗氣促等症。

猪腰子竹刀對去膜香 薑二兩 葱 白一兩

白芍二兩

右藥分作兩貼。每用水三升半。勻三服。

白茯苓散

茯苓一兩 當歸

川芎

白芍

肉桂 黃耆

人參各五錢

熟地一兩

先以水二盞。煮猪腎。再加薑二片。棗三枚。入藥五錢。去渣。溫三服。

增損柴胡湯

柴胡 半夏

人參

川芎

橘紅 甘草

水煎服。

抵聖湯 治產後惡露不行。敗血入於脾胃。

赤芍一錢 半夏一錢 澤蘭一錢 陳皮一錢

人參一錢

甘草七分

薑三片。水煎服。

產後胞衣不下

產後胞衣不下。爲血入胞中。上衝心胸。氣血脹悶。不出欲死。必須逐其血。用紅花、茜草酒煎服。或朴硝散。甚則奪命丹。如再不下。臍堅脹急痛欲死者。牛膝湯。

努力傷胎

妊娠努力。及跌蹠傷胎。腰腹疼痛。或胎上搶心去血。膠艾丸。或從高墜下。或努力被重物所壓。觸傷胎氣。腹痛下血。胃虛嘔逆。砂仁二錢。炒爲末。酒調下。或佛手散。

胞衣先破

胞衣先破之由有二。或因母體素弱。氣血兩虛。胞衣故薄。兒身轉動。隨觸而破。有因兒未轉動。坐草或早。用力過多。以致胞破。如已破久。則血水乾。產路遂濇。兒難

下也。急用大劑加味芎歸湯。加熟蜜一兩助氣。而兼潤滑。自當兒卽順下。婁全善曰。胞衣不下。惟花蕊散取效獨妙。若鄉居藥肆。倉卒無之。今採得胡氏一法甚妙。產訖。胞衣不下。稍久則血流胞中。爲血所脹。上冲心胸。喘急疼痛。必致危篤。若有此患。宜急斷臍帶。以少物繫帶。必用力牢固繫之。然後截斷。使其子血不流入胞中。則胞衣自當痿縮而下。縱淹延數日。亦不能有害。惟以產母心懷安泰。終自可下。累試有驗。

花蕊散 治產後敗血不盡。血迷血暈。惡阻。敗血奔心。

胎死腹中。胞衣不下。至死者。但心頭稍緩。急以童便調一錢服之。取下惡血。或如猪肝。產婦從此可無血氣血風之症矣。如膈上有血。亦化爲黃水。卽口中吐出。或從小便下也。

牛膝湯

牛膝

瞿

麥

各四兩

當

歸

三兩

通

草

六兩

滑石八兩

葵

子

五兩

右藥㕮咀爲末。以水九升。煎至三升。分爲三服。

女科切要卷六 胞衣先破

-

女科切要

清海虞 吳道源本立纂輯

鄞縣 曹赤電炳章圈點

卷七

產後虛渴

產後血熱心煩口渴者。涼血飲。虛煩而渴者。生脈散。蓋產後虛渴。氣少脚弱。頭目眩暈。飲食無味。熟地黃湯。或四物加麥冬花粉。

涼血飲 治產後虛煩發渴。

黃芩二錢

赤芍二錢

川芎二錢

甘草一錢

荆芥二錢

花粉二錢

生地二錢

麥冬二錢

右藥分作二服。每服加竹葉七片。燈心二十莖。水煎。生脈散 生津止渴。

人參

麥冬

五味

水煎服。

熟地黃湯

人參 四錢

甘草 一錢

花粉 六錢

麥冬 三錢

熟地 五錢

分作二服。元米一撮。薑棗煎服。

產後浮腫

產後敗血停蓄五藏。循經流入四肢。化爲水。因成虛浮腫者。調經散。產後氣血大虛。肢體浮腫者。不可通利其水。宜大補氣血。四君子湯。加蒼朮。

調經散

當歸 一兩

赤芍 一兩

肉桂 一兩

沒藥 一錢

琥珀 一錢

麝香 五分

細辛 五分

炙甘草 二錢

共爲細末。每服五分。入薑汁少許。酒調下。

產後發熱

薛古愚曰。產後發熱。因去血過多。則血虛。血虛則陰虛。陰虛則生內熱。心胸悶煩。氣短頭疼眩亂。骨節酸疼。晡時轉甚。與大病後虛煩悶相類者。宜人參當歸散主之。如血虛生熱而自汗者。逍遙散。若產後臍下發熱。非熱地不能治。若產後發熱不已。必用炒黑乾薑。詳見丹溪治產後日晡發熱轉甚。非柴胡不能治。若外皮熱而內不熱者。及兩足覺冷者。此胃風也。宜芎蘇飲。

產後寒熱。惡露未淨。停住胞絡而發熱者。仍以行血爲主。小腹痛者是也。輕則四烏湯。重則醋茴散。或以吐瀉五積散。有食加消導藥。惡露淨者。小腹痛不痛是也。若產後因下血過多。而忽發寒熱者。此因營衛虛損。陰陽不和也。宜加減四物湯。

初產作乳

初產有作乳者。有產下而不育乳汁者。膨上俱致發熱。但此症與惡露未淨。停胞絡而發熱者相似。而實不同。宜細細辨之。小腹痛者。惡露停蓄也。不宜服加減四

物湯。若小腹不痛者。陰陽不和也。宜服之。若往來寒熱。小柴胡湯主之。寒熱而盜汗如雨者。麥煎散主之。

皇甫中曰。產後血虛發熱。頭痛自汗。心煩氣短者。人參當歸散。產後陰虛氣血不足而發熱。日輕夜重而惡寒者。四物湯加炮薑微熱。加茯苓。產後蒸乳發熱者。用四物加黃耆、人參、白朮、花粉。人參當歸湯。

熟地一兩

人參一兩

當歸一兩

麥冬一兩

肉桂一兩

白芍一錢

每服五錢。加薑、竹葉煎服。

產後風痿

產後諸風。痿弱筋攣無力者。血風湯。產後氣弱汗多。風搏之而成瘥。口噤。角弓反張。脊強汗出不止者。難治。大聖散加川芎、黃耆。血風湯。

秦 朮 一錢

羌 活 一錢

防 風 七分

白 芍 酒炒一錢

大熟地 二錢

白 芷 八分

川 芎 一錢

白 朮 炒一錢

歸 身 一錢

炙黃耆 錢半

茯 苓 一錢

半 夏 一錢

水煎服。

產後怔忡

大聖散 治產後因驚而發心神不定怔忡恍惚。

川 芎 一兩

黃 耆 一兩

當 歸 一兩

木 香 一兩

人 參 一兩

甘 草 一兩

茯 神 一兩

麥 冬 一兩

右藥挫為末。每服七錢。薑三片。水二盞。煎至八分。空心服。

產後血少怔忡恍惚驚悸睡不安寧者。益榮湯。或養心湯。寧志丸。產後心恍惚者。

茯苓散。

益榮湯

當 歸 錢半

黃 耆 一錢

遠 志 一錢

棗 仁 炒一錢

柏子仁炒一錢

茯神一錢

人參一錢

白芍炒八分

甘草三分

紫石英八分

薑三片水煎服。

養心湯 治產後心虛血少。恍惚驚悸不安。

黃耆五錢

茯神五錢

遠志肉五錢

當歸五錢

人參二錢

半夏麴

川芎各五錢

棗仁二錢

肉桂半錢

五味三錢

柏子仁二錢

甘草四錢

右爲粗末。每服三錢。加薑三片。水煎服。

茯苓散

人參一錢

甘草一錢

山藥一錢

當歸一錢

遠志肉一錢

茯苓一錢

桂心一錢

麥冬一錢

大棗三枚。水煎服。

產後中風

產後中風口噤不省人事。牙關口閉。手足痠痲者。舉輕古拜散。產後血大虧損。經絡空虛。勞碌太早。風邪乘虛而入者。小續命湯。或愈風湯。中風角弓反張。涎潮湧出。大豆子湯。

小續命湯

麻黃一錢

人參一錢

黃芩一錢

白芍一錢

川芎一錢

甘草八分

杏仁十四粒

防己一錢

肉桂七分

附子一錢

水煎服。

大豆子湯

大黑豆

一升炒令焦黑候烟起以好酒三升沃之入瓶內水貯聽用

每用此酒半升。入獨活五錢。同煎十沸溫服。

血暈氣脫

產後血暈與氣脫。宜分別治之。

血暈是實證。逐瘀爲主。此因惡露不行。惡血衝心。而心下滿急。神昏口噤。不省人事者。切勿放倒。急與生化湯。失笑丹。或佛手散。

氣脫是虛證。補正爲主。此因平素虛弱。臨產用力勞傷。去血過多。亦致昏暈不醒。微虛者。少煩卽甦。大虛者。血竭卽死。但察其面白口開自汗。手足冷厥。六脈微極。是氣脫症也。生死判於頃刻。勿令散倒。令傍人挽住頭髮。急與大劑參歸附子等同其陽。或增損四物湯煎濃。徐徐灌之。但能下咽卽可得生。若誤認血暈。而以行血藥投之。益速其斃也。治宜細心詳究。

產後陰虛

產後陰虛血耗。四物湯加炮薑。產後去血過多。陰虛而致內熱煩懣。呼吸氣短。頭痛悶亂。骨節煩疼。人參當歸散。陰虛發熱者。小柴胡湯。去半夏。加花粉。人參當歸散。

人參 一兩

當歸 一兩

肉桂 一兩

熟地 一兩

每服五錢。加竹葉。生薑煎服。

小柴胡湯

人參

花粉

黃芩

柴胡

甘草

加薑水煎。

產後瘧疾

產後瘧疾。宜分別施治。有寒熱相兼。有熱多寒少。草果飲子。或青皮飲。寒多。養胃湯。或四獸飲之類。

草果飲

草果一錢

川芎一錢

紫蘇一錢

白芷一錢

良薑七分

甘草八分

陳皮八分

青皮一錢

水煎。

四獸飲

人參一錢

白朮一錢

陳皮二錢

茯苓二錢

甘草五分

草果八分

烏梅三箇

半夏六分

加薑棗水煎服。

勝金丹

常山酒蒸

尖檳榔一兩

共爲末。醋糊丸。未發時先吞三十丸。至五更再吞十五丸。溫酒送下。丸如菀豆大。發時切不可服。

養胃湯

見胎前

產後傷風

產後血氣大虧。縱有寒。不可大發汗。芎歸湯加人參、蘇葉、葛根微汗之。故鄭氏只用帶鬚葱煎湯服。如熱不止。黃龍湯加芎歸。大熱不得已。加知母、黃連。可攻可溫者。臨時斟酌。不可妄投峻劑。耗損真元也。慎之。

產後泄瀉

產後泄瀉。小便不利而瀉。此陰陽不分之故。宜胃苓湯。腹痛是食積。宜加消食藥。惡露不行。宜行血。若外感風寒而內傷飲食者。宜養胃湯。惡露已淨。不必活血。如未淨。加歸尾、桃仁之類。如久瀉不止。養胃湯加肉桂、肉果。如挾寒腹痛。腸鳴。小水清白不濁。口不渴。加肉果炒白芍。如熱瀉。腸垢口渴。時痛時瀉。火也。宜薑炒黃連、木通。或瀉或不瀉。或多或少者。痰也。肯堂云。產後瀉利。不可混治。以補脾爲主。如白朮茯苓神麴甘草陳皮之類。兼以消食理氣之劑。

君苓湯

白朮二錢

茯苓二錢

猪苓一錢

澤瀉一錢

水煎服。

胃苓湯卽君苓湯加平胃散

產後心腹痛

產後敗血凝聚。氣上衝心作痛。大巖蜜湯。七情相干。血與氣併心痛。元胡索湯。敗血攻心腹痛。失笑散。寒邪腹痛。理中湯。

大巖蜜湯 治氣上衝心。

當歸一錢

獨活一錢

乾薑一錢

熟地一錢

甘草五分

北細辛七分

吳萸一錢

肉桂一錢

遠志一錢

白芍一錢

水煎服。

元胡索湯 治心腹痛。

元胡一錢

當歸一錢

白芍一錢

厚朴一錢

文朮一錢

三稜一錢

川練子一錢

木香一錢

川芎二分

桔梗二分

檳榔一錢

黃芩八分

甘草七分

水煎服。

失笑散 治胃脘痛。

蒲黃

五靈脂

產後咳嗽

產後咳嗽而惡露未盡。二陳、四物加活血藥已淨。知母茯苓湯。或發熱。入物加黃柏。知母少許。或傷風咳嗽而痰多者。其治法。載傷風條下。有惡露上攻。肺經受邪。咳嗽。二母散。血風感寒熱濕氣。咳嗽痰涎。坐臥不安。四陰煎。有外感者。參蘇飲。二母散。治惡露上攻而嗽。

知母一兩

貝母一兩

人參八錢

茯苓八錢

桃仁十九粒研

杏仁十四粒研

每服七錢。煎至八分。細細呷下。

四陰煎。保肺清金。

生地三錢

麥冬二錢

白芍二錢

百合二錢

沙參二錢

生甘草一錢

茯苓錢半

水煎服。夜熱盜汗。加地骨皮。痰多。加川貝。

產後鬱冒。由胃弱不實。多汗故也。血虛必厥。厥必鬱冒。白薇湯。產後三疾。鬱冒則多汗。汗多則大便秘結。此皆去血過多。難以藥治。蘇麻粥主之。

白薇湯。治汗多。

白薇三錢

當歸三錢

人參錢半

甘草七分

水煎服。

蘇麻粥潤腸。

蘇子、麻仁不拘多少。研爛取汁。煮粥食之。

產後脚氣

產後熱悶。氣上冲逆。轉爲脚氣。小續命湯。去麻黃、石膏、附子。由平素感受風寒暑濕燥火之氣。因產後血氣不足。遂襲於足經。因乘虛而發者。獨活寄生湯。

獨活寄生湯

獨活一錢

桑寄生八分

杜仲一錢

牛膝一錢

細辛七分

秦艽一錢

白茯苓一錢

白芍一錢

肉桂六分

川芎八分

防風七分

人參八分

炙甘草七分

熟地一錢

當歸一錢

共爲粗末。水煎服。

產後遍身疼痛

產後遍身疼痛。因早勞動行走。致氣血升降失常。留滯於關節間。筋脈牽引。或手足拘攣。不能伸屈。故遍身肢節作疼。宜趁痛散。惡露不淨。流於遍身肢節。腰脚關節等處作痛。宜如神湯。趁痛散。治敗血流經。

當歸一錢

肉桂八分

白朮一錢

牛膝一錢

黃耆一錢

獨活八分

薤白一錢

寄生一錢

薑三片。水煎服。

如神湯 治肢節疼痛。

厚朴一錢

半夏六分

枳殼七分

白芍八分

木香六分

肉桂六分

陳皮六分

茯苓六分

人參六分

甘草五分

蒼朮一錢

茴香一錢

香附七分

桔梗八分

乾薑六分

川芎七分

當歸一錢

白芷八分

木瓜六分

桃仁六分

水煎服。

產後氣喘

產後氣喘。由營血暴竭。氣無所主。觸發於肺。故至喘急也。此孤陽絕陰。難以治療。十死一生之證也。若敗血停滯。上逆於肺。作喘者。奪命丹主之。鄭氏謂產後發喘。最爲危險。經曰。諸喘皆凶。然此亦當視其有痰無痰。痰之多少。以斷其吉凶。若痰壅盛而喘。痰聲必大作。此痰犯肺。金肺不寧也。法當豁痰。其喘自定。其喘猶可救。旋覆花湯主之。惡露未盡者。加生薑自然汁。及行血消食藥。已淨而小腹不痛者。加片苓服之。若不咳而喘者。此謂肺火所迫。乃真喘也。證多不治。不必下藥。

產後呃忒

產後發呃。此症不宜見之。新產須辨症施治。如惡露未淨者。多是血迷上衝所致。當服行血之藥。已淨而呃者。多因受寒也。法當順氣調脾。如紫蘇飲之類。

產後嘔吐

產後嘔惡。胃氣不化也。惡露未行者。二陳、四物加減活血藥。若已行者。不必活血。若胸滿而嘔逆者。食也。宜消導之。如飲食入胃而卽嘔者。火也。納穀少頃嘔出者。胃寒也。宜白朮、丁香之類治之。

產後吞酸

產後吞酸者。少見。或因病久脾胃虛弱。致有此患耳。如惡露淨後。二陳湯。或四物湯。加薑汁炒黃連、吳茱萸之類。

產後不語

產後噤口不語。乃敗血裏迷心竅所致。不須恐怖。但服八珍散。一月自安。亦有痰迷心竅者。二陳、四物加竹瀝薑汁甚妙。如產後着風不語。小續命湯主之。加薑汁。其法最穩而取效亦速。

產後頭痛

產後頭痛。有氣血虛弱、痰厥、着寒着風之不同。不可一例而施治。氣血虛弱者。四物湯。痰厥者。二陳湯。着寒着風者。芎蘇飲。隨症加減。有產後感於異症。手足牽搐。咬牙頭痛昏冒。先服四物。後服秦芫丸。

芎蘇飲

川芎

蘇葉

枳殼

前胡

葛根

木香

桔梗

甘草

陳皮

半夏

薑三片水煎服。

秦芫丸

川芎

當歸

秦芫

荊芥

共爲末。醋糊丸。每服四錢。

產後胞損

產後胞損。血水淋漓。茅根湯。敗血不止。淋漓不休。烏金散。血不止。久而四肢乏力。沉困。牡蠣散。或產時穩婆誤損其尿胞。以致日夜淋漓者。參朮膏主之。

茅根二錢

瞿麥錢半

葵子二錢

茯苓錢半

人參一錢

蒲黃一錢

桃膠一錢

滑石錢半

半夏三分

石膏一錢

紫貝一箇燒

燈心。薑水煎服。

烏金散

麒麟竭一兩

百草霜一兩

元胡一兩

當歸一兩

男髮灰一兩

鯉魚鱗一兩

肉桂一兩

赤芍一兩

松墨醋浮煨一兩

爲末。每服二錢。空心酒下。

牡蠣散

牡蠣粉二錢

川芎一錢

茯苓一錢

熟地一錢

龍骨二錢

續斷一錢

當歸一錢

艾葉一錢
酒炒

人參一錢

五味十粒

地榆一錢

甘草五分

薑三片。大棗二枚。水煎服。

參朮膏

人參一斤。白朮一斤。煎成膏子。每用三錢。白湯下。

產後小便不利

產後小水不通。四物湯去生地。加赤苓、木通。又法。用炒鹽一撮。麝香少許拌勻。填產婦臍內。外以葱頭十餘莖。縛作一束。切片如餅子樣。須手指厚。先將鹽麝二物納臍中。後將葱餅加於其上。用艾炷與葱餅一樣大灸之。待熱氣入腹方止。其小便自通矣。

有大小便俱閉而惡露不行者。服行血藥。惡露已淨。用四物湯。黃芩、山梔、枳殼、木通、赤苓之類。如惡露不行。大便瀉而小便閉者。但可服五苓散。加行血藥。如赤芍、紅花、元胡索等類。不可服胃苓湯。蓋蒼朮、厚朴能止血故也。

產後衄血

產後氣消血敗。營衛不理散亂。流入諸經。不得還元。故口鼻黑氣起。及變鼻衄。因產後虛極。變爲此症。則胃絕肺敗。多至不救。用犀角地黃湯。或可挽回百一。

犀角

生地

白芍

丹皮

水煎服

女科切要 卷七
產後衄血

女科切要

清海虞 吳道源本立纂輯

鄞縣 曹赤電炳章圈點

卷八

產後無乳

婁氏曰。累經產而無乳汁者。亡津液故也。須服滋補之藥以動之。若雖有乳汁。而又不甚多者。須服通經之藥以動之。仍羹臙引之。蓋婦人之乳。資於衝脈。與胃經通故也。大抵婦人素有疾。在衝任經者。乳汁少而其色帶黃。所食之子。怯弱多病。又曰。乳汁不行。有氣血盛而壅閉不行者。有氣血弱澀而不行者。虛當補之。實當疎之。疏用通草、漏蘆、土瓜之類。補用鍾乳粉、猪蹄、鯽魚之屬。雲臺立效方。

元米 半合

蒿苳子 半合

生甘草 五錢

右煎汁一升。去渣分作三服。乳汁立下。

湧泉散 治婦人乳汁絕少。

瞿麥穗

麥冬

龍骨

山甲炙

王不留行

右爲細末。每服一錢。熱酒調下。後服猪蹄湯。再用油木梳於左右乳上。各梳三十梳。每日三服。

胎前乳汁自出者。謂之乳泣。又名乳注。生子多不育。產後乳汁自出。蓋是體虛。宜服補藥以止之。亦有乳多急痛而出者。溫帛熨之。漏蘆散亦可。

漏蘆散

漏蘆 二錢半

蛇殼 一條

瓜蒌 十隻

爲末。酒調服二錢。

產後崩淋帶下

產後崩淋。及赤白帶下者。皆因七情內傷。或下元虛弱。王叔和曰。始病血崩。久則

血少亡陽。故白滑之物。下流不止。是本經血海先枯。津液消亡乾涸。不能交養筋骨。用藥之法。須以本部行經藥。爲引爲使。用辛甘油膩之物。潤其枯涸。而滋益津液。以大辛熱之藥。裨補陽道。生其血脈。以寒苦之物。瀉其肺。以人參補之。微苦濕藥佐之。以治此症之大法也。

崩中者。由藏府傷損。衝任二脈。氣虛血虛之故。此二脈爲經裏之海。氣血之行。外循經絡。內榮藏府。府因衝任二脈之氣。傷虛極。不能約制。厥經之血。故忽然而下。謂之崩中。暴下。治當大補氣血之藥。舉養脾胃。微加提鎮。墜下心火之藥。宜補心瀉火湯。血自止矣。凡淋帶之症。俱是痰積流下。滲入膀胱而成也。治宜升提。以提其氣下陷。用二陳加二朮。肥人多濕痰。加半夏。南星。炒黃柏。川芎。椿皮。青黛。瘦人多火。加黃柏。椿皮。海石。滑石。蛤粉。赤白兼下。加炒蔓荊子末。酒調下二錢。

產後陰脫

婁全善曰。產後陰脫者。因產時努力太過。以致陰脫。狀若脫肛。陰戶挺出。逼近腫痛。舉重房勞。皆能致此。清水續續。小便淋漓。用硫黃。烏鰂骨。各五錢。五味一分。爲

末。數患處。兼服參耆歸草升麻等補藥自愈。

丹溪治一婦人。三十餘歲生女。二日後。產戶一物如手帕。下有帕尖。因思之。此由胎前勞乏傷氣。或肝痿致此。却喜血不甚虛。其時歲暮天寒。恐冷乾壞了。急與參耆一錢。白朮五分。當歸一錢半。升麻五分。三貼連服之。卽上得汗。遍身乃安。但下而沾蓆處。乾者落一片。蓋脂膜也。食進能眠。診其脈皆濡。左略弦。視其形却實。與白朮白芍各五分。陳皮一錢。薑一片。連三四服遂安。

又一婦人產子後。陰戶中有一物。如合鉢狀。有兩歧。其夫求治。予思之。此子宮也。必氣血虛弱而下墜也。遂用升麻黃耆大料二服與之。半日後。其夫復來曰。服二貼後。覺一聲響。視之。已收陰戶訖。但因經宿乾着蓆破一塊。如掌心大。粘蓆。其妻在家哭泣自傷。恐損破。不能復生。予思之。此非腸胃。乃糟粕也。何駭之有。肌肉破。尙可復完。若氣血充盛。可以生滿。遂用四物湯加人參。與百貼。三年後。始復生子。

產後玉門腫痛

凡產後陰腫。下脫內出。玉門不閉。用石灰一升。炒極熱。湯二升。投灰中。俟溫冷澄。

清。坐水中以浸玉門。斯須平復如故。
產後玉門腫痛。用海螵蛸去甲。研細末。用雞子殼調塗。其腫立消。
產後玉門不斂。此氣血不足也。宜補中益氣湯。倍加升麻。

產後脇痛

產後脇痛。乃頑痰瘀血也。左痛爲痰。右痛爲血。宜補中益氣湯。頑痰在左。加白芥子。瘀血在右脇。加枳殼。柴胡。

產後陰癢

產後陰癢。或腫痛。此濕熱也。宜藥湯熏洗。

荊芥	白芷	白礬	川椒
杏仁	桔梗	細辛	

煎湯熏洗。

亦有產後陰癢。用蛇牀子一兩。白礬二錢。煎湯頻洗。其癢自止。

產後下血成片

產後忽然下血成片。如崩狀。此因氣血大虛。脾胃又弱。以致氣血攻於脾胃。胃氣不順。則成此症。此營衛衰敗也。當和血理氣。服四物止經湯。

熟地

白芍

當歸

川芎

柏葉

茯苓

香附

阿膠

蒲黃

白朮

棗仁

陳皮

人參

甘草

產後尿胞墜下

產後偶取重物。致尿胞墜落在外不收。此氣弱血冷。移取重物。努力而致傷臟。因而墜下不收。或三四月。或半年一載。不能還元者。宜服收陰散。

人參

白朮

甘草

肉桂

枳殼

升麻

吳萸

沉香

加四物湯。

絕產不育

產婦生育艱難。意欲斷產。非細事也。或因生產不順。每育則鉤割。或因不正。或娼尼等。不願孕育而欲絕胎者。每以毒藥斷之。殊不知產育雖斷。而其受病更深也。智者鑒諸。

三白丸 治婦人不生子。

白 苾

白 斂

白 茯苓

秦 艽

厚 朴

當 歸

吳 萸

人 參

肉 桂

乳 香 各四錢

爲末蜜丸。如桐子大。每服三十丸。空心酒下。

產後乳裂

產婦乳裂。流脂疼痛。用秋冬繻拆茄子。瓦上煨灰。白蜜調敷。

產後陰戶翻出

產後陰戶翻出腫痛。用石灰煎湯。先熏後洗。

產後脫髮

產後脫髮。用申薑二兩。薔薇根一兩。煎湯刷之。卽不脫矣。

附婦人雜病諸方

眉毛脫落。硫黃一兩。研細末。醋調塗眉間。眉毛漸出。

又方。用白芥子三錢。半夏三錢。爲末。生薑汁調搽。卽出。

女人赤鼻。枇杷葉五錢。去毛。山梔四錢。苦參五錢。蒼朮五錢。米泔浸。共爲末。每服一錢五分。白滾湯下。其赤漸退。

女白癰瘋。白附子五錢。雄黃五錢。共爲末。薑汁調白芥蒂蘸藥擦之。其瘋漸退。女人面上赤疵。常以銀扁烘熱。日日揩之。久久自化。

女人髮鬢墮落 桑皮一兩。柏葉一兩。水煎七八沸。去渣頻洗。

婦女頭髮黃赤 用生柏葉末一升。豬脂一斤。搗爛和丸如彈子大。每用以布包。

一丸。投米泔中化開沐之。其髮漸黑。

婦女齒疎 用蘆甘石、寒水石等分。研細。每早擦之。忌用牙刷。久久自密。

女人手裂 用白果嚼爛。夜夜塗之。甚妙。

女人時流清涕 用葶撥研末。吹之即止。

女人脚拆 用生羊腿骨內水。將雞羽蘸之。潤開拆處。久久自合。永不再發。

女人汗斑 硫黃、雄黃、蜜陀僧、白附子、鉛粉、滑石、光粉各等分爲末。先將皂莢煮

爛。擦後用藥末唾津和塗之。

婦人乳癰 癢不可忍。用銅碌、輕粉爲末。菜油調敷。其癢漸止。

女人鼻淵 用藕節、川芎各等分。炒研爲末。每服二錢。米飲調下。

女人腦漏不止 用胎髮一兩。將絲綿包煨存性。加入冰片、麝香、辛夷。共爲末。吹

入鼻中。七八次即愈。

手足皸裂洗方

麻黃五錢

當歸五錢

苦參一兩

蛇牀子五錢

蕪荑一兩

靈仙八錢

防風五錢

荊芥五錢

皂莢一兩

蒺藜一兩

煎湯熏洗。

雞眼疼痛。雄雞肝一具。竹片剖露。入百草霜拌勻。濕草紙煨熟食之。雞眼軟而

自脫。

女人鵝掌瘋。蕪荑一兩。五倍子一兩。共爲末。醋調敷。七日不可下水。聽其自脫。

二次全愈。

老婦齒敗口臭。用川芎含口中。卽不臭。

解頤脫臼不止。用生南星爲末。薑汁調敷兩頤叉。一夜卽止。

女金丹 治婦人諸病。

金華香附十五兩。分作五宗。每宗如法五製。

三兩 蓬朮艾葉各一

三兩 元胡川芎各一

三兩 三棱柴胡各一

三兩 紅花一兩半烏梅

三兩當歸三兩煎湯浸

春浸五日。夏浸三日。秋浸七日。冬浸十日。曬乾爲末。晚米飯爲丸。如桐子大。臨臥酒下。如腹痛。加檳榔、青皮各一兩半。

保產神方

當歸

川芎各半錢

厚朴七分

枳殼三分炒

黃芩八分

艾葉八分

絲子半錢炒

川貝一錢

羌活五分

荆芥八分

白芍二錢

甘草五分

孕婦六七箇月即可服。加薑三片水煎。

女子腋臭。用蚘子殼一對。將蜘蛛一個填入。紮緊。瓦上煨。加雄黃七分。生礬七分。硫黃五分。密陀僧一錢。俱煨存性。研細末。隔夜更衣。次早先將滾水洗。待乾。

卽本人自便調擦立驗。

又方。用青木香二兩。醋浸夾於腋下。溼者。研末摻之。

脫骨湯。女子纏足少痛。

杏仁二錢

桑皮四錢

朴硝五錢

乳香一錢

水煎。置足於湯。熏洗十餘次。纏則不痛也。
換肌散 治婦女瘡疥久不愈。肌膚粗裂。

土茯苓

銀花

荊芥

熟地

製首烏

共爲末。蜜丸。

大內瘡藥方

大風子肉二兩

冰片三分

麝香三分

細辛二錢

白芷二錢

滑石五錢

安息香五錢

芸香三錢

蘇合油三錢

川椒三錢

共爲細末。以油核桃肉三兩。搗和爲丸。浴後擦之。

陰吹

仲景曰。陰吹者。胃氣泄。陰吹而正喧。此穀氣之實氣。從溺處而泄也。治宜膏髮煎。

猪膏八兩

亂髮雞子大三枝

右二味和一處煎之。髮消藥成服之。病從小便出。

交腸

仲景曰。交腸。乃大小便易位而出也。此因醉飽房勞。或大怒氣亂。真藏氣垂。不循常度。泌別失職之所致也。治宜五苓散。或四物湯。加海金沙、木香、檳榔、木通、桃仁之類。

陰疝

張子和曰。婦人脾胃虛寒。氣滯不行。攻刺心腹。痛連胸脇。或因瘀血作痛。狀如黃瓜。在小腹兩傍橫骨端紋中。孰謂婦人無疝乎。治宜蟠葱散。桃仁當歸湯。

蟠葱散

青皮一兩五錢

釘皮

砂仁各一兩

三稜

檳榔各一兩

乾薑

肉桂各五錢

元胡七錢

蒼朮五錢

甘草一兩

右爲二劑。薑棗葱煎熱服。臍下冷痛。加吳萸、茴香。

桃仁當歸湯

桃仁二錢

歸尾

元胡各半錢

川芎

生地

赤芍炒

吳萸

青皮醋炒

丹皮八分

薑三片。水煎。食前服。

化氣丸 治經行腹痛。

香附 青皮

陳皮

砂仁

木香 川芎

茴香

右爲末。麴糊丸。

異功散 調理脾胃。

人參 白朮

茯苓

甘草

陳皮

水煎服。

附婦人修飾

粉滓面黥

爐甘石二兩

白 斂計二兩

爲細末。雞子清夜塗旦洗。能白。

口香辟臭

白蔻仁二錢

北細辛二錢

爲末。睡時含之。

唐天后澤面法

治婦女粉刺黑斑

五月五日。收帶根益母草。紫花者。曬乾燒灰。以商陸根搗自然汁。加好醋和搜灰作餅。炭火煨過。收之。半年方可入面擦之。能潤肌去滯。蘇頌曰。唐天后鍊益母草澤面。五月五日。採益母根苗具者。勿令着土。曬乾。搗爛。以麵水和成丸。如雞子大。再曬乾。仍作一爐。四旁開竅。上下置火。安藥中央。大火燒一炊久。即去大火。留小火養之。勿令火絕。經一伏時出之。置器中。研極細。無聲。收用。如澡豆法。日用一方寸。每灰十兩。加水飛滑石一兩。麝脂一兩。研勻用之。一月之後。面如美玉。

太真紅玉膏

名女人面脂

輕粉一兩

杏仁

去皮一兩

滑石

水飛一兩

冰片

一分

麝香少許

右爲細末。蒸過。入冰麝再研。以雞子清調勻。洗面後塗之。旬日。膚若凝脂。

悅澤面容

冬瓜仁五兩

桃花四兩

白楊皮二兩

爲末。米飲服方寸匕。日三服。欲白。倍加冬瓜仁。欲紅。倍加桃花。服三十日。面白如玉。五十日後。手足皆白。一方用陳皮。去白楊皮。此宮中嘗服之劑。

面生痱瘡

王瓜根搗汁。漿水和勻。入冰片少許。入夜洗面塗藥。百日後。肌膚柔嫩。痱瘡全除。玉容散。治婦女面無光彩。顏色白而不潤澤。

香芷五分

肥皂一兩

細辛錢半

甘松二錢

荊芥五錢

木賊三錢

白丁香二錢

杏仁三錢

花粉五錢

麝仁五錢

藿香葉三錢

天蟲五錢

山奈錢半

陀僧五錢

元明粉三錢

輕粉二錢

硫黃一錢

鉛粉一兩

蘇合油五錢

冰片一錢

右藥共爲細末。臨睡吐津調勻。擦面過夜。次日清早。用煮酒一盃。沖熱水洗去。再拍玉容粉。

玉容香粉

白果洛一升去殼打汁

杏 洛皮一兩去打汁

上甘石飛一兩研

滑 石水飛三兩

元 寸二分

蘇合油五錢

冰 片四分

上鉛粉去鉛一兩

右藥研極細末。用泉水漂去黃水。後入冰片、麝香、蘇合油。加珍珠末五分。再以胭脂水調和收貯。臨用加白蜜少許。旬日之後。面白如脂。夫婦不相識也。
婦人面黑粉滓

白石脂二兩

白 斂兩十二

山 奈一兩

共爲細末。雞子清調敷。夜塗旦洗。渣去面白。

女人雀斑

異授雀斑方

用頭生雞子一個。打破頂。去黃留白。加大疋砂一兩研細。填入雞卵內。上用綿紙封固。貯哺雞肚下哺之。待雞雛出。取。先將肥皂打除面上油。後用前雞子清

塗之。其斑漸去。一月之後。白玉無瑕。此方貴妃常用。乃西王母枕中方也。寶之。
又方

肥皂四兩

甘松一錢

山奈一錢

細辛一錢

白芷一錢

丁香一錢

鷹糞五錢

右爲末。棗肉爲丸。洗面後用藥擦之。其雀斑漸除。再以玉容香粉拍之。則白而嫩亮。光彩射人。

又方

鷹糞五錢

山查五錢

蜜陀僧五錢

爲細末。將乳汁調和。夜睡擦之。一月後雀斑盡除。加蘇合四錢更妙。清早洗去。久服身香。

桂心

冬瓜仁

松樹皮

爲末。棗肉爲丸。久服遍身香氣透鼻。

洗面擦藥

櫻桃皮

雀卵

紫背浮萍

牙皂

白梅肉

研細和勻。日日洗面擦之。肌膚漸嫩。

玉容肥皂

白元米一升

肥皂去皮核四兩

天花粉八兩

滑石三兩

胡桃肉八兩

粉葛三兩

白丁香一兩

真粉三兩

橄欖去核四十箇

北細辛二兩

牙皂八兩

棗肉四兩

蒼耳草搗汁。同元米飯和搗爲丸。如彈子大。洗面後擦之。

四精膏

治婦人身
澀不滑

人乳

象精

白蜜

藕汁

各等分熬膏。加蘇合油調勻。浴後滿身塗之。一月之內。遍體嫩滑香潤。此宮中日用之方也。

面脂手膏

羊乳三斤。羊胰子三副。搗和。每夜洗面塗之。清早洗去。一月之後。手嫩面澤。

面體薰黑

殺羊脛骨一條爲末。雞子清調敷。以米泔水洗之。夜塗旦洗。三日如素。

面粗皮黧

胰子五具

蕪青子二兩

杏仁一兩

花粉一兩

醇酒浸之。夜塗旦洗。每日用之。老者返少。少者嫩白。

令面光澤

母猪蹄一具。煮汁如膏。夜塗旦洗。婦老漸嫩如少。

女人面上癰痕

白蒺藜一兩

山梔一兩

爲末。醋調。夜塗旦洗。疤痕漸脫。

面黑令白

冬瓜一箇。用竹刀去皮切片。勿經鐵器。酒一升半。煮爛去渣。熬成膏。夜塗旦洗。肌膚漸白。

女科切要終



\$.30