

小兒衛生總微論方

五

中國醫學大成第十集

兒科類甲
兒科叢刊之一

小兒衛生總微論方

五

上海大東書局印行

小兒衛生總微論方

卷十一

五疳論

小兒疳病。諸論叢雜。唯五疳之說爲當。其證候外則傳變不同。內則悉屬五藏。一曰肝疳。其候搖頭揉目。白膜遮睛。偏身多汗。喜覆面而臥。眼中澀癢。色澤青黃。髮豎頭焦。筋青胸熱。腹中積聚。下利頻多。日漸羸瘦。二曰心疳。其候渾身壯熱。頰赤面黃。心胸膈腕煩燥滿悶。口舌生瘡。盜汗多驚。下利膿血。神彩衰耗。三曰脾疳。其候腹大如鼓。上多筋脈。喘促氣粗。心腹壅脹。多啼欬逆。水穀不消。脣口乾燥。好食泥土。情意不樂。憎明好暗。利多酸臭。肌肉內消。形枯力劣。甚則大肉陷下。四曰肺疳。其候欬嗽氣逆。皮毛焦落。咽喉不利。揉鼻齧甲。口鼻生瘡。腹內氣脹。乳食不進。大腸不調。泄利不常。憎寒體慄。糞中米出。洞下白泔。五曰腎疳。其候上熱下冷。寒熱時作。齒斷生瘡。耳焦胸熱。手足逆冷。吐逆滑泄。下部生蟲。脫肛不收。夜啼饒哭。

漸成困重。甚則高骨乃敗。小兒疳疾。乃與大人勞瘵相似。故亦名疳勞。大人勞者。因腎藏虛損。精髓衰枯。小兒疳者。因脾藏虛損。津液消亡。病久相傳。至五藏皆損也。大人勞疾。骨削而氣耗。小兒疳疾。腹鼓而神羸。以其病之始也。其藏之傳受不同故也。至於傳久。五藏皆損。則一也。故五損者。經言一損於皮毛。皮聚毛落。肺也。二損於肌肉。肌肉消瘦。飲食不爲肌肉。脾也。三損於血脈。血脈虛少。不能榮於藏府。心也。四損於筋。筋緩不能自收持。肝也。五損重於骨。骨痿不能起於牀。腎也。病極則大肉陷下。高骨敗壞。以至死矣。凡小兒疳疾。多是下藥所壞。小兒藏府嫩軟。易虛易實。一切於諸病誤行轉下。致脾胃虛弱。津液內耗。皆能成疳。且如潮熱。日中時發者。是脾藏虛。心藏實。日中乃心。用事之時。而內發其熱。法當先補其肝母。肝乃心之母也。肝實而後瀉心。心得母氣。則平。而潮熱乃愈。譬見潮熱。妄謂其實。便以大黃牙消等冷藥利之。利既多而不能禁。則津液內亡。漸成疳也。又如癖病發作。寒熱飲水。脇下有形而硬痛。法當用藥漸消磨之。醫見有癖。便以巴豆。硃砂輩駛藥下之。下既多而津液耗。則漸成疳也。又如傷寒五六日之後。有下證。因以冷藥下之。太過。致脾胃虛而津液耗。即便引飲不止而熱生。如此則熱氣內耗於津液。肌肉外消而

羸瘦。他邪相干。證變百端。亦因成疳也。又如吐瀉病久。津液耗亡。亦能成疳也。又如小兒食肥甘物多。因傷爲積。則蘊利發熱。津液內耗。亦能作疳。故甘卽疳也。聖濟經云。肥甘之過。積爲疳黃。乃謂是矣。故諸病皆能成疳也。甘疳之候。眼濇多困。或生白膜。脣口淡白。身色黃黑。食泥土生米。喜臥冷地。疥癬頭瘡。洞泄青白黃沫。下利膿血。腹滿喘欬。耳鼻生瘡。髮稀作穗。頭大項細。肚大青筋。脚手垂躄。瘦瘠飲水。筋痿骨重。形劣疰羸。皆其證也。本因脾虛津耗。久則傳變而成。傳緩者則爲慢疳。傳緊者則爲急疳。又當辨認冷熱肥瘦。其肥熱疳者。乃因食肥甘積聚生熱而作。故多病於初也。錢乙治用黃連圓。其瘦冷疳者。乃因轉下瀉利生冷而作。故多病於久也。錢乙用木香圓。通治冷熱疳者。錢乙用如聖圓。凡治小兒之病。必量虛實冷熱。不可妄行轉下。恐變生疳也。若病初之脾虛津少。發渴欲飲者。當生胃中津液。煎錢乙白朮散與服。惟多則纔好。其錢乙諸方。本集載之。

又有一證。其候腹中有塊。身體羸瘦。毛髮焦稀。腹大氣喘。冷利脫肛。喫食愛吐。俗曰無辜。寶鑑云。按玄中記有無辜之禽。一名姑護。一名鈞星鬼。但喜夜飛。人有暴露小兒衣袂襁包。其禽飛立在上。令兒患此疾也。予性好尋閱異書。十餘年間。竟

不知玄中記之所出。又此禽既云夜飛。必有形狀。世間亦莫之曾見。是必巫覡假以鬼名而偽言者也。今鮮其證而對其病。實乃疳疾之候耳。特爲破其邪說。以祛惑亂矣。

治五藏疳方

地黃圓 治肝疳拘急。疳氣入眼隱澀。或生白膜。暈腎赤脈等疾。

熟地黃 入錢

山茱萸 取肉 四錢

乾山藥 四錢

澤瀉 三錢

牡丹皮 去心 三錢

白茯苓 去黑皮 三錢

右爲細末。煉蜜和圓。桐子大。三歲下兒一二圓。上者三四圓。溫水化下。空心。

熊膽天麻圓 治肝疳羸瘦。搖頭揉目。百脈拘急。

熊膽

天麻

羌活 去蘆

蟬殼 去土

使君子 去殼

胡黃連 各一兩

蘆薈

乾蟾 塗酥炙黃 各半兩

右爲細末。粳米飯和圓。黍米大。每服十圓。煎荊芥湯化下。量大小與。無時。

奪命丹 治心疳體熱。驚搐煩渴。髮稀肚大。泄瀉羸瘦。

硃砂

麝香

牛黃

腦子

蘆薈

沒藥

硼砂

熊膽

麒麟竭半兩

粉霜一錢

使君子去殼十箇

青黛三錢

右爲末。滴水。和圓。疏豆大。每服一粒。薄荷水化下。日三。兒大二三圓。

硃黃丹 治心疳挾驚發熱煩渴盜汗羸瘦。

硃砂一分

天竺黃半兩

乾全蠍二十一箇 微炒去毒 天漿子十四箇 去

人參去蘆一兩

胡黃連一兩

青黛一分

龍腦一錢

右爲末拌勻。煉蜜和圓。黍米大。每服十粒。人參湯化下。無時。

黃聖圓 治脾疳發黃身腫。

黃土一兩

陳皮去白一兩

木香一分

巴豆二十箇 去皮

右爲末。飯和圓。粟米大。每服三二圓。煎黑豆汁送下。無時。

木香煎 治脾疳因不知飢飽積滯內停腹大脚細下利無度。

南木香一兩

肉豆蔻一兩 裹

乾蟾二箇

胡黃連一兩

使君子去殼一兩

五靈脂一兩

巴豆七箇 去皮心膜 紙裏出油盡

麝香一分

右爲末細勻。滴水和劑。入石臼杵一二百下。圓如黍米大。每服一二圓至五七圓。量大小與溫生薑湯下。乳食後。一歲下者一圓。二歲上者三圓。以意加之。

肉豆蔻丹

治脾疳如前。

肉豆蔻

裹一兩麵煨

使君子

去殼一兩

青

皮

去鹽一兩炒黃

牽牛子

一分炒黃

蘆

薈一分

麝

香半錢

右研勻細。糯米飯和圓。黍米大。每服十圓。生薑湯下。食後。

香連散

治脾疳泄瀉。腹大脚細。漸成瘦弱。及諸脾胃不和。氣不調順。並能治之。

木

香一分

黃

連去鬚半兩炒

訶

子

煨去核取皮一分

肉豆蔻

三箇麵裹煨去麵

甘

草一分

右爲細末。每服一字或半錢。米飲湯調下。乳食前。

麝香丹

治肺疳皮毛枯燥。欬嗽上氣。

胡黃連

一兩半

夏半兩湯洗七次

紫蘇子

微炒一分

五味子

一分

乾

蟾一箇炙酥焦

麝

香一分

蘆

薈一分

硃

砂一分

右爲末細勻。棗肉和圓。黍米大。每服五七粒。米飲下。無時。

靈砂丹 治肺疳因欬嗽羸瘦。皮枯毛落。

人

參半去蘆

甜葶炒一分

五靈脂一分

胡黃連味爲末

辰

砂半兩

麝香研一分

蘆薈研一分

杏仁去皮尖

右爲末拌勻。粳米飲和圓。黍米大。每服十圓。人參湯下。無時。

石綠散 治腎疳耳上生瘡。及治肥疳頭瘡鼻爛。浸久不差。

石綠

白芷各等分

右爲末。先以生甘草水洗瘡。拭乾傅藥。一日愈。

蛙雞灰散 治腎疳成蠱腸虛。蟲蝕下部肛腸等。

右以長脚蛙青背一枚。雞骨一分。同燒爲灰。細研爲末。吹入下部中。令深入。數

用大效。

桃白散 治如前。

桃根白皮一兩

黃蘗蜜一兩

黃連去鬚

蛇蛻燒灰

乾蝸牛燒灰

青州棗五十箇

右爲細末。入定粉一分。麝香一錢。同研勻。每服一字至半錢。粥飲調下。乳食前。量輕重加減用藥。

如聖丹 治如前。

乾 蟾七箇燒灰 蟬殼去土盡

蜈蛇膽 一分

大 棗一箇去核燒灰

黃 丹研一分

定 粉研一分

麝 香一錢

右同拌研勻。細用。好醋看乾溼拌勻。白杵一二百下成膏。圓黍米大。每服五七粒。米飲下。量大小加減。又化三二粒塗調患處。若蟲出乃愈。

爲金膏 治腎疳入經。灌注陰囊。黃亮色腫。

通 草一分 黃 檗一分 大 黃一分

右同研爲末。每用一錢。以豬膽調成膏。於陰腫處徧塗之。如未退。更煎蛇牀

子湯洗之。再調塗必效。

二肝圓 治疳利不止。

龍膽草去蘆一兩 漏 蘆去蘆一兩 菖 蒲節一兩九 胡黃連半兩

地榆

半兩以上
先爲末

雞肝

一兩
肝一兩

豬

肝一兩
肝一兩

右將藥末入二肝內裹定。以水二盞。入鹽少許。煮至肝熟。於石臼中杵一二百下成膏。圓黍米大。每服十粒。麝香湯下。食前。

金靈散

治腎疳時久。骨沉力弱。項細頭重。致天柱骨倒。不能擎舉擡頭。

右以白僵蠶不拘多少。揀直者去絲嘴。炒焦爲末。每服半錢或一字一錢。薄荷酒調下。日三須臾用生力散塗之。

生力散

右以木鼈子三箇。葶藶子三十箇。各去殼取肉。同研細。每用一錢許。津唾調攤紙上。先緊抱定兒。揩項上。令熱貼。

治疳 治疳瀉方

赤石脂散

治疳瀉不止。

赤石脂

川芎

各等分

右爲細末。

量大小多寡。米飲調下。乳食前。

二聖圓

治瀉久不愈。羸瘦成疳。常宜服之。

川黃連

去鬚

黃檗

去粗皮
各一兩

右爲細末。將藥入豬膽內。湯煮熟取出。圓菜豆大。每服二三十圓。米飲下。無時。

竹筴圓 治疳氣泄瀉煩渴。其效如神。

好黃連

去鬚土一兩剉

吳茱萸

去枝梗一兩

右二味。以蜜相和拌勻。炒赤黃色。去茱萸。只用黃連爲末。薄糊和圓。蘿蔔子大。

每服十圓。煎竹茹米飲送下。無時。

六神丹 治疳氣羸瘦。藏府怯弱。泄瀉虛滑。乳食減少。引飲無度。心腹脹滿。

丁香

木香

肉豆蔻

各半兩並

子半兩煨

使君子

去殼半兩

蘆薈

細研一兩

右爲細末。棗肉和圓。麻子大。每服五七圓。溫米飲下。乳食前。服此藥於夏秋間。

應小兒泄瀉色白。或瀉多服藥不差者。但與之便定。

如聖圓 治冷熱疳瀉。

胡黃連

川黃連

去鬚土

白蕪荑

去扇炒各二錢使君子一兩

麝香

半錢

乾蟾

酒三箇剉

右爲細末。入蟾膏和圓。麻子大。二三歲以下者兒五七圓。以上者十圓。一十五

圓。人參湯下。食前。

木香散 治疳瀉腹脹。

木香

青皮去穢各一錢

陳粟米一合

巴豆

三十粒去皮同米炒至巴豆黑色去巴豆留米用

草豆蔻二箇一箇生用一箇裏煨熟

蜆

二箇去頭足翅糯米炒焦去米

右爲細末。每服一字或半錢。米飲調下。食前。

硫黃圓

治疳瀉色白如米泔。

巴豆

十四箇去皮膜出油盡

硫黃末一錢

青

黛末一錢

蕪

錢末去皮一

右拌研勻。細水浸蒸餅和圓。萊豆大。米泔水送下三圓。食前。

金粟丹

治疳瘦泄瀉腹大。好食泥土。

母丁香

草龍膽去蘆

厚

朴去粗皮生薑製

硃

砂研飛

青黛

一兩研各

夜明砂微炒

蟬

殼去土盡

訶子肉微炒

右爲細末。和蜜一半。麵糊一半。相和圓黍米大。每服十粒。米飲下。無時。

橘香圓 治疳積黃瘦。盜汗腹脹泄瀉。宿滯不化。氣促發喘。

陳皮

木香各一兩

薑黃切片

草豆蔻仁

白朮剉炒

牽牛子炒各半兩

右爲細末。滴水和圓。麻子大。每服十圓。葱白米飲下。食後。

木香芥粒圓 治如前。

陳粟米二合

巴豆半兩去皮膜同米炒至米焦去巴豆用米

陳皮半兩

檳榔研細一兩

人參去蘆一分

木香一分

右爲細末。飯和圓。芥子大。每用看虛實大小加減。三五圓。米湯下。不拘時。

麝香圓 治脾熱生疳泄瀉。氣弱不食。

川苦楝取肉一兩用童子小便浸一宿焙乾

巴豆半兩去皮膜同苦熱慢火炒至微紫色去巴豆不用

蘆薈

檳榔

燕麥去扇各半兩

沒石子一分

麝香少許

右爲細末。豬膽汁浸蒸餅和圓。黃米大。每服十圓。米飲下。食後。

吳婆散 治疳瀉不止。不計度數。漸成羸瘦。飲食減少。衆藥不效。

桃根白皮一分

黃

柏蜜炙一分

蕪去皮一分

黃連去微炒一分

沒石子半錢

厚朴去粗皮薑製一錢

木香一錢

丁香一錢

棟根白皮半分

檳榔一錢

右爲末。三歲以下兒每用半錢。以上至六七歲者一錢。煎紫蘇、木瓜、米飲調下。食前日三服。屢驗。此藥性小溫。暴熱瀉者不可服。一方無沒石子、丁香、檳榔三味。

水蓼丹 治疳氣羸瘦血利。

蛇蛻一兩

牛黃研末分別

雞頭殼一兩二味燒存性

胡黃連半兩

水蓼焙半兩

硃砂半兩

蘆薈一分

粉霜一分

右拌勻。細軟飯和圓。黍米大。每服五七粒。麝香湯下。無時。

龍骨湯 治疳氣瘦弱。下利白膿。久而不差。

龍骨半兩

訶黎勒皮半兩

赤石脂半兩

酸石榴皮微炒一分

木香一分

使君子仁一分

右爲細末。每服一字或半錢。麝香湯調下。無時。

丁香散 治如前。

丁香二箇

黃連一寸

大棗一枚去核

右以棗裹二藥麻纏。火上燒存性。研爲細末。米飲調下。無時。

芫蔚粥 治如前。

右以芫蔚葉即益母草也煮粥食之。或取汁飲亦妙。

薔薇汁 治如前。

右以生薔薇根洗淨。細切煎膿汁。稍稍飲之。

勝金圓 治如前。及加腹脹。

右以雞子一枚。打一眼子。如豆大。入去皮巴豆一粒。膩粉一錢在內。以五十重紙裹。於飯甑內蒸三次。取雞子肉同藥研。更入麝香少許細勻。添少糊。圓如黍米大。食後臨臥溫湯下二三圓。量大小與服。一方用雞子一枚打破和膩粉炒乾爲散。米飲調一字。或半錢服。

薤糯餅 治如前。

右以薤白一握。生杵如泥。同蜜和糯米粉研作餅。炙熟與喫。不過二三次差。

樗白棗子 治如前。

右以樗根白皮搗細碎。麵拌和。切作小顆棗子。日曬少時。又拌麵一次。凡三過爲度。水煮熟。加鹽醋頓服。量大小與困重者服之差。

樗根米泔汁 治如前。

右以樗根白皮煮濃汁。半雞子殼。和粟米泔半雞子殼。同灌下部。再作卽差。其驗如神。

木香使君丹 治疳氣羸瘠。雖能食不生肌肉。時時泄利無休。

使君子 去殼二兩

木香 一兩

丁香 一兩

厚

朴 去粗皮生薑製一兩

沒石子 一兩

胡黃連 一兩

肉豆蔻

麵裹煨去麵一兩以上爲末

蘆薈 一分

麝香 一分

右爲末同勻。以粟米飯和圓。黍米大。每服十粒。煎陳橘皮湯下。無時。乳食前。

君子圓 治疳勞發熱。擗指齧甲。髮疏腹脹。不思乳食。羸瘦虛滑。下利無度。愛食泥土。

厚朴 去粗皮生薑製

甘草 炙

青黛

陳皮 去白

訶

子炒去核取皮用各半兩
一方一兩半生半熟

使君子

去殼一兩
麵裹煨熟白蕪荑去屑
三分

右爲末。煉蜜和圓。雞頭子大三歲下兒半圓。上者一圓。乳汁或米飲化下。若夾驚熱瀉。用之極妙。

青黛散

治諸疳瀉利。毛焦羸瘦。

右以青黛研爲細散。水調服之。量大小與。

〔歌曰〕

孩兒大病變成疳。

不問強羸女與男。

或似積傷食不進。

漸成柴瘦困耽耽。

體熱口乾頻飲水。

皮毛枯槁四支攤。

腹大時時更下利。

青黃白赤一般般。

眼濇面黃鼻爛赤。

口氣增寒臥不安。

忽然瀉下如泔淀。

又似膿膠涕作團。

肛頭凸出饒啼哭。

不忤哺乳淚潛潛。

腹中有病須醫療。

何須祈禱賽神盤。

此方便是青黛散。

孩兒服餌立安全。

赤虎圓

治疳積瀉利。

硃

砂別研

胡黃連

川黃連去鬚

蘆薈

膩粉各一分

硫黃別研二錢

肉豆蔻麵裹煨一箇去麵

巴豆二十四箇去皮用穀炒至熟黑去穀用巴豆別研

麝香少許

右爲細末。研勻細。麵糊和圓。如蘿蔔子大。用甘草湯送下。一歲兒一圓。以意加減。

漏蘆煮肝湯。治疳氣肚脹。冷熱不調。瀉利無度。

右以漏蘆一兩爲末。每服一錢匕。豬肝一兩。鹽少許。水煮熟。空心頓服。大治無辜疳。

君子散。治五疳小便白濁。瀉利無度。

右以使君子仁爲末。米飲調服。食前。

厚脾圓。治疳勞虛冷。白利泄瀉。手足逆冷。

厚朴去粗皮薑製半兩肉豆蔻一箇麵裹煨去麵龍骨半兩

訶子肉煨去核半兩

右爲細末。糊圓菜豆大。米飲下十圓。無時。

蝦蟆圓。治諸疳疳瀉。

蘆薈研黃連去鬚穀精草

桂心

硃砂研各一錢

縮砂仁二錢

熊膽半錢溫水化研

麝香半錢研

右除研藥外。剉細。用一大蝦蟆去了肚腸。入剉藥在內。以線縫合。先用好醋浸少時。次慢火炙。酒醋又炙。至焦黑放冷。杵研爲末。入研藥拌勻。取積豬膽汁和圓。萊豆大。每服五七圓。米飲下。量大小加減。此乃知信州王紹祖方。

治諸疳蟲動方

肥兒圓 治諸疳久患藏府胃虛蟲動。日漸羸瘦。腹大不能行。髮堅作穗。肌體發熱。精神衰弱。

黃連去鬚炒各

神麴炒各一錢

使君子仁

肉豆蔻新裏煨去麴

麥蘖炒各半兩

木香二錢

檳榔二箇不見火

右爲細末。麵糊和圓。蘿蔔子大。每服二三十圓。熟水下。食空服。

蘆薈圓 治五疳羸瘦。蟲齧腹痛。肚大青筋。一切疳疾。

蘆薈

木香

胡黃連各一分

乾蟾一箇酒浸炙焦

檳榔二錢炮

青黛二錢

青皮去穰稱一分切碎去皮入巴豆

使君子仁三十箇

蕪荑一錢用仁

麝香一字

右爲細末。用豬膽汁和圓。黍米大。每服十圓。米飲下。無時。

又方

蘆薈研

木香

胡黃連

川黃連去鬚

青皮去穢

白蕪荑取仁

雷丸

鶴蝮微炒各半兩

麝香研一錢

右爲細末。粟米飯和圓。菉豆大。米飲下一二十圓。無時。

又方

蘆薈半錢

赤石脂一錢

使君子七箇去殼

雷丸一錢

薑黃一錢

川楝子去核一錢

檳榔一錢

巴豆七箇去皮膜出油盡

右爲細末。積豬膽汁糊圓。黍米大一歲兒二三圓。以上者三四圓。量大小與之。

冷木香湯下。無時。

麝香黃連圓 治疳氣羸瘦。白蟲作。

胡黃連

白蕪荑去鬚各一兩半

宣連去鬚半兩

辰砂研一分

麝香研一字

木香半兩

右爲細末。糊圓菜豆大。米飲下五七圓。三歲上者十圓。無時。

榆仁圓 治疳熱瘦悴。蟲作腹痛。

榆仁去皮 黃連去鬚各一兩

右爲細末。用豬膽七箇取汁。在碗中和藥安甑上。蒸九次。每日一次。候數足。研麝香半錢入之。以白湯浸蒸餅和劑。圓菜豆大。每服五七圓至一二十圓。米飲下。無時。

雄黃丹 治五疳羸瘦。多生蟲動。

乾蟾酥炙 胡黃連

白蕪荑去屑

川黃連去鬚

乾漆半兩炒煙雄黃半兩飛

麝香一錢

右爲末拌勻。豬膽汁和圓。黍米大。每服十粒。新汲水下。無時。

乾漆散 治疳疾虬動。腹肚疼痛。

乾漆一錢炒使君子十四箇

白蕪荑六片

棟樹東邊皮日曬去粗皮

右爲細末。每二三歲兒半錢。下者一字。沙糖熟水調下。無時。

使君子散 治如前。

使君子仁炒一錢

黑牽牛炒過爲末二錢

輕粉二錢七

右爲末。每用半錢。於五更初。疏米飲調下。無時。

三根散 治疳疾。蚘作腹痛。啼叫不止。每至月初間。卽甚。狀如神祟。

貫仲根去土

棠梨根取皮

酸石榴根各一

栗刺

故綿

乾漆各半

右六味。並燒存性。爲細末。每服一錢。水八分盞。煎至四分。去滓溫服。無時。

豬肚丹 治疳瘦盜汗少力。大便有蟲。曾經大效。

川黃連去鬚

胡黃連

木香各一

羌活去蘆

蘆薈

肉豆蔻麵裹煨

白蕪荑去扇

鼈甲醋炙焦去裙襖各半兩

右爲細末。用豬肚一箇。先刷令淨。以好白芷二兩。內肚中。蒸極軟熟。去白芷不

用。卻入諸藥縫合。再蒸如泥。取出同肚入臼杵。二三百下成膏。圓黍米大。每服

十粒。米飲下。量大小加減。無時。

綠礬圓 治疳疾有蟲。愛食泥土。

右以綠礬爲末。豬膽汁和圓。菉豆大。每服五七圓。米飲下。無時。

又方 治如前。

右以市合人聚時。買市中羊肉半斤。用繩繫之。頓地上。令人把繩頭拖至家。水洗淨炒炙。依科與兒食之。未能食者。煮至汁與飲。一方肉一斤。繩繫曳數里。勿洗。炙與食。

除毒丹 治疳蚘不差。傳染兄弟姊妹。

鬼

白去一兩

苦

參半兩

青箱子

半兩

草龍膽

去蘆半兩

硫

黃一分

緋

絹一分

乾

蟾一分

白

礬一分

右件藥剉拌一處。並燒存性爲末。煉蜜和圓。麻子大。每服十粒。磨沉香湯下。無時。

治小兒疳蚘。

右以鷓鴣糞乾爲末。炙豬肉蘸與之。啖奇妙。糞多在山石之上。紫色如花。就上刮取之。

治小兒疳溼痛癢。下部生蟲蝕瘡。

以沒石子爲末。吹下部中。又以地榆煮汁洗之。日二。又以鐵衣著下部中。

治小兒疳溼生蠱蝕痛。

以地牯蓄一把。水二升。煮至半升。空腹服半合。大小以意加減。

治小兒疳熱。伏結腸中。下赤黃汁沫。及如魚腦雜血。肛中瘡瘻蠱生。蟲蝕痛癢。

黃連去鬚

槲皮炒

苦參

鬼臼

獨活去蘆

橘皮

芍藥

阿膠各半兩剉蛤粉炒去蛤粉

右爲末。以藍汁入少熟蜜和圓。小豆大。每服五七圓。米飲下。無時。冬時無新藍。取汁。用子一合。舂爲末。入藥內蜜圓。

治小兒疳溼生蠱蝕。下部癢痛。

胡粉

雄黃各一分研飛

右同研細。每用少許。傅下部中。

治小乳疳利不差。久成溼蠱。

右以艾葉半兩。水一升。煮取半兩。量兒大小。以意加減與服。

治諸疳雜證方

五疳保童圓 治五藏諸疳一切並主。

青 黛 研

雄 黃 研

麝 香 研

蘆 薈 研

熊 膽 研

胡黃連

黃 連 去 鬚

龍 膽 去 蘆

苦楝皮 取皮

蝦蟆灰

蝸 牛 微 炒

白 鯉 魚 炙 焦 黃 無 代

夜明沙 微炒

五倍子

青 皮 去 白

天漿子 微炒 各 一錢

蟾 頭 令 黃 炙

右爲細末。糯米飯和圓。麻子大。每一歲兒十圓。溫米飲下。日三服。無時。

龍香散 治五疳瘦悴。多啼叫喚。口瘡髮穗。

白 朮 一 分

石 膽 半 錢 研

龍 齒 一 錢

陳 皮 末 一 錢

麝 香 半 字 研

右爲細末。每服半錢。米飲調下。二歲下者服一字。無時。

聖功散 治五疳。

苦楝根皮 生 子 東 引 者 煎 一 宿

鶴 蟲 各 等 分

右二味爲末拌勻。每服半錢。熟水調下。連進二服。無時。

使君子圓 治諸疳和脾胃。

使君子仁一兩 川芎一分

厚朴去粗皮生薑汁炙用一分

陳皮白粉一分去

右爲細末。煉蜜和圓。阜子大。三歲以上一粒。以下半粒。陳米飲化下。無時。

二香青蟾圓 治久疳積熱。面青口乾。鰈甲擗眉。愛鹽食土。欬嗽肚大青筋。柴瘦尪羸。

母丁香三箇

麝香半字

青黛一分

蟾一隻去腸肚炙令焦黃

右爲細末。煮漿水飯和圓。粟米大。溫水送下三圓。無時。

蘆薈圓 治五疳不長肌肉。食減日漸黃瘦。

蘆薈

燕萸去皮

青黛

檳榔

黃連

去鬚各一分

胡黃連半兩

蟬

殼二十去土

豬膽二箇

麝香少許

右除豬膽外爲細末。卻用豬膽和圓。麻子大。每服五七圓。米飲下。無時。橘連圓 治疳氣脾胃不和。飲食不化。日漸羸瘦。

陳皮一兩

黃連去鬚一兩半
米泔浸一宿

右爲細末。別研麝香末半錢拌勻。用豬膽七箇。分藥入膽內。漿水煮。候至臨熟。各以針微劓破。以熟爲度。取出。入粟米飯和圓。萊豆大。每服一二十圓。米飲下。無時。

熊膽圓 治疳羸瘦。

熊膽

使君子仁各等分

右研細。放入瓷器中蒸鎔。宿蒸餅就圓。麻子大。米飲送下二十圓。無時。

蝸牛殼 治一切諸疳。

右以蝸牛殼七箇。洗去塵土曬乾。內酥蜜於殼中。瓷器盛之。紙封糊蓋。於蒸飯下饋時盛饋中。蒸至飯熟。取出細研。漸漸令服。一日至盡。

香蟾丹 治諸疳肌瘦。肚大筋多。髮稀脚細。

乾蟾

五箇水浸去骨用瓦藏瓶一箇頂上取一竅入蟾肉在內鹽泥固濟通留竅子木炭火燒煙息存性取出放地上一宿出火毒爲末

胡黃連二兩

蛇

蛻燒灰一兩

地

龍去土半

天竺黃一分

硃砂半兩

麝

香研一分

右爲末勻細。糯米飯和圓。黍米大。每服十粒。米飲下。無時。

夜明沙丹 治五疳腹脹。目濇多睡。

夜明沙微炒 一兩 胡黃連 半兩

草龍膽去蘆 半兩

苦楝根皮 半兩

乾蟾五箇燒存性以

青黛

麝香

蘆薈各一分

右研勻細。粳米飯和圓。黍米大。每服十粒。米飲下。無時。

紫霜圓 治諸疳發熱。肚大脚細。髮穗面黃。宿滯不消。或作寒熱。腹內痛疼。經年

瘦弱。及中惡等病。

代赭石火服米醋淬不拘遍數以手

硃砂一分

麝香一錢 鼈甲一分

巴豆一分去皮心

枳殼去穢 二錢

當歸去蘆並土 甘草三分

木香一分

生犀末 二錢 大黃 三分

右爲細末。煉蜜和圓。黍米大。每服三五圓。米飲下。無時。

如聖圓 治五疳羸瘦。面黃腹急。盜汗體熱。乳食不消。

白蕪荑

微炒去
皮二兩

黃連去鬚

神麴炒

麥

蘖微炒各
一兩淨

右爲細末。豬膽汁煮糊圓。黍米大。每服一二十圓。米飲下。量大小虛實加減。一方有陳皮、木香各半兩。又名益兒圓。

鼈甲黃連圓。治諸疳羸瘦。發熱盜汗寒熱。肚大脚細。不肯進乳食。氣粗促急。脾

胃不調等證。

鼈

甲童子小便米醋各半盞慢
火上煎炙至盡色焦黃

黃

連用巴豆七箇去皮膜用水一盞
同煎水盡去巴豆不用只使黃

連

白朮

人參去蘆

茯苓

甘草炙

川楝子肉

使君子仁

木香

草豆蔻炮去
皮

柴胡去蘆

陳皮去白

草龍膽各半
兩

右爲細末。豬膽汁和圓。菉豆大。每服一二十圓。米飲下。如有潮熱。體熱不解。

烏梅湯下。

熊膽圓。治一切諸疳羸瘦。

熊膽

蘆薈

胡黃連各半
兩

牛黃一分
研

麝香一錢
研

蟾酥少許研入
劑

右勻細末。入蟾酥糊和圓。萊豆大。每服五七圓。麝香湯下。

金瓜圓 治疳熱黃瘦。作熱發渴。久服解熱。進食肥肌。

黃連去鬚

黃蘗

甘草炙

青皮去穢各等分

右爲細末。豬膽汁和勻。卻入膽中線繫定。於銀石器內。以漿水煮五七沸。取出風裏懸一宿。於膽內出藥入鉢。再入麝香少許。同研爛勻。圓萊豆大。三歲下五七圓。上者數十圓。空心米飲湯下。日三服。無時。

肥肌圓 治五疳黃瘦。久不美食。手與脚俱浮腫。煩渴飲水。常服退熱肥肌。殺蟲去疳。此衛小兒之寶也。

川棟子

去核取肉二兩

川芎二兩

橘

皮揀淨四兩

龍

膽去蘆二兩

巴豆

十四箇去皮同橘皮龍膽炒至焦去巴豆不用

右爲細末。麵糊和圓。麻子大。硃砂爲衣。每服十圓十五圓。米飲下。腹脹橘皮湯下。無時。

香蟾圓 治諸疳。

大

蟾一隻去腸肚好醋浸三日焙焦乾

蕪

荑去皮一分

黃

連去鬚一分

甘草一分

夜明沙半合用粳米百粒同炒至焦黃去米

使君子去殼一分

麝香一字研

右爲細末。豬膽汁和圓。蘿蔔子大。每服五七圓。米飲下。無時。

又方 名同治同。

乾蟾三箇酥炙焦黃

五靈脂去沙石二兩

蟬殼去土半兩

雄黃半兩研飛

訶子肉半兩

母丁香半兩

胡黃連一兩

黃連去鬚一兩

使君子仁一兩

青黛一分

右爲細末。麵糊和圓。萊豆大。湯下二三十圓。無時。

又方 名同治同。

鼈甲去裙襖醋炙黃

蝦蟆炙黃

訶子炮取肉

木香各一兩

蘆薈研

鐵粉研

雄黃研飛

胡黃連各半兩

麝香二錢研

右都如粉。細勻糊圓。粟米大。每服一十圓。米飲下。病大羸瘦者。不過五七服愈。

曾經效驗。

牛黃煎 治諸疳食傷。氣脹體瘦。壯熱髮穗。多困疳羸。齒爛鼻瘡。瀉利丁奚。潮熱等疾。

大 蟾 蟾一雙去皮骨肚腸炙焦爲末用無灰酒一盞積猪膽一箇取汁同蒸成膏

黃連

訶 子 炮取 使君子仁 蟬 殼去土

沒石子

蘆 薈 蘆薈去扇 熊 膽

夜明沙

硃 砂 水飛 雄 黃 水飛各

木 香

肉豆蔻 麵裹煨去麵

冬一分 牛 黃 別研 麝 香 別研 腦 子 別研

二味春夏用

右爲末。入蟾膏和圓。麻子大。米飲下五七圓。驚疳金銀薄荷湯下。乾疳腹脹桃

仁茴香湯下。疳虵東引石榴苦楝根湯下。五歲上者十圓。此藥尤治疳利。若挾

熱者不可服。

黃連圓 治疳氣眼濇多困。手足發熱。脾胃虛弱。髮黃作穗。漸漸羸瘦。不思乳食。

胡黃連 使君子肉 白蕪荑 去扇各 巴 豆 膜十四箇去皮

右爲末。豬膽汁和圓。麻子大。每服三五圓。米飲下。空心日二服。

蘆薈圓 治五疳面黃肌瘦。腹脹髮穗。目濇口臭。斷爛鼻瘡。咬甲擗眉。愛喫泥土。

瀉利無度。寒熱往來。

乾蟾

大皂角二味等分同燒存性爲末每一兩用下項藥

青黛一分

蘆薈一錢

麝香一錢 硃砂一錢

右爲末和勻。浸蒸飯和圓。麻子大。每三歲下兒一十圓。上者以意加至二十圓。

溫水飲送下。無時。

龍膽圓 治諸疳發熱。

龍膽草去蘆

黃連去鬚

使君子肉

青皮去穢各等分

右爲細末。豬膽汁和圓。蘿蔔子大。每服一二十圓。熟水下。無時。

粉糖圓 治疳愛食泥土。

右以膩粉一分。用沙糖拌和圓。如麻子大。米飲下一圓。良久取下泥土立差。

龍粉圓 治疳渴飲水。

龍膽草去蘆

定粉微炒

烏梅肉焙

黃連去鬚各半兩

右爲細末。煉蜜和圓。麻子大。米飲下一二十圓。

香葛散 治如前。

藿 香 去 土

乾 葛

甘 草 炙各一兩

白 梅 肉 炒半兩

右同爲細末。煎浮萍草湯調下半錢。量大小與服。無時。

熊膽圓 治疳瘦肚腫。煩渴喫水。

熊 膽

雄 黃

佛頂青 各半兩入磨香少許同研

肉 桂 末

人 參 各一錢末

右爲末同勻。糯米粥和圓。菉豆大。每服五七圓。米飲下。無時。此方大妙。

推水散 治疳渴衆藥不效。

天 仙 子

不拘多少新瓦上焙乾四月間采又各水仙子乃蛭蚌也乾

薑 炮 一兩

烏 梅 肉 焙一兩

湯 瓶 蘸 半兩

甘 草 一分

右爲細末。每服半錢或一字。煎水索頭湯放冷調下。無時。良久推水不要飲是

效。

覆蠶圓 治諸疳瀉痢驚風等疾。久不痊差。及斷乳後羸瘦疳羸。漸困不能治者。

回生神妙。

覆 蠶

一箇以線串其頭陰乾只取向後有蠶糞處細研覆蠶是第二次出者蠶

辰

砂 三 分 研 水 飛

麝香研三字

萆撥半三錢

雄黃研三錢半

胡黃連半三錢

右爲末。以新蒸粟米飯一塊泥裹煨之。取中心軟者和藥。圓菜豆大。每服五七圓。麝香湯送下。

雞肉煎圓 治十歲以上疳勞壯熱。形瘦骨熱。漸成勞瘵者。

宣連去鬚土二兩

柴胡去蘆一兩

蕪荑去半兩

川鶴蟲半兩

知母一兩

秦艽去蘆一兩

芩一兩

使君子肉一兩

右爲細末。以黃雌雞一隻。重一斤許者。籠之。專以大麻子飼五日。殺之。去毛令淨。於臀間開一孔。去腸肚淨洗拭乾。入藥末在雞腹內。以線縫合。用一小甑。先於甑底鋪黑豆厚三寸。頓雞在中。四傍又以黑豆圍塞。上亦以黑豆蓋之。自日出蒸至晚衙後。放溫冷。取雞出腹中藥別頓。將雞擘剔去筋骨頭翅。以淨肉研和藥得所。如乾入少酒糊圓。如麻子大。及菉豆大。兩等。每服一二十圓。以意量大小加減。空心臨臥煎麥門冬熟水下。如疳勞骨熱發蒸。年十五以上。溫酒下。忌豬肉。

蠍虎丹 治一切諸疳。羸瘦下利。證候全備。又如有邪。此乃疳毒傳深。俗呼無辜

者。此乃疳毒也。

乾蠍虎雄者一箇微炒

蝸牛殼細研一分

蘭香根一分

旋花一分

雄黃一分研飛

麝香一分研

龍腦半研一分

右爲末。入研拌勻。米醋煮麵糊和圓。黍米大。每服十粒。煎芝麻湯下。乳食後。量

大小輕重加減。無時。

香甲湯 治如前。能祛毒辟邪。

漏蘆去蘆一兩

沉香半兩

牛蒡子微炒半兩

安息香半兩

訶黎勒皮半兩微炒

鼈甲塗酥炙焦黃去裙襴半兩

乳香半兩細研

右爲末。勻細。每服一錢。水八分。入人參少許。同煎至四分。去滓溫服。量大小加

減。無時。

大麝香丹 治諸疳積癰羸瘦。肚大青筋。頭重項細。腹中有積。毛焦氣急。俗呼爲

丁奚。呼爲無辜。此皆疳證也。

麝香半兩研

硃砂半兩研飛

粉霜半兩研

五靈脂揀淨一兩

肉豆蔻麵裹煨一兩

乾蟾一兩

夜明沙半兩

白礬枯半兩

地

龍去土一分

乾蜣蜋

七箇去翅足炙黃焦

右爲細末。入研拌勻。煉蜜和圓。黍米大。每服五七粒。溫水下。無時。

問命散 一切諸疳。可分輕重逆順。

瓜

蒂半兩

細

辛去苗一分

乾地龍

去土一分炒

白礬灰一分

藜

蘆去蘆一分

右爲細末。每用少許吹鼻中。得嚏卽吉。若有蟲出卽愈。

治小兒腦疳鼻癢。毛髮作穗。面黃羸瘦。

以鯽魚膽汁滴鼻中。連三五日效。

治小兒腹疳。以蜘蛛燒熟噉之。

治小兒疳熱。煩渴乾瘦。

以蝸牛三四十箇。放一淨盤中。以物蓋之。令行卽有涎似銀泥。同膩粉和搗。便

圓如黍米大。溫水送下三圓。無時。

治小兒疳渴。飲冷水不休。

麝香

人中白各一分

右同爲末。蒸餅和圓。麻子大。一二歲服二圓。煎阜子湯送下。空心服。

還肌散 治小兒疳瀉。及洞瀉穀不化。

肉豆蔻 一箇

訶子 二箇
去核

沒石子 一箇
火煨焦黃香熟勿令有煙出

木香 半卑

右爲細末。每服半錢。米飲調下。如人行五里久。更進一服神驗。仍調服。須用陳米飲也。

又方 治如前。

黃連 一兩

木香 半兩

燕黃 一分

檳榔 一箇

右爲末。豬膽汁和圓。菉豆大。每服十圓。米飲下。無時作三等圓。量大小與服。治疳利日夜無度。

治疳瀉 以赤石脂研如麵。粥飲調半錢。服立差。一方以川芎等分同爲末服妙。

蘆薈圓 治小兒諸疳。

蘆薈

檳榔

燕黃 炒取

胡黃連

川苦楝 片和核剉

使君子仁

雷丸 浸刮去黑

橘皮 半兩

巴

豆四十九箇去皮膜同橘皮炒至巴豆焦色只留二箇半餘者巴豆不用全用橘皮

右爲細末。積豬膽汁煮糊和圓。麻子大。硃砂。麝香細末爲衣。每服十圓十五圓。如頭面浮腫。木瓜湯下。若瀉而發渴。陳米飲下。更量大小加減。

又方 名同治同。

蘆薈

黃連去鬚

川棟子和核

蕪荑去屑各三分

天竺黃一錢半

麝香少許

右爲細末。以豬膽汁和飯研爛和劑。於甑上蒸兩次。圓菜豆大。以硃砂爲衣。每服五七圓至十圓。熱水下。無時。

鼈血煎圓 治小兒諸疳。

吳茱萸

胡黃連剉碎用鼈血浸一宿同吳茱萸炒令乾焦去茱萸不用

白蕪荑仁

柴胡去蘆各等分

右爲細末。用積豬膽汁浸蒸餅和圓。菜豆大。每服十圓。熱水下。無時。

捉疳圓 治小兒一切諸疳。

蛆退先用米泔浸三日。以杖子攪擊漉出。又以泔水浸三日五日。攪擊淘漉如

前次。入清水浸淘二日。至無穢氣淨時。於日中曬乾。男子患用黃連。女兒患用黃蘗。與蛆退等分爲末。每藥末半兩。入麝香半錢。同研勻。以獾豬膽汁和圓。黍米大。每服三四十圓。量大小加減。空心陳米飲送下。神效屢驗。一方六月取糞坑中蛆。水淘淨。入竹筒盛。封口至乾時爲末。每服一二錢。入麝香米飲調下。甚妙。

消疳圓 治小兒諸般腹脹。四支腫滿。氣上喘促。小便不利。

木香

檳榔 各二兩

青皮 去穢

薑黃

蘿蔔子 炒

牽牛子 各取七錢半

右爲末糊圓。黍米大。每服二三十圓。食後薑湯送下。無時。

治小兒一切疳疾。以棘針瓜蒂等分爲末。每用取黍米許。吹鼻中。日二次用。

治小兒諸疳。以黃連不拘多少。同烏梅煮至黃連透時。只用黃連爲末。別以烏

梅肉和圓。如麻子大。每服二十圓。溫水下。無時。量大小加減。

熊膽麝香圓 治小兒一切疳疾。心腹虛脹。愛食泥土。四支壯熱。

熊膽 一錢

麝香 半錢

壁宮 一枚去頭足尾

黃

連去鬚取末一錢

右同研極細。以蟾酥和圓。黍米大。每服五圓。米湯送下。量大小加減。無時。

香蟾散

治小兒食疳。羸瘦不進乳食。

乾

蟾一枚塗酥炙微黃

蛻

蝦一分去翅足微炒

麥

蘗一分微炒

神

麴一分微炒

右同爲細末。每服半錢。粥飲調下。無時。

又方 治同前。

硃

砂一錢研飛

麝

香半錢研

端午日蟾眉脂

時。右將蟾眉脂和二味。圓麻子大。空心米飲下一圓。如腦疳以乳汁調內鼻中。無時。

治爛疳水瀉。

以川椒一分。去目並閉口者爲末。酥調少許傅腦。三日三次。

治疳利垂死。

以益母草煮食之。取足卽差甚佳。取汁飲之。亦治痔妙。以地榆煮

汁和錫糖食之。以檇白皮和倉朮米。葱白、甘草、香豉同煎飲服。

治小兒疳渴。飲水無度。

以大鮎魚一頭。先燒一地坑令紅。投魚坑中。使以蛤粉。專令一人摻在魚上。須

與取出。用蘆刀割下粉。入麝香少許。拌勻和圓。蘿蔔子大。每服五圓。桶繩根煎湯送下。一方云冷水旋圓服。

五疳圓 治小兒一切諸疳。

川棟子

川芎 等分

右爲細末。以漿水煮豬膽取汁和圓。麻子大。每服一二十圓。溫水送下。日三四服。

治小兒疳氣不可療者。

以綠礬火煨通赤。醋淬之。如此三次。細研爲末。棗肉和圓。萊豆大。每服五七圓。溫水下。無時。日二三服。

桃柳湯 一切諸疳。服諸藥後。皆可用此法也。

右以桃柳枝各一握。並剉。用水兩大碗。煎數沸。通手浴兒甚佳。浴畢用一青衣蓋之。疳蟲自出爲驗。

小兒衛生總微論方

卷十二

五疳論

小兒衛生總微論方

卷十二

諸蟲論

經言人藏府中有九蟲。內三蟲偏能發動爲病。人藏府實強則不能爲害。若藏府虛弱。則隨蟲所動而生焉。故經亦別立三蟲之名。一曰蛭蟲。又曰長蟲。居胃脘之間。動則令兒吐青白沫。或吐青水。心腹刺痛。若蟲貫心者即死。二曰蟯蟲。居洞腸之間。動多則發動爲痔瘻。蠹蝕瘡疥。痂癩。三曰寸白蟲。居腸胃之間。動則損人精氣。令腰脚痛弱。更有一蟲。形若細絲。或如馬尾。故俗呼謂之馬尾蟲。此蟲不拘九蟲之數。或云飲食中誤嚥油髮所變。亦居胃中。動則令兒腹中攪刺。發痛不可忍受。小兒蟲動者。多病於諸病之後。藏府虛弱故也。患疳勞吐瀉者尤甚。錢乙論小兒蟲動之證。面眇白。心腹痛。唯是口不吐沫。及無清水出也。故乙又言心腹痛而吐者。蟲痛也。心腹痛而不吐水者。冷痛也。但吐水不心腹痛者。胃冷也。又蟲痛亦與驚癇

證略略相似。但目不邪。手不搖也。以此別之。則無誤矣。乙治蟲痛者。用安蟲散。然世人用治蟲之藥。多於臨臥服之。並無日分。故多不驗。唯於每月初四五日間。在五更時服之。至日午前蟲盡下矣。後以平調藥一兩服和之。不可多也。凡蟲在人腹中。每月上旬頭向上。中旬橫之。下旬頭向下。是以中下旬服藥。則不入蟲口。所以不驗也。亦如牛馬生子。上旬生者行在母前。中旬生者並母而行。下旬生者行在母後。又如貓之食鼠。上旬則食前段。中旬則食中段。下旬則食下段。此物理之自然。莫不知也。然蟲痛極者。雖不貫心。亦能斃人。昔錢乙治辛氏女五歲病蟲痛。他醫以巴漆、硃砂之屬藥治之不效。至五日外。多哭而俛仰臥睡不安。自按心腹時大叫。面無正色。或青或黃。或白或黑。目無光而慢。脣白吐沫。至六日胸高而臥轉不安。召乙至。詳而視之。用蕪荑散三服。見目不除青色。大驚曰。此病大困。若更加瀉。則爲逆矣。至次日見辛曰。夜來三更而瀉。乙於瀉盆中看如藥汁。以杖攪之。見有藥圓。乙曰。此子肌厚。當氣實。今證反虛。不可治也。何以然。師曰。脾虛胃冷。則蟲動。今日青此肝乘於脾。又更加瀉。知其氣極虛也。而藥固隨糞下。卽脾胃已脫。兼形爲癖癥。乃食飲所作。經言積者陰氣也。聚者陽氣也。故陰沉而伏。陽浮而動。

氣之所積名曰積。乃五藏所生。其發有常處。其痛不離其部。氣之所聚名曰聚。乃六府所成。其發無根本。其痛無常處。是以積聚皆氣之所爲也。癖癥者。其始因脾胃虛冷。乳食不化。而以成傷。不爲早治。停滯留結。乃成癖癥也。癖者邪癖也。所居在脇下。癥者正證也。所居在腹中。皆有其形。或長或短。或塊或片。其狀不一。皆堅硬作痛。其因乳得者。名曰乳癖癥。俗云癪癖者是也。其因食得者。名曰食癖癥。其因水漿得者。名曰水癖癥。若因按之。或因轉動時。自有聲響者。此乃水癖癥也。是以癖癥皆飲食所作也。故小兒常當節適乳哺。調順寒溫。若少失保衛。則病從而生矣。如或乳哺不時。寒溫失宜。則脾胃不和。氣不調順。其候口頻撮。面眦白。無精光。口中氣冷。不思乳食。便當以藥和之。若不卽治。則成胃冷。其候乳食不化。或但吐水。急當用藥溫之。又不與治。則脾胃浸以成虛。其候面眦白色弱。腹痛口吐痰沫。白綠。急當用藥溫補。若下利者。更與調養。其中病不相應。故知死病。後五日昏篤。七日而死。錢乙用方本集載之。學者當以此爲法。爾今除疳勞蟲動者。已具於疳疾門之下外。諸蟲之方。敍而具後。

使君子 治虵蛟心腹疼痛。

右以使君子火煨熟。去殼與食。以殼煎湯送下。

紅桃散 治虻蝥心腹痛。發渴有時。

風化石灰一兩燒赤 硃砂一錢細研

右拌勻細用飯飲一大盞。入艾三五葉煎二三沸。看多少。調一字或半錢與服。但少用。多則難喫。

龍膽湯 治虻蝥攻心。其痛如刺。吐出清水。

右以草龍膽一兩剉碎。水二盞。煮取一盞。去滓隔宿不食。至五更頭頓服。量大小與。

三角散 治如前。

右於七月七日採蒺藜子不拘多少。陰乾爲散。每服半錢或一錢。飲服日三。量大小加減。無時。

木香桃仁丹 治虻蝥攻心。痛不可忍。

木香一兩 桃仁湯浸去皮尖並雙仁

檳榔一分

鶴虱一兩 黑狗脊一兩 苦楝根白皮半兩

右爲細末。積豬膽汁和圓。黍米大。每服十粒。麝香湯下。無時。
奪命丹 主治如前。病至危困者。

狼牙草 一兩

篇蓄 一兩

苦參 一兩

雷丸 半兩

薏苡仁 半兩

鶴蝮 半兩

右爲細末。糯米和圓。黍米大。每服十粒。生地黄汁下。無時。

乳香圓 治蟲動心腹疼痛。

乳香末

青皮 去穢炒黃爲末 各一分

槐花 半合

風化石灰

半兩 研細

右爲末勻細。每服半錢。槐花湯調下。無時。

乾漆散 治如前。

乾漆 炒煙盡 一錢

使君子仁 二七箇

蕪荑 去扇六片

棟根白皮 取東邊一錢

右爲細末。每服一字。沙糖熟水調下。二三歲半錢。四五歲一錢。無時。

棟皮汁 治如前。

右取棟根皮。削去外蒼皮不用。只用白者。以煮濃汁。量大小與服。

抵聖散 治如前。痛不可忍者。

苦楝根白皮二兩 白蕪荑去扇半兩

右爲末。每服一錢。水一小盞。煎取半盞。放冷。待發時服。量大小加減。無時。

勝圓子 治如前。

龍腦研

蘆薈研

麝香各一字

牛黃半字

胡黃連半錢

右爲末。同研勻。熊膽和圓。菴豆大。每服三五圓。生米泔水化服。無時。
又方 以檳榔生爲末。用東引石榴根煮湯調下。量大小與服。或半錢一錢。治寸白蟲神效。上旬空心食前服之。

治小兒虬蟲動作。

以棟實一枚。煮濃汁。內孔中。亦治蟯蟲。

以槐子杵爛內孔中。亦治蟯蟲。

治小兒寸白蟲。

以桃葉杵爛。絞汁服之。

雷丸散 治小兒三蟲。

雷丸

川芎等分

右爲細末。每服一錢。米飲調之。日二服。無時。

胡粉牛黃圓 治小兒虯動。腹內時時疼痛。

胡粉三錢

牛黃一錢

麝香一錢

右同研爲末。用穢豬膽一枚。取汁浸蒸餅。和圓菰豆大。五歲兒溫水下七圓。以意加減。無時。

又方 治如前。

以葶藶子一分。生爲末。水三合。煎取一合。一日服盡。以薏苡根煮汁作糜食之。甚香而效。

治蟪蟲內齧。心腹疼痛。

以鶴蟲爲細末。用肥豬肉汁調服。五歲兒服二合。蟲出便止。更以意加減。

治蟪蟲及蟲攻蝕。下部癢痛。

以篇蓄一把。水一升。煮熟。五歲兒空腹服三二合。乳食前。

治蟻蟲攻蝕下部。

以胡粉、雄黃各一分。同研爲末。每以少許傅下部。

補胃膏 治如前。痛甚不可忍。啼哭不止。

夏薑 一兩 微炒

肉桂 去粗皮 一兩

肉豆蔻 麝香裏煨 半兩

乾漆 半兩 煙盡

烏梅肉 半兩 乾炒

右爲細末。煉蜜和圓。雞頭子大。每服一二粒。米飲化下。無時。

香雷散 治如前。

雷丸

鶴虱

苦楝根皮

白蕪荑 半兩 各

右爲細末。每服一字或半錢。用生豬肉煮淡湯調下。無時。

化蟲圓 治蟲齧腹中攪刺疼痛。

蕪荑 去屑 一分

檳榔 二錢

川鶴虱 一分

右爲細末。豬膽汁和圓。麻子大。每三歲五圓。五七歲十圓。陳米飲下。無時。

川楝圓 治胃寒蟲動。心腹疼痛。及上中下焦因虛而蟲動。

乾漆 煙出盡 三分 炒碎 雄黃 水飛 一分 研 巴豆霜 一錢

右爲細末。糊圓黍米大。每服五七圓。量大小加減。取東引石榴根煎湯下。痛甚者煎苦楝根湯。或煎蕪荑湯下。

蕪荑散 治上中二焦虛。及胃寒蟲動。心腹刺痛。危惡證候。與驚癇相似。

白蕪荑

揀淨

乾

漆

炒煙盡

右爲末。每服一字或半錢。米飲調。發時服。兒大者一錢。無時。

五靈脂散 治蟲動攻心痛欲絕。

五靈脂

去沙石末二錢

白

礬錢枯半

右拌勻。每服一錢或半錢。水八分。煎至減半溫服。當吐蟲出。

綠礬丸 治腹中有蟲。愛食生物。

右以綠礬不拘多少爲細末。豬膽汁和丸。菉豆大。每服五七丸。米飲下。無時。

蜂窠蛹子 治腹有諸蟲。口中吐出。

右以蜂窠中蛹子與食之。

檳榔散 治寸白蟯虵諸蟲。

檳榔

一箇

木

香一錢

右同爲末。每用一錢。煎棟根白皮湯調下。如棟根赤者不堪用。用卽害人。須在月初四五日間。至五更頭。先嚼肉脯一小片。只嚥其汁。少頃服藥。至日午前蟲下。勿登廁。但用盆子。或在淨地上。庶見取下蟲多少也。一服永絕根本。且食粥一二日。不須服補藥。忌生冷硬物。五七日佳。

碧金散 治寸白。蚘蟯諸蟲。隨時大便糞下。

苦棟根皮炒一兩微

鶴虱半兩淨

檳榔半兩

猪牙皂角三錢燒灰

使君子仁半兩以青

黛半兩

麝香一分

右拌勻細。每服一錢。淡猪肉湯調下。無時。

化蟲丹 治數歲上食肥甘物多而蟲動。

鶴虱一兩

檳榔一兩

苦棟根皮一兩已 胡粉半兩

白礬半兩

右爲細末拌勻。麵糊和丸。黍米大。每服十粒。溫漿水入生油一兩點攪勻送下。無時。

黑金散 治蟲煩擾亂。服之煩已。得睡爲驗。

乾漆一兩

肉桂半兩

草豆蔻仁一分

石榴根

雄黃一分

右都於一瓦器中燒存性。研爲極細末。每服一字或半錢。研麝香少許。煎粟米飲調下。

黃金散 專治吐利後蟲動。

乾漆一兩揀盡

白蕪荂半兩去屑

肉豆蔻兩以上先爲末

雄黃三分飛

右研拌勻細。每服半錢。煎葱白湯入生油一二點同調下。須調令勻。熟即得。如

藥冷再上火溫服。不拘時候。

胡粉丹 治蟯蟲發動。甚者成痔漏瘡疥。

大棗五十箇蒸熟取肉去皮核

水銀半兩二味同研勻細成膏

胡粉一兩雄黃半兩飛

右同入棗膏研勻。丸黍米大。每服十粒。煎苦楝根湯送下。無時。

蝟皮散 治蟯蟲耗損氣血。已成痔者。

蝟皮燒灰一兩

鼈甲黃一兩 酥炙 去裙襴 蛇蛻皮燒灰一兩

露蜂房半兩 燒灰

右爲細末。入麝香末一錢拌勻。每服半錢。米飲調下。無時。

櫻櫚散 治如前。

櫻櫚燒灰一兩

荊芥穗一兩

側柏炙黃一兩

牛膝半兩 去蘆

枳殼去穰 炙炒 黃耆半兩

右爲細末。每服半錢。米飲調下。乳食前。

神蟾穀精丹 治諸病有蟲下如絲。或如馬尾。甚者便至危殆。

乾蟾三枚 五月五日 取者酥炙黃

穀精草三兩 入一瓶內 鹽泥 固封 慢火煨 通赤

胡黃連半兩

阜角三寸 燒灰

瓜蒂半兩

母丁香半兩 已上 先爲末

粉霜一分

蘆薈一分

麝香一分

右同拌勻。以猪膽汁和丸。黍米大。每服十粒。溫米飲下。無時。

食氣積癖論

小兒積聚癖癥者。其證不同。積聚乃氣之所患。又不與治。脾胃既已虛冷。飲食先

已不化。乳哺再稍失宜。即便乃成傷也。其候身體壯熱。口中氣溫。面黃腹脹。目無精光。或白睛多喜睡。四肢垂蹶。畏食肚熱。大便酸臭。或爲吐瀉。水穀不消。須宜穩藥剋化。不可便行駛藥取轉。小兒氣實。脾胃壯者。患之有漸。若氣怯脾胃弱者。但稍失調養。便成傷也。昔錢乙治黃承務子二歲。因傷食而瀉。他醫與止之。十餘日便青白。乳不消。身涼加哽氣昏睡。醫謂困篤而召乙。乙先與益黃散補肺散。三日而身溫不哽氣。後以白餅子微下之。復與益脾散。而利止得安。或問何以然。乙曰。此本脾虛傷食而作利。初不與下之。留連十餘日。上實下虛。脾氣弱則引肺亦虛。脾肺子母故也。今先補脾府。病退身溫。不哽氣是也。然後下其所傷。又問既有所傷。何不先下而後補。乙曰。糞青白爲虛冷。若先下之。必大虛也。故先實而後下。則不虛矣。後更與補之乃安。此乃治所傷也。若傷重而不與急治。則停滯留結而爲癖癥。其候與食傷相似。而加更困重。及一向不食。但微飲少乳。或渴而飲水。時作寒熱。亦與潮熱相似。昔錢乙治曹宣德子三歲。病面黃時發寒熱。不食而微飲乳。及飲水不止。衆醫以爲潮熱。用退熱藥不愈。又用止渴藥反吐。請乙至。乙曰。此乃癖也。與白餅子下之。後補脾。乃以消積丸磨之。果愈。或問何以故。乙曰。不食但

飲水者。食伏於胃脘。內不能消。致令發渴。服止渴藥吐者。藥衝於脾。氣逆不得下。故也。下之乃愈。又錢乙論小兒癖癥。由乳食不消。伏在腹中。乍涼乍熱。飲水不止。或喘而嗽。與潮熱相似。不早治之。必成疳勞。以其有癖癥。則令兒不食。致脾胃虛而發熱。故引飲也。飲多則蕩滌腸胃。亡失津液。脾胃不能傳化水穀。脈沈細。益不能食。遂漸羸瘦而成疳也。錢乙所用之方。本集載之。及脾胃虛冷。米穀不化。下利者。已具於前瀉門之下外。合用諸方。敘後半兩丸。治五積六聚。

巴豆去皮

大

戟

剉碎各半兩

右二味。同入銚內。油炒焦黃。爲細末。糊丸麻子大。每服三丸。量虛實大小加減。與服。臨臥米飲下。乳食前。

三稜汁

治諸氣積。氣聚。氣癖。

右以京三稜取汁。作羹粥米麵任爲。與乳母食之。每日取棗大與兒喫。大者漸加之。又治十歲以下。至百日無辜疳癰諸疔癖。神妙大效。功不可述。

三稜煎丸

治氣積。氣聚。氣塊。疔癖。水氣奔豚。腎餘五疳五噎。及一切氣滯凝結。

京三稜炮

蓬莪茂炮各四兩洗淨

芫花一枝一兩去梗

右將上二味入瓷瓶內。以米醋五升浸滿。封閉瓶口。用炭火攢煮之。度量微乾時取出。以餘醋炒芫花。至醋盡藥乾爲度。同上二味剉。焙乾爲末。醋煮糊丸。菉豆大。每服三五丸。生薑鹽湯下。乳食前。更量大小加減。

薑橘丸 治乳哺失宜。脾胃不和。

右以好陳橘皮不拘多少。極陳者尤妙。洗淨去白。焙乾爲細末。每五兩入生薑末三兩和勻。煉蜜丸。麻子大。每服三四十九。米飲下。無時。更量大小加減與服。調中散 治乳哺冷熱失宜。脾胃不和。

木香剉一兩

人參去蘆一兩

青皮去穰一兩

丁香香半兩

白朮半兩

白茯苓半兩

大腹皮剉半兩

甘草半兩炙

右爲細末。每服一錢。水一小盞。入生薑三片。煎至五分。去滓服。無時。

益胃丹 治如前。

當歸去蘆洗焙

木香

白朮

沈香各半剉

白芍藥剉

人參去蘆剉

蓬莪茂炮剉

縮砂仁各一分

右爲細末。麵糊和丸。黍米大。每服十粒。麝香湯送下。無時。

枳木汁 治胃冷正氣。

右以枳木皮煎汁服之。

益兒丸 治胃冷氣不和。食不消化。亦治疳氣。

神 麵炒黃

白蕪荂 去扇炒 各一兩

宣 連 去鬚 二兩

陳 皮

木 香 各半 兩

右爲細末。猪膽汁和藥末成劑。再入膽內繫口定。以漿水煮數沸。取汁和丸。菴

豆大。每服一二十丸。米飲下。腹脹木瓜湯下。無時。一方有沒石子 蘆薈各一兩

益脾散 治脾胃虛冷。腹痛不利。全不入食。

陳 皮 一兩

青 皮 去穢 半兩

訶子肉 半兩

甘 草 半兩 剉炒

丁 香 二錢

乾山藥 三兩

右爲細末。每服二錢。水一盞。入生薑二片。棗一箇。同煎至五分。去滓溫服。無時。

消食丸 治傷飽乳食不化。壯熱腹脹疼痛。

木 香 半兩

枳 殼 去穢 炒 各一兩

當 歸 去鬚 土

代赭石 火煨 碎 不計遍數

以手撚得
碎爲度

硃

砂研水飛

巴

豆取一分

右爲細末。糊丸黍米大。一歲兒一丸。溫水下。乳食前服。

大麥麵 治乳食過飽。煩悶腹脹。但欲睡。

右以大麥生麵水調服一錢。如無麥蘖亦得。如無只用白麵炒微香。調服一錢。小兒食不知飢飽。但燒鼠屎二枚爲末服之。

香橘丸 治宿食不消痰滯。

木香

陳橘皮各半兩

牽牛子炒黃取末一分

白朮一分

草豆蔻仁一分 薑黃一分

右爲細末。滴水和丸。黍米大。每服十粒。葱白湯下。大小便秘澀不通。乳食前服之。

惺惺丸 治宿食不化。心腹脹滿。身熱不思乳食。

青皮溫湯浸軟去穢焙乾一兩

胡黃連一兩

蓬莪茂炮一兩

巴豆取霜半錢

右爲細末。麵糊和丸。黍米大。每服三五丸。乳汁下。大者白湯下。量大小加減。乳

食前。

小沈麝煎丸 治宿滯不化。滿悶身熱。

烏梅去核

巴豆二箇去殼

丁香三箇

胡椒四箇

右爲末。醋糊爲丸。芥子大。每服三四丸。米飲下。臨臥。

消乳丹 治傷乳凝滯。能磨積化疳。大妙。

蝦蟆十箇燒灰

木香一兩

蓬朮茂炮一兩

青皮去穢一兩

青黛一兩

肉豆蔻麵裹煨去

膩粉二錢

續隨子炒一分

麝香少許

右爲細末。麵糊和丸。黍米大。每服五七丸。乳汁下。無時。

蠍梢丸 治乳食所傷。涎痰壅滯。諸般積聚。急驚食痢。

黑鉛二錢以水銀結砂子

輕粉二錢

粉霜三錢

天南星一分

木香四錢

白丁香四錢

青黛二錢

全蠍二錢去毒

乳香一錢

巴豆霜半錢

滑石二錢

麝香半錢

腦子半錢

右爲細末。麵糊和丸。黍米大。每服五七丸。乳汁或米飲下。治驚風搐搦者。更入天麻、白附子各二錢。此藥與千金紫丸同。然爲效更速。

大真珠丸 治如前。

滑石末三錢

輕粉三錢

半夏麴末二錢

天南星末二錢

全蠍七箇

巴豆十四箇去皮膜出油取霜

麝香少許

右爲細末。蒸餅和丸。菉豆大一歲兒一九。葱湯送下。乳食前。

小真珠丸 治宿食凝滯不消。乳癖積聚。大小便秘瀉。腹脹氣痞。取磨虛中之積。

木香

白丁香香直者

丁香各半

滑石末二錢

巴豆十四箇去皮膜水浸一宿研細爛

輕粉半錢留少許爲衣

右細勻。以溼紙裹陳米飯。燒取中間軟者和丸。麻子大一歲兒一九。炮阜子湯放溫送下。挾風熱秘瀉難動者。先服涼藥一服。乳癖者。虛實加減丸數。隔日臨時更服。

葱湯丸 治諸般積癖。腹脹顯腫。

天南星末二錢

白附子末二錢

滑石末二錢

全蠍七箇

輕粉二錢

硃砂半錢

巴豆十四箇去皮心出油盡取霜

右爲末。麵糊和丸。黍米大。每服三五丸。葱湯送下。臨臥服。

水晶丹 治一切積癖。及百物所傷。

天南星一錢 滑石一錢

水銀粉半錢

蕪荑仁去扇半錢

巴豆十四箇去皮膜取盡油留霜

右爲細末。爛飯和丸。菴豆大。每服二三丸。生葱湯送下。服時須令空心。不可與

乳食。俟稍飢。臨臥服。利過忌生冷粘膩硬食果子等物。以藥補之。

北亭丸 治一切積癖。黃瘦吐食。

北亭末一錢 硃砂末一錢

膩粉

牙消一錢

巴豆二十一箇取霜

右同勻細末。用蒸餅劑裹藥。煨熟。去焦硬者。取中心軟處。近藥潤者。用藥和劑。

如硬。滴水得所。丸菴豆大。每一歲兒一丸。荊芥湯下。乳食前。

消堅丸 取積癖。下交嬾。隔實消食乳癖。

硃砂一錢

水銀沙子兩半

明膠五錢

巴豆霜一錢

輕粉一錢 細墨少許

右同爲細末。麵糊和丸。麻子大一歲兒一九。倒流水下。食後。

神妙丸 取虛中積滯。化痰涎乳癖。

白丁香半錢

硃砂一錢

定粉半兩

粉霜一錢

輕粉一錢 麝香少許

右爲末。粟米飯和丸。黍米大。捻作餅子。火炙紫色。粟米飲下一餅。乳食前。

妙香丸 取虛中積。及治發寒熱。心腹脹滿疼痛。

辰砂一兩

牛黃

龍腦

麝香各一

金箔十四

粉霜

膩粉各一

蠟二兩

巴豆一百二十粒去皮

右於銚子內先鎔化蠟。入巴豆霜拌勻。及入諸藥攪勻和劑。量大小虛實。旋丸。

麻子大。每丸米飲下。要藥勢緊者。捻藥匾。若兒大或疾重者。加之。皆用針刺藥。

餅作孔。以行藥力。如取積癖。丸菴豆大。治吐逆。下胸中虛煩積滯。尤妙。

靈砂丹 取虛中積滯。及治藏府虛滑。久經取轉。裏急後重。久積惡痢。或暴瀉不。

止。神效無比。

通明辰砂

顆塊有牆壁者一分

通明礞砂

一錢各研細

右拌研細。用蠟半兩。先於盞內鎔化成汁。以去皮全者巴豆二十一粒入內。煎至紫色。漉巴豆出。研細與上二味拌勻。將蠟用三分中取一分。再鎔成汁。傾藥於內。急攪令勻。下火凝冷。刮出成劑。瓷盒貯之。如用取卽搗三丸。萊豆大。濃煎甘草湯。放冷送下。臨臥時服。久積病大者。藥隨病共下。小可病輕者。不動便安。治暴瀉惡痢。濃煎艾湯。先呷三五口。候冷下藥。治水瀉者。冷水下。兒大稍增丸數。

蒜貼膏 治乳癖。

石燕子服

半

夏各等

右爲末。用蒜一頭杵爛。攤在舊緋絹帛子上。比兒患處大小。剪作罌子。摻藥上。貼患處。候病兒口鼻中蒜氣時。揭去帛子作效。更不得喫藥。

神應散 治如前。

硫黃

一

砂

訶

子

密陀僧

一

右爲細末。每服半錢。乳汁調下。服了時就有癖處臥少時。當取下黑物效。

丁香餅子 治如前。

大丁香 二錢

蜜陀僧 二錢

木香 半錢

硫黃 半錢

白丁香 一錢

兩頭尖者 砂半錢

甘草 半錢

麝香 少許

右爲細末。湯浸蒸餅丸。菴豆大。捻作餅子。每服二餅。乳香生薑湯下。乳食前。

輭銀丸 治如前。

水銀 一錢 用鉛一錢 結炒子

續隨子 四十九個 去殼

白丁香 末一錢

膩粉 一錢

鷹糞白 末一錢

巴豆 十四個 去油盡

右爲細末。棗肉和丸。菴豆大。一歲兒一丸。溫水下。乳食前。

丁香散 治如前。

黑丁香 七個

蜜陀僧

硫黃

白丁香 各一

肉豆蔻 一個 麵裹煨去麴

右爲細末。每服半錢。溫水飲調下。乳食前。

白丁香散 治如前。

白丁香十四個直者

石燕子一箇火煨瘦者乃是雄

硫黃子一卑

膩粉十個

蜜陀僧半兩

黑丁香二十箇

右爲細末。每料分作十服。用麵絲湯調下。或煮麵湯亦得。服了取下如蝦蟆胎之類惡物是效。

三稜散 治爛癖結實。服藥不瘥。

京三稜剉一兩炮碎

鼈甲去裙襖炙 赤茯苓去黑皮

白朮半兩

木香半兩

枳殼麸炒去穢半兩

右爲細散。每服一錢。水一盞。入生薑五片。煎至五分。去滓溫服。時時與也。

聖餅子 治乳癖疳瘦。

粉霜一錢

硃砂一錢

膩粉五箇

石燕子火煨

玄胡索三箇去皮

巴豆霜一錢

右爲細末。入生麵一大錢。拌勻。滴水。和劑。分十二處。捻作餅子。用刀上煨熟。每

服一餅。煎阜子湯下。

鼠肉汁粥 治諸癥。

右以鼠肉煮汁。作粥與食。

聖效丹 治癰結癖積久不差。

當歸去薑土一兩 木香一兩

硃砂一兩飛研 京三稜半兩炮

麩仁一分湯浸 麝香一分

右爲末。拌勻細研。用黃蠟六兩。慢火鎔化。入藥攪勻成膏。丸黍米大一歲兒一

粒。二三歲者二粒。四五歲者三粒。六七歲者五粒。溫米飲下。乳食前。

大腹湯 治癰癖腹脹。小便不利。

大腹皮一兩炒 檳榔半兩

知母半兩 陳皮半兩湯

右爲細末。每服一錢。水一小盞。煎至五分。去滓放溫服。無時。

治幼小胎中宿熱。乳母飲食粗惡。及多辛苦。乳汁不起。兒乳哺宿滯。不爲肌膚。心

腹痞滿。萎黃瘦瘠。四支痿躄。服之充悅。

芍藥二兩

大黃

人參去薑各一兩

柴胡去薑二兩

桂心一兩 甘遂一兩慢火

鱉甲半兩塗酥炙

巴豆二十一箇去皮心膜絹

枳殼半兩去

人參去薑半兩

殼半兩去

遂一分慢火

甘遂一分慢火

枳殼半兩去

人參去薑半兩

殼半兩去

遂一分慢火

甘遂一兩慢火

鼈甲酥炙去

茯苓各一兩半

甘草半兩

乾薑半兩有熟者

實熬

右爲末。煉蜜和丸。大豆大。一歲已下兒服一九。上者二九。乳服。

牛黃鼈甲丸 治幼小癖實壯熱。食不消。中惡忤氣。

牛黃半兩

鼈甲酥炙去

麥麴炒

柴胡去蘆

枳實熬炒

大黃煨

芎藭各一兩

厚朴去皮

茯苓

桂心不見火

芍藥

乾薑各半兩

右爲末。煉蜜爲丸。如小豆大。以意量大小與服。日二服。無時。

丁香散 治小兒癩癖。一服取效。不動藏府。不損胃氣。

舶上硫黃一大塊

丁香二十箇

蜜陀僧一大棗

右研細。量大小臨臥以荊芥湯調下。來日下黑物。乃病故也。永不再發。

治小兒乳癖。脇下結塊。不消。

膩粉一錢

雄鼠糞一分微炒兩頭尖者是

右同研勻細。去皮棗肉和丸。粟米大。新汲水下。一丸。取下惡物是效。更量大小。

虛實用之。

治小兒閃肭成癖。腹大痞滿。

以鶴雀脚骨及嘴煮汁服之。亦可燒灰存性。研爲末飲服。

治小兒積癖。髮黃羸瘦。及生瘰癧。

以生林檎杵爛。醋和傅上。若癖移則就傅之。以苦瓠未破者煮令熟。解開熨之。亦入熱湯在內熨之。

治小兒乳癖。

橘皮揀淨

青皮去穰

牽牛各一分
並爲末

右用蒜一顆。每瓣入巴豆一粒。煨熟去巴豆。研如泥。和藥末。豌豆大。硃砂爲衣。每服一丸。細嚼。酒送下。一方用蒜去青皮。同巴豆研爛和丸。臨臥冷茶清下一丸。更量大小加減。乳食前。

小兒衛生總微論方 卷十三 食氣積癖論

