

幼
幼
集
成

三

中國醫學大成第十集

兒科類甲
兒科叢刊之一

幼
幼
集
成
三

上海大東書局印行

幼幼集成

清 羅浮 陳復正 飛霞輯訂

鄞縣 曹赤電 炳章圈校

卷二

咳嗽證治

帝曰。肺之令人欬何也。岐伯曰。五臟六腑皆令人欬。非獨肺也。又曰。邪在肺。則病皮膚痛。寒熱上氣。喘汗出。欬動痛背。夫肺爲華蓋。口鼻相通。息之出入。氣之升降。必由之路。故專主氣。經曰。形寒飲冷則傷肺。由兒衣太薄。及冷飲之類。傷於寒也。經曰。熱傷肺。由兒衣太厚。愛養過溫。傷於熱也。又曰。皮毛者。肺之合。皮毛先受邪氣。邪氣得從其合。肺氣上而不下。逆而不收。充塞咽嗑。故令咳嗽也。凡有聲無痰。謂之咳。肺氣傷也。有痰無聲。謂之嗽。脾溼動也。有聲有痰。謂之咳嗽。初傷於肺。推動脾溼也。在小兒。由風寒乳食不慎。而致病者多矣。經曰。五臟六腑。

皆令人欬。然必臟腑各受其邪而與之。要終不離乎肺也。但因痰而嗽者。痰爲重。主治在脾。因咳而動痰者。咳爲重。主治在肺。以時而言之。清晨嗽者屬痰火。午前嗽者屬腎火。午後嗽者屬陰虛。黃昏嗽者火浮於肺。五更嗽者食積滯於三焦。肺實者煩嗽抱首。面赤反食。肺虛者氣逆虛鳴。面白飧泄。肺熱者痰腥而稠。身熱喘滿。鼻乾面紅。手捏眉目。肺寒者嗽多痰清。面白而喘。惡風多涕。故治者各因其虛實寒熱而調之。斯無誤矣。

因於寒者則氣壅喘促。聲濁而無汗。鼻塞聲重。宜參蘇飲微汗之。咳而氣逆。喘嗽面白有痰。此肺本經病。宜清肺飲。咳甚葶藶丸微利之。咳而喉中介介有聲。面赤發熱心煩。或咽喉痛聲啞者。此肺病兼見心證。宜清寧散。咽喉痛。沆瀣湯。咳而面黃體倦。痰涎音盛。或吐痰。或吐乳食。此肺病兼見脾證。大抵咳嗽屬脾肺者居多。以肺主氣。脾主痰飲也。宜橘皮湯。

咳而面青多怒。痰涎壅盛而發搐者。蓋因咳嗽聲不能轉。所以瞪目直視。此肺病兼見肝證。宜集成金粟丹。咳而面色闇黑。久咳而吐痰水。此肺病兼見腎證。宜六味地黃丸加麥冬五味。咳而聲不出。口鼻出血者。此氣逆血亦逆也。須順氣寧

嗽爲主。人參冬花膏。咳而久不止。並無他證。乃肺虛也。只宜補脾爲主。人參五味子湯。咳而胸高骨起。其狀如龜者。謂之龜胸。此肺熱之極。陽火熏蒸而致也。清燥救肺湯。咳而日久。胸前疼痛。口吐膿血腥臭者。此肺火壅盛。已成癰也。桔梗湯。治不如法。其證多死。凡咳嗽痰涎壅塞。逆氣沖井而作搐者。多難治。故頭搖目上視。及閉目呻吟。手足擺舞。肩息胸突。喉中痰鳴。口噤不乳。喘而手足冷者。皆死證也。

入方

人參敗毒散。此方辛平升散。爲咳門第一神方。舉世少有知者。凡有咳嗽。無論內傷飲食。外感風寒。浸淫夾毒。不拘男婦大小。胸緊氣急。咽痛口苦。痰不相應。卽用此方升散之。或感冒重者服此。其咳愈甚。不知者以爲藥不相符。棄而勿服。不知正是升散之方。佳兆也。再服之。漸次輕減。不拘劑數。只以痰應爲度。聲響痰出。是其效也。枯燥之人。數劑之後。略加沙參玉竹當歸白芍生地麥冬之類。以滋其陰。無不愈者。再有叮嚀。凡咳嗽初起。切不可誤用寒涼。及滋陰之藥。

閉其肺竅。爲害不小。俱以表散爲先着。俟痰應之後。漸加滋陰則得矣。

官揀參

五七分
無亦可

芽桔梗

二分

正川芎

一錢

白雲苓

一錢

陳枳殼

一錢

信前胡

一錢

川羌活

七分

川獨活

五分

北柴胡

一錢

南薄荷

一錢

荊芥穗

一錢

北防風

一錢

淨連翹

一錢

炙甘草

五錢

生薑一片爲引。水煎。半饑服。每日二劑。

參蘇飲 治四時感冒。頭痛發熱。咳嗽痰盛。此方不如前方。用之多不效。姑存之。

官揀參

五分

白雲苓

一錢

陳枳殼

一錢

法半夏

一錢

信前胡

一錢

芽桔梗

一錢

老蘇葉

一錢

粉乾葛

一錢

真廣皮

一錢

炙甘草

五分

生薑三片。葱白三寸。水煎溫服。取微汗。本方有廣木香。

清肺飲 治氣逆而咳。面白有痰。

信前胡

一錢

柴胡首

七分

桑白皮

五分

陳枳殼

一錢

淨知母

一錢

川貝母

一錢

南薄荷

七分

白雲苓

一錢

白桔梗一錢

金井膠一錢

大麥冬一錢

荊芥穗一錢

炙甘草五分

水煎熱服。切忌油膩。

葶藶丸

治乳食衝脾。傷風咳嗽。面赤身熱。痰多喘嗽。

甜葶藶

去土隔紙略炒

黑牽牛炒

光杏仁

去皮尖炒黃色另研漢防己炒

右藥等分爲細末。入杏仁泥。和蒸棗肉爲丸。菉豆大。每五七丸。薑湯化下。量兒大小加減。

此丸因乳食傷脾。痰甚者。及壯實小兒可用之。苟不因乳食所傷。并怯弱者。本方去牽牛。易家蘇子等分。炒研爲丸。效。

清寧散 治心肺有熱。而令咳嗽。宜從小便利出。

桑白皮 蜜炒

甜葶藶 微炒

赤茯苓 酒炒

車前子 炒

炙甘草 減半

右爲細末。每服五分。生薑大棗煎湯調服。

集成沆瀣丹 方見卷二胎熱門

橘皮湯 治咳嗽痰甚嘔吐。

法半夏一錢

白雲苓一錢

真廣皮一錢

旋覆花一錢

北細辛五分

官揀參五分

芽桔梗一錢

陳枳殼一錢

炙甘草五分

生薑三片。大棗一枚。水煎徐服。

集成金粟丹

方見卷二類搐門

六味地黃湯

方見卷二胎疾門

人參冬花膏

治氣逆咳血痰中見血。

官揀參一錢

天門冬一錢

麥門冬一錢

款冬花一錢

川貝母一錢

桑白皮一錢

金井橘一錢

片枯苓一錢

白當歸一錢

北五味五分

炙甘草五分

右爲細末。煉蜜爲丸。龍眼核大。每服一丸。燈心湯下。

人參五味子湯

治久嗽脾虛中氣怯弱。面白神困。此神方也。

官揀參一錢

漂白朮五分

白雲苓一錢

北五味五分

杭麥冬一錢 炙甘草八分

生薑三片。大棗三枚。水煎溫服。

清燥救肺湯言喻嘉治諸氣腫鬱諸痿喘嘔。皆屬肺之燥也。

鮮桑葉經霜者得金氣而柔潤炙甘草利胃生熟石膏稟清肅之氣

一錢不稠取之為君用一錢官揀參生胃之津養胡麻仁炒研

二分 真阿膠八分 杭麥冬去心一分北杏仁泡去皮尖枇杷葉蜜塗炙黃用

水一碗煎六分。頻頻分二三次服。痰多加川貝母瓜蒌仁血虛加生地黃熱甚

加犀角羚羊角。

桔梗湯 治肺癰出膿血。

芽桔梗一錢 白當歸一錢 川貝母一錢 瓜蒌皮一錢

漢防己一錢 光杏仁五分 陳枳殼一錢 薏苡仁一錢

生黃耆一錢 鮮桑葉一錢 潤玄參一錢

用蘆茅嫩桂三錢為引。水煎熱服。

百辟嗽論

凡乳子百日內有痰嗽者。謂之百啐嗽。或出胎暴受風寒。或浴兒爲風所襲。或解換襦裳。或出懷喂乳。而風寒得以乘之。此病由外來者。或乳汁過多。吞喘不及而噎者。或啼哭未定。以乳哺之。氣逆而嗽者。此病出於內生者。皆能爲嗽。第前汗下之劑。難於用之。以其胃氣方生。不能勝藥故也。故曰百啐嗽難醫。然雖曰難醫。正未嘗曰不醫。予之治此。未爲不多。其用藥之治。有案在後。復有不治之治。更爲捷徑。而又百治百愈。但須乳母聽戒。治之無難。凡遇百啐嗽。先用荆防敗毒二小劑。母子同服。服完止藥。惟令乳母忌口。凡葷酒油膩鹽醋酸鹹薑椒辛辣青菜麵食之類。一概屏絕。惟用香茶白飯。少佐橘餅橙片。以清其乳。雖見嗽至重者。不過十日八日。得哺清乳。嗽自愈矣。倘不聽戒。復不擇醫。徒然服藥。有名無實。竟何益哉。

附案

滋陽明經高君作梅翁與令弟雲軒翁同於甲寅五月舉子。然皆膏粱之稟。胎元怯弱。於同月間兩兒同患百啐嗽。予謂雲翁曰。公郎面白脣淡。眼白帶青。嗽聲連續。痰不相應。此肝風有餘。肺氣不足。雖有喘嗽。未可以常法治之。設投疎風清肺。

適足益燥傷陰。不特嗽不能愈。而證必危重。雲翁遂以爲是。乃投人參五味子湯。其應如響。四劑全瘳。計用人參二錢八分。作翁者。其體更弱。外候面白眼清。自汗多嗽。滿頭青筋。頭門寬大。因謂之曰。令姪正同此證。已服補脾保肺之劑愈矣。公郎中氣更虛。速宜用參。始不費手。適有老嫗。專挑馬牙者。從內阻之。復有醫者。從外阻之。力言不可用參。服參則不可治。且云未見百日之兒。敢用參者。老嫗更囑其母曰。道翁凡藥切不可服。其中多有人參。服之爲害不淺。其母聞之。以爲誠然。於是視予藥如砒毒矣。作翁因素艱嗣息。莫能主張於予言。似有陽是陰否之意。予見其遲疑不決。亦不敢強姑聽之。此醫日一診視。自七月下旬治起。直至十月初旬。作翁往府考貢。其病愈治愈危。竟至於奄奄一縷。而逆證叢生。無可救藥。醫者束手乏策。老嫗緘口無言。皆絕迹不至矣。夫人輩無所倚仗。復懇於予。予嘆曰。早聽予言。何有今日。乃入診視。見其面目如藍。形體惟皮束骨。聲啞無音。咳嗽氣促。雨汗淋漓。四肢搐掣。逆證全具。毫無生機。因不忍釋手。詳爲審視。惟兩目神光尚存。予曰。生機或在是乎。遂以人參一枝。天員五粒。蒸湯與服。初服小半。予爲抱之。環步室中。審其呼吸之息。氣雖未減。而亦不見其增。卽與服完。良久覺氣稍順。

予喜曰。得之矣。遂用人參一錢。天員肉七粒。蒸湯服之。竟獲大效。是夜汗搐俱止。喘嗽略亦輕減。第苦於人小體弱。卽二錢之參湯。亦須一夜方能服完。幸予此時行功。習龍數載。未嘗設榻。終夕無眠。竟與抱之。晝夜不一釋手。醒卽予服。服後仍睡。數日之後。則鼾聲如雷。睡眠極穩。呼吸極長。予知爲氣服神歸之效。如此者。十晝夜。諸證已愈八九。惟形色未復。音聲未亮。予曰。功程雖小。未敢暫停。參須倍之。於是每日人參四錢。天員十四粒。如前調理。計前後二十晝夜。其用官揀六兩有零。始奏全續。於是聲音清亮。面色紅融。肌肉復生。精神勝舊。今已長成。修然美丈夫矣。而且聰明持達。經史皆通。他日翺翔。奚能限量。如此之證。如此之治。不特世人未見。醫家未聞。卽諸書亦所未載。半週乳子。而用六兩之參。起沉痾於萬難之口。苟無定識者。未必有成。故拜懇同道。但須認證真確。不必拘泥古方。神而明之。存乎人耳。

或問二證皆百晬嗽。何以前證用藥。而後症獨用參者何也。曰。各有理焉。前證在七月間。正肺金旺時。爲風邪衝併。但傷其中氣。他臟無涉。故以四君子補脾。生脈散保肺。收其耗散之金。得返清肅之令。中氣一回應手而愈。後證七月起。至於十

月。金已退氣。正當水旺木相之時。自由腎水無源。所以肝木失養。誠母病子傷。故面目俱青。手足搐掣。此非用強。實肝敗也。內經有善則不見。惡則見之之言。顯然可證。在常俗之輩。見其搐掣。又必爲之鎮驚化痰。截風定搐矣。誰復爲之保固真元。維持竭絕哉。不知此等之症。陰陽兩敗。臟腑俱傷。苟非大力之品。莫可挽回。所以屏去雜藥。獨用人參之甘溫。天員之甘潤。味極純正。飼之兒喜。况人參之力。在陰益陰。在陽益陽。榮衛氣血。精神意智。無不補者。而且晝夜不徹。則真元陰受其長養之功。烏得不效。又曰。初服卽效。而必待三七之日。始奏全續者何也。曰。尅削過傷。枯燥已極。如旱苗焦壤。暴雨無裏。必淙淙潤澤。始可盈科。至於三七之久。天地來復之機。業已三至。人身榮衛。已周一千五十度。升降有恆。神氣已足。不藥之慶。夫復何疑。此等之治。非謂世之嬰兒。一有咳嗽。便當用參。第稟受先虧。胎元怯弱者。有不得不用之勢。獨惜前醫偏執己見。卽數分之參。斷不肯用。孰知用至六兩之多。始取全效。可見辨證不真。誤人非淺。故筆此以爲擇醫者勸。

咳嗽簡便方

小兒咳嗽聲不出者。紫苑微炒研末。杏仁去皮尖。研如泥等分。煉蜜爲丸。芡實大。每服一九。北五味七粒。煎湯化服。

肺實咳嗽痰喘。葶藶子隔紙炒爲末。棗肉爲丸。龍眼核大。每服一九。白湯化服。咳嗽多痰。葶藶子隔紙炒。知母微炒各五錢。研末。砂糖爲丸。芡實大。每服一九。白湯化下。

小兒咳嗽發熱。自汗吐紅。脈虛無力。人參切片焙乾。天花粉切片酒炒。等分爲末。每服五分。蜜湯調服。以瘥爲度。

秋天肺燥咳嗽無痰。北沙參一味。每服五錢。淨水濃煎熱服。

小兒百啐嗽。痰壅喘咳。川貝母五錢。淡薑湯潤溼。飯上蒸過。甘草半生半炒二錢五分。研細末。砂糖爲丸。龍眼核大。每服一九。米飲化服。

熱痰咳嗽。痰出稠濃。或咽喉痛。製南星製半夏各三錢半。枯黃芩七錢。焙燥爲末。砂糖爲丸。芡實大。每用一九。薑湯化下。

哮喘證治

經曰。犯賊風虛邪者。陽受之。陽受之則入六腑。入六腑則身熱不得臥。上爲喘呼。又曰。肺病者。喘欬逆氣。肩背痛。汗出。夫喘者。惡候也。肺金清肅之令。不能下行。故上逆而爲喘。經曰。諸氣臏鬱。皆屬於肺。喘者。肺之臏鬱也。吼者。喉中如拽鋸。若水鷄聲者是也。喘者。氣促而連屬。不卽以息者是也。故吼以聲嚮言。喘以氣息名。凡喉如水鷄聲者爲實。喉如鼾聲者爲虛。雖由於痰火內鬱。風寒外束。而治之者。不可不分虛實也。

有因外感而得者。必惡寒發熱者。面脣紅。鼻息不利。清便自調。邪在表也。宜發散之。五虎湯。有因熱而得者。必口燥咽乾。大小便不利。少宜葶藶丸微下之。有因宿食而得者。必痰涎壅盛。喘息有聲。先用山查神麴麥芽各三錢。煎湯與服。消其食。次千縉湯。素有哮喘之疾。遇天寒暄不時犯。則連綿不已。發過自愈。不須上方。於未發時。可預防之。有一發。既能吐痰者。宜服補腎地黃丸。加五味。故脂多。服自愈。有發而不吐痰者。宜痰喘方。凡哮喘喘初發。宜服蘇陳九寶湯。蓋哮喘爲頑痰閉塞。非麻黃不足以開其肺竅。放膽用之。百發百中。或胸膈積熱。心火凌肺。熱痰壅盛。忽然大喘者。名馬脾風。蓋心爲午火。屬馬。言心

脾有風熱也。小兒此證最多。不急治。必死。用牛黃奪命散下之。凡大病久病之後。或久服寒冷剋削之後。或久吐久瀉之後。忽然氣急。似喘非喘。氣息短促。名爲短氣。短者斷之基。氣將脫也。速宜挽救。人參五味子湯效。又有虛敗之證。忽然張口大喘。入少出多。而氣息往來無滯。此腎不納氣。浮散於外。大凶之兆。速投貞元飲。不效。理陰煎。加人參鹿茸。或可挽救。如汗出如油。髮潤而喘者。肺絕也。汗出如油。張口大喘者。命絕也。直視譫語而喘者。肝絕也。凡大病正氣欲絕。無根脫氣上衝。必大喘而絕矣。

入方

五虎湯 治寒邪入肺而作鹵。蓋鹵爲寒痰固結。非此方不能解散。

淨麻黃 七分

光杏仁 一錢

陳細茶 一錢

熟石膏 一錢

炙甘草 四分

淨水煎。空心服。

葶藶丸 方見卷三咳嗽門。

千緡湯 治痰閉肺竅。喘息有聲。

法半夏二錢

大皂角五分

老生薑一錢

炙甘草一錢

水煎服。已上皆素無哮喘而暴發者用。

補腎地黃丸 治先天不足。肝腎虛者通用。

熟地黃一兩

懷山藥一兩

山萸肉一兩

嫩鹿茸二兩

粉丹皮一兩

淮牛膝二兩

白雲苓一兩

宣澤瀉一兩

北五味一兩

補骨脂一兩

右爲末。蜜丸。菉豆大。每服三錢。淡鹽湯空心下。

痰喘方 治哮喘無痰者。蓋痰入於肺竅。不能出故也。

官揀參

製南星

製半夏

瓜蒌霜

香附米

皂角灰

真廣皮炒

蘿蔔子

炒俱等分

共爲末。薑汁煮。神麴糊丸。胡麻子大。每服一錢。薑湯化下。

蘇陳九寶湯 治風寒閉肺而作哮喘

淨麻黃五分

紅雲皮五分

南薄荷五分

青化桂

取心五分

紫蘇葉

桑白皮四分

大腹皮一錢

光杏仁四分

炙甘草六分

生薑三片。水煎。臨服。加童便少許沖服。

牛黃奪命散。治胸膈有痰。肺脹大喘。

黑牽牛

半生半炒取頭末五錢

錦莊黃

酒潤晒乾

陳枳殼

麥麩炒各一兩

右爲細末。每服一錢五分。白湯調下。量兒大小加減。臨服。加蜜數匙。以氣平爲度。

人參五味子湯 方見卷三咳嗽門

貞元飲

景岳新方

治氣短似喘。呼吸急促。提不能升。嚥不能降。勢甚乖危。常人但知

爲氣急。其病在上。而不知元海無根。肝腎已敗。此子午不交。氣脫證也。

大熟地五錢

白當歸三錢

炙甘草一錢

水煎熱服。

如兼嘔惡。或惡寒者。加煨薑五片。氣虛脈微至極者。速加人參。如肝腎陰虛。手足厥冷。加肉桂一錢。

理陰煎昇岳新方 治腎肝虧敗。不能納氣。浮散作喘。

乾熟地三錢

白當歸二錢

炮薑炭五錢

炙甘草一錢

手足冷者。加熟附子一錢。青化桂一錢。
水二鍾。煎七分。熱服。

哮喘簡便方

治痰氣壅塞。雪梨汁一杯。生薑汁四分之一。蜂蜜半杯。薄荷細末一兩。和勻。器盛。重湯煮一時之久。任意與食。降痰如奔馬。

化痰丸。絲瓜燒存性。爲細末。棗肉爲丸。如彈子大。每服一九。薑湯化下。化痰最捷。兼能止嗽。墜痰丸。治一切風痰。溼痰。老痰。痰火。胸痞滿。氣壅塞。黑牽牛四兩。炒。止取頭末一兩。大皂角去皮。弦及子。酥炙黃四錢。入白礬三錢。共爲細末。米糊丸。每服一錢。兒稍大者二錢。空心薑湯服。痰涎從大便出。久病之人。五日十日一服。病緩者半月一服。

治醋噎成吼。用甘草二兩。去赤皮。每段切二寸長。兩半劈開。用猪膽二枚。取汁。浸

甘草三日取起。火上炙乾。爲末。蜜丸。菉豆大。每晚臨臥服二錢。茶湯送神效。哮喘久不止。不拘老少。一服卽止。并治小兒奶疳。石膏半。夏瓜蒌仁。陳皮。麻黃各一錢五分。枳實。杏仁各一錢。甘草七分。生薑五片。水煎。熱服。清金丹。治一切吼疾。或痰或食。遇厚味卽發者尤妙。蘿蔔子蒸熟晒乾爲末。猪牙皂。燒存性等分。共爲細末。薑汁打麵糊丸。菉豆大。每服一二十丸。薑湯送下。

諸疳症治

夫疳之爲病。亦小兒惡候。十六歲以前。其病爲疳。十六歲以下。其病爲癆。皆真元怯弱。氣血虛衰之所致也。究其病源。莫不由於脾胃。蓋胃者水穀之海也。水穀之精氣爲榮。悍氣爲衛。榮衛豐盈。灌溉諸臟。爲人身充皮毛。肥腠理者。氣也。潤皮膚。美顏色者。血也。所以水穀素強者無病。水穀減少者病。水去穀亡則死矣。凡病疳而形不魁者。氣衰也。色不華者。血弱也。氣衰血弱。知其脾胃必傷。有因幼少乳食。腸胃未堅。食物太早。耗傷真氣而成者。有因甘肥肆進。飲食過冷。積滯日久。面黃肌削而成者。有因乳母寒熱不調。或喜怒房勞之後。乳腠而成者。有二三歲後。穀

肉菓菜。慾其飲啖。因而停滯中焦。食久成積。積久成疳。後有因取積太過。耗損胃氣。或因大病之後。吐瀉瘧痢。乳食減少。以致脾胃失養。二者雖所因不同。然皆總歸於虛也。其證頭皮光急。毛髮焦稀。腮縮鼻乾。口饒唇白。兩眼昏爛。操眉擦鼻。脊聳體黃。鬪牙咬甲。焦渴自汗。尿白瀉酸。肚脹腸鳴。癖結潮熱。酷嗜瓜果。鹹灰水泥者。皆其候也。然治寒以溫。治熱以涼。此用藥之常法。殊不知疳之爲病。皆虛所致。卽熱者亦虛中之熱。寒者亦虛中之寒。積者亦虛中之積。故治積不可驟攻。治寒不宜峻溫。治熱不可過涼。雖積爲疳之母。而治疳必先去積。然遇極於虛者而速攻之。則積未去而疳危矣。故壯者先去積。而後扶胃氣。衰者先扶胃氣。而後消之。書曰。壯人無積。虛則有之。可見虛爲積之本。積返爲虛之標也。如惡食滑泄。乳食直下。牙齦黑爛。頭項傾倒。四肢厥冷。下痢腫脹。面色如銀。肚硬如石。肌肉青黑。肛門如筒。口吐黑血。吐利蛔蟲。並爲不治。初病者以集聖丸爲主。久病者但以肥兒丸治之。以補爲消可也。凡疳之初起者。集聖丸爲主方。其有五臟兼證。從權加減。不必多求方法。

入方

蘆聖丸 治冷熱新久一切疳證以之爲主。

真蘆薈 蒸

五靈脂 炒

夜明砂 炒

真廣皮 酒炒

杭青皮 酒炒

蓬莪朮 煨

使君肉 炒

南木香 屑

白當歸 炒

正川芎 酒炒已上各二錢

官揀參 片二錢切焙乾

正川連 薑製

乾蟾蜍

酥炙俱三錢

西砂仁 酒炒二錢

右爲細末。用公猪膽一枚取汁。將前末和勻。粟米糊丸。龍眼核大。每服二丸。米飲調下。

各證加減法

一、病有咬牙舒舌。舌上生瘡。愛飲冷水。脣紅面白。喜伏地臥。此心疳也。本方去莪朮砂仁青皮陳皮川芎木香六味。加生地茯苓膽星各二錢。西砂甘草各一錢。

一、面青目生白膜。泄瀉夾水。或青色。此肝膽也。本方去莪朮砂仁陳皮木香四味。加膽草梔仁防風天麻蟬退各二錢。青黛一錢五分。

一、愛食泥土冷物。飲食無度。身面俱黃。髮稀作穗頭大頸小。腹脹脚弱。間或泄瀉。

肌瘦。晝涼夜熱。不思乳食。此脾疳也。專用本方。

一、鼻下赤爛。手足枯細。口中腥臭。或作喘嗽。右腮晃白。此肺疳也。本方去莪朮砂仁青皮川芎木香五味。加桑皮桔梗蘇葉阿膠炙甘草各二錢。外用澤蘭葉銅綠輕粉等分。爲末。貼爛處。

一、兩耳內外生瘡。脚如鶴膝。頭縫不合。或齒縫臭爛。變成走馬疳。此腎疳也。本方去莪朮砂仁青皮陳皮木香靈脂六味。加熟地茯苓山藥連肉各三錢。丹皮澤瀉各二錢。

一、食積久而成疳。其證形瘦腹緊。時發潮熱。羞見生人。見之則哭。本方去蘆薈靈脂二味。加人參黃耆白朮茯苓半夏枳實厚樸炙草神麴麥芽驚甲三稜各二錢。

一、久泄不止。胃虛成疳。此肝瀉也。本方去蘆薈莪朮靈脂三味。加白朮茯苓肉蔻訶子各二錢。人參三錢。

一、久痢不止。胃虛成疳。此疳痢也。本方去蘆薈莪朮青皮靈脂四味。加訶子肉三錢。建蓮肉三錢。

一、瘡久未已。胃虛成疳。此必有癖。謂之疳瘻。本方去蘆薈靈脂二味。加黃耆鱉甲柴胡半夏神麴三稜各二錢。倍人參三錢。

一、腦疳。皮毛光急。滿頭瘡餅。腦熱如火。髮結如穗。遍身多汗。腮腫顙高。令兒眼痛。病在肝。本方去莪朮砂仁青皮陳皮五味。加膽草川芎升麻羌活防風各二錢。

一、脊疳。蟲食脊膺。發熱黃瘦。積中生熱。煩渴下痢。拍背如鼓鳴。脊骨如鋸齒。或十指皆瘡。頻嚙指甲。宜安蟲丸。蓋五疳或有停食成積。積久生蟲。或如絲髮。如馬尾。多出於頭項背腹之間。蟲色黃。目赤者可治。青黑者難治也。安蟲丸。即本方去莪朮砂仁陳皮青皮當歸川芎六味。加苦練根白皮貫衆蕪荑檳榔各二錢。

一、蛔疳。縞眉多哭。嘔吐清沫。腹中作痛。痛時腹中結聚成塊。摸之硬起。滿肚青筋。脣口紫黑。腸頭嚙養者是也。蛔從口鼻出者難治。宜安蟲丸。即上方。

一、丁奚疳。手足極細。項小骨高。肌削體瘦。腹大臍突。號叫胸陷是也。集聖丸本方。

一、哺露疳。虛熱往來。頭骨分開。翻食吐蟲。煩燥嘔噦者是也。集聖丸本方。

一、無辜疳。因浣衣夜露。被無辜鳥落毛所污。小兒服之。身體發熱。日漸黃瘦。腦後項邊有核如彈丸。按之隨動。軟而不痛。其中有蟲如米粉。宜刺破其核。以膏藥

貼之內以本方去莪朮砂仁靈脂三味。加黃耆鱉甲檳榔各二錢。

一、疳熱。由於胃脾虛弱。陽浮於外。氣不歸元。只以補脾為主。使陽氣收斂。熱自退矣。用參苓白朮散。多服爲妙。或兼脾陰虛者。間服六味地黃丸。

一、疳渴。由胃氣下陷。津液不生故也。宜補其胃。使清陽上升。津液漸生。渴自止矣。七味白朮散。

一、走馬疳。蟲病也。齒屬腎。腎生虛。纔受熱邪。直奔上焦。初起口臭。名曰臭息。次則齒黑。名曰崩砂。甚則齦爛。名曰潰槽。有血迸出。名曰宜路。甚則齒皆脫落。名曰腐根。縱得全活。齒不復生。外證腦熱肌瘦。手足如冰。寒熱時有。滑泄肚痛。口臭乾渴。齒齦破爛。爪甲黧黑。身多瘡疥。痘疹之後。多有此症。不可救治。毒歸於腎故也。初起者清胃散。另有治法。在齒牙本門。

一、魛病。兒將週歲。母復有娠。兒飲其乳。謂之魛音乳。以成此證。或有母患別病。兒飲其乳。以類母病者有之。蓋母之血氣若調。乳則長養精神血氣。一病乳則反爲病根。母既妊娠。精華下蔭。衝任之脈。不能上行。氣則壅而爲熱。血則鬱而爲毒。小兒神氣未全。易於感動。其候寒熱時作。微微下利。毛髮脫落。意殊不悅。甚

則面色痿黃。腹脹青筋。瀉青多吐。日漸肢羸。竟成疳證。俗以孕在胎中。因兒飲乳。其魄識嫉。而致兒病。故謂之胎妒。龍膽湯。

一、骨蒸之病。多起於胃。其始也。邪火上沖。而不能啖。火消燦而善饑。蓋胃爲氣血之海。氣血不足。邪火殺穀。水之精氣。不足濟之。漸成口穢煩躁。夜熱朝涼。毛焦口渴。氣促盜汗。形如骨立。謂之消瘵。若大便日十餘行。肢瘦腹大。頻食多饑。謂之食併。此皆邪火爲害。耗傷津液而致者。大肥兒丸。

入方

參苓白朮散 治脾胃虛弱。飲食不進。或嘔吐瀉痢。及大病之後。補救脾胃。此方如神。

官揀參切片

漂白朮土炒

白雲苓乳蒸

懷山藥兩各一

芽桔梗

薏苡仁

建蓮肉去心

炙甘草錢各一

共爲細末。每服一二錢。薑棗湯調服。

六味地黃丸 方見卷二胎疾門 七味白朮散一方見卷三泄瀉門

清胃散 治走馬牙疳。

雅黃連

白當歸

綠升麻

懷生地

粉丹皮

白芷梢 等分

北細辛 錢半

淨水煎滾熱服。

龍膽湯 治小兒魘病。

龍膽草 一錢

鈎藤鈎 一錢

北柴胡 一錢

芽桔梗 一錢

赤芍藥 一錢

正川芎 一錢

官揀參 一錢

白雲苓 一錢

炙甘草 五分

井水煎服。外以夜明砂不拘多少以紅紗作一小袋盛之。繫兒胸前。

大肥兒丸 治小兒脾胃虛弱泄瀉骨蒸。

官揀參 焙乾

山查肉 炒

漂白朮 土炒

真廣皮 炒

蓬莖朮 炒

川厚樸 薑製

六神麴 炒

雅川連 薑製

胡黃連 炒

杭青皮 醋炒

白雲苓 乳蒸

杭白芍 酒炒

地骨皮 酒炒

宣澤瀉 炒

肉豆蔻

尖檳榔

正川芎炒

北柴胡酒炒

史君肉炒

乾蟾蜍蜜炙

炙甘草錢各五

五穀蟲一兩

共爲末。煉蜜爲丸。彈子大。米飲化下。

加減肥兒丸。治一切久病成疳。總歸虛處。不可以前法治之。只宜以此丸久服。以補爲消。無不愈者。

官揀參焙切片

嫩黃耆蜜炙

漂白朮土炒

白雲苓乳蒸

廣陳皮酒炒

杭青皮醋炒

白當歸酒洗

大鼈甲醋炙

正川連薑製

南木香屑

使君肉炒

乾蟾蜍酒炙

炙甘草各等分

右爲細末。另以山藥打糊爲丸。隨兒大小加減。日日服之。以米湯調下。病愈藥止。

疳證簡便方

小兒疳積。肚大黃瘦。骨立。頭上瘡痂。髮如麥穗。用乾蟾蜍三五隻。去四足。以香油

塗之。炙焦爲末。蒸黑棗去核。取肉搗膏。和蟾末爲丸。龍眼核大。每日三服。積垢自下。多服之。形容自變。其病如失。又方。買大漿蟲四兩。洗極淨。曬乾。微炒爲末。加甘草細末五錢。米糊爲丸。彈子大。每服一九。米飲化下。小兒諸疳日久。頭面生瘡。爛成孔凹。如大人楊梅瘡樣。用蒸糯米飯時。甑蓋四邊。滴下氣水。以碗盛取。掃瘡上。數日卽效。百藥不驗者。此方如神。疳蝕口爛。用糞蛆洗漂極淨。曬乾。微炒爲末。褐衣燒灰減半。共研勻。頻吹口內效。小兒口疳破爛。人中白煨過。厚黃。礬蜜炙焦。二味等分。少加冰片。共研末。以鹽茶洗口。復以藥搽之。走馬牙疳。及齒齦腐爛。黑臭者。用溺桶內多年積垢。名人中白。煨紅一兩。兒茶五錢。黃礬。薄荷。青黛各一錢。冰片三分。共研細末。先以溫水漱口。然後吹藥於疳上。每日六七次。吹藥之時。涎從外流者爲吉。涎收向內者毒入裏也。不治牙疳鼻疳。人中白煨一錢五分。毛褐灰枯白礬各一錢。爲細末。溼者乾搽。乾者先以香油潤溼。然後搽藥。急疳蝕爛口鼻欲死。海中紫貝子煨過。俗名南蛇牙齒。又名砒礬。嶺南稱狗支螺者是也。炭火煨過爲末。臘豬油調塗。牙疳潰爛。穿唇破舌。併治口瘡。胡黃連五分。膽礬。兒茶各一錢五分。共爲細末搽之。

嘔吐證治

經曰。諸逆衝上。皆屬於火。諸嘔吐酸。皆屬於熱。又曰。寒氣客於腸胃。厥逆而出。故痛而嘔。夫嘔吐者。陽明胃氣下行曰順。今逆而上行。故作嘔吐。其證有聲有物。謂之嘔。有物無聲。謂之吐。有聲無物。謂之噦。又曰。乾嘔久病。見此者死。蓋小兒嘔吐。有寒有熱。有傷食。然寒吐熱吐。未有不因於傷食者。其病總屬於胃。復有溢乳。嘔乳嘔噦。皆與嘔吐相似。而不可以嘔吐治之。更有寒熱拒隔之證。又有蟲痛而吐者。皆當詳其證而治之。凡治小兒嘔吐。先宜節其乳食。節者減少之謂也。凡嘔吐多渴。不可與之茶水。水入復吐。終不能止。必強忍一二時久。而後以米湯與之。吐自止矣。寒吐者。乳片不消。多吐而少出。面白眼慢。氣緩神昏。額上汗出。脈息沉微。宜溫中消食。輕者藿香正氣散。不止。理中湯加藿香。又不止。參香散。再若不止。此陰盛格陽。謂之拒格。急以理中湯一劑。用公猪膽汁和童便少許。將藥潤溼炒熟。煎服即止。此內經熱因寒用之法也。蓋陰寒太過。陽熱之藥。拒而不納。故以猪膽童便爲嚮導。其始則同。其終則異。下咽之後。陰體漸消。陽氣乃發也。

熱吐者。面赤脣紅。吐次少而出物多。乳片已消。黃色遍身。發熱而煩躁。夏月多此證。宜五苓散加藿香。不止。藿連湯。再不止。用理中湯。煎熟。調六一散。冷服。卽止。此寒因熱用也。傷食吐者。眼胞浮腫。面色微黃是也。其熱夜重日輕。或吐醱酸之氣。或吐黃水。或吐青痰。其脈弦實而滑。此有宿食也。宜下去其積。乃止。消積丸。傷乳吐者。纔乳卽吐。或少停而吐。此因乳食無度。脾胃嬌嫩。不能運化。此滿則溢也。名噤乳。初宜節其乳。則吐自止。噤乳者。時時吐乳而不多。似吐非吐。皆胃虛所致也。宜參香散。有乳多而吐出者。非真吐也。苟不知禁。卽成真吐也。百日內小兒多有之。蓋身小身軟。必待乳母擁抱之。苟有傾側。乳卽溢出。此人事也。不須藥治。嗽吐者。兒有咳嗽。必待其嗽定。方可與乳。若嗽未定。以乳呷之。其氣必逆。乳不消化而爲痰。痰氣壅塞。嗽不得轉。而吐乳也。枳桔二陳湯。小兒初生。三日內吐乳者。用丁香三粒。陳皮三分。生薑三片。煎服自止。又不若夏薑湯更妙。此予用最多者。蓋三四日內。總皆寒吐也。初起噤乳。卽當調治。如噤不已。卽成吐。吐不已。卽成嘔。嘔不已。卽成噦。至此胃氣大虛。精神漸脫矣。嘔吐不已。日漸沉困。顙陷顙腫。青筋大露者。併頻吐不食。昏沉語塞。喘急大熱。常吐腥臭。

者皆死。噦者有聲無物。最危之候。凡人大病之後而見此者。皆爲不治。予按爲醫者臨診治病。貴能體貼病情。能用心法。大凡嘔吐不納藥食者。最難治療。蓋藥入卽吐。安能有功。又切不可強灌。胃口愈吐愈翻。萬不能止。予之治此頗多。先將薑湯和土作二泥丸。塞其兩鼻。使之不聞藥氣。然後用對證之藥煎好。斟出澄清。冷熱得中。止服一口。卽停之半時之久。再服一口。又停之良久。服二口。停之少頃。則住服不吐矣。斯時胃口已安。焉能得吐。愚人不知。明見其吐藥不納。偏以整杯整碗強灌之。則一吐傾囊而出。又何藥力之可恃乎。此等之法。不但幼科可用。卽方脈亦當識此。倘臨證不體病情。全無心法。卽如嘔吐一證。雖能識病。雖能用藥。其如不納何哉。

入方

藿香正氣散 方見卷二類搐門

理中湯 方見卷二乳子傷寒門

參香散 治小兒胃虛作吐。諸藥不止。

官揀參焙切片

上沉香銼末

公丁香研

藿香梗焙

南木香銼屑各等分

共爲細末。每服五七分。木瓜煎湯調服。

五苓散 方見卷二中暑門。此加藿香。

藿連湯 治小兒熱吐不止。

真雅連七分薑汁焙 紫厚樸一錢薑汁炒

藿香葉 一錢

生薑三片。大棗三枚。水煎熱服。

六一散 方見卷三痢疾簡便方。

清積丸 治食停胃口而作吐。

西砂仁十三四個酒炒 公丁香 九粒

烏梅肉三個蒸去核取淨肉 巴豆仁二粒搗去油

共研細末。米糊爲丸。菴豆大。每服三丸。白湯送下。

枳桔二陳湯 治小兒胸膈有痰。咳嗽作吐。

陳枳殼 一錢 芽桔梗 一錢

白雲苓 五分

法半夏 一錢

真廣皮 一錢 炙甘草 五分

生薑三片。大棗二枚。水煎熱服。

嘔吐簡便方

小兒嘔吐。外證不熱不渴。面白脣淡。神慢氣怯。寒吐也。用生薑一大塊。直切薄片。勿令折斷。層層摻鹽。以苧麻緊紮。外用草紙七層包之。水溼。慢火煨令熟。取起。去麻紙。將薑搗爛。和早米煎湯服。立止。小兒卒嘔不止。生薑取自然汁一盞。煎滾。聽用。蜂蜜四兩。煉熟聽用。每服用薑汁一匙。蜜二匙。白湯調服。每日五六次效。小兒胃熱嘔吐。外證面赤煩躁。身熱作渴。手足心熱者。熱吐也。黃連一錢。薑汁炒熟。石膏一錢。共爲細末。每服一錢。白湯調下。吐止。止後服。又用枇杷葉火上炙之。刷淨毛。每用葉三片。煎湯熱服。立止。小兒乾嘔極惡之證。用甘蔗取汁聽用。生薑取汁聽用。臨服用蔗汁六匙。薑汁二匙。和勻溫熱服。不用湯水調。凡嘔吐服藥不納者。內有蛔蟲。有膈間蛔。聞藥氣則動。動則藥出而蟲不出。但於嘔吐藥中。加入川椒十四粒。則不吐矣。蓋蛔得椒則伏矣。治小兒一切吐逆。不拘冷熱。及久吐諸藥不效者。用硫黃五錢。水銀一錢。同研至

不見星。薑汁打米糊爲丸。小豆大三歲者三丸。大人則三四十丸。以陰陽水送下。此二味加增分兩。入湯城礮內封固。以炭火升煉之。卽是靈砂。爲仙家所用之物。最能升降陰陽。交濟水火。乃扶危濟困之神丹也。

泄瀉證治

經曰。水穀之寒熱。感則害人六府。又曰。虛邪之中人也。留而不去。傳舍於腸胃。多寒則腸鳴飧泄。食不化。多熱則溏如糜。夫泄瀉之本。無不由於脾胃。蓋胃爲水穀之海。而脾主運化。使脾健胃和。則水穀腐化。而爲氣血以行榮衛。若飲食失節。寒溫不調。以致脾胃受傷。則水反爲濕。穀反爲滯。精華之氣。不能輪化。乃致合污下降。而泄瀉作矣。凡泄瀉腸鳴腹不痛者。是溼。宜燥滲之。飲食入胃不住。或完穀不化者。是氣虛。宜溫補之。腹痛腸鳴瀉水。痛一陣瀉一陣者。是火。宜清利之。時瀉時止。或多或少。是痰積。宜豁之。腹痛甚而瀉。瀉後痛減者。爲食利。宜消之。體質者下之。如脾泄已久。大腸不禁者。宜澀之。元氣下陷者。宜升提之。泄瀉有五。寒熱虛實食積也。但宜分別所瀉之色。凡暴注下迫。屬火。水液澄清。屬寒。老黃色。屬心。

脾肺實熱。宜清解。淡黃色屬虛熱。宜調補。青色屬寒。宜溫。白色屬脾虛。宜補。醬色屬溼氣。宜燥溼。酸氣屬傷食。宜消。脾土虛寒作瀉。所下白色。或穀食不化。或水液澄清。其候神疲。脣口舌俱白色。口氣溫熱。宜理中湯。或六君子湯。熱證作瀉。瀉時暴注下迫。謂其出物多而迅速也。便黃溺赤。口氣蒸手。煩渴少食。宜五苓散加梔仁。有傷食及滯瀉者。其候口噴酸氣。吞酸腹脹。一痛即瀉。一瀉痛減。保和丸消之。

如食已消。痛已止。而猶泄瀉不止者。乃脾失清升之氣。氣虛下陷。補中益氣湯。有風瀉。瀉而色青稠黏。乃肝木乘脾。宜六君子湯加防風柴胡白芍。有溼瀉。腹內腸鳴。肚不痛。身體重而瀉水。或兼風者。水穀混雜。宜升陽除溼湯。凡大瀉作渴者。其病不論新久。皆用七味白朮散。生其津液。凡痢疾作渴亦然。蓋白朮散爲渴瀉之聖藥。倘渴甚者。以之當茶水。不時服之。不可再以湯水兼之。則不效矣。久瀉不止。多屬虛寒。宜參苓白朮散。加肉豆蔻煨熟爲丸。服之自止。久瀉未止。將成疳者。參苓白朮散。加肉豆蔻煨。倍加懷山藥。共爲末。每日服之。則泄瀉自止。津液自生。不致成疳矣。

經曰。五虛者死。一脈細。二皮寒。三少氣。四泄瀉不止。五飲食不入。五虛悉具者死。能食者生。
凡瀉不止。精神好者。脾敗也。吐瀉而脣深紅者。內熱也。色若不退者死。面黑氣喘者死。遺尿不禁者。腎氣絕也。

入方

理中湯 方見卷二乳子傷寒門。

六君子湯 方見卷二類搐門。

五苓散 方見卷二傷暑門此加梔仁。

補中益氣 方見卷一保產門。

升陽除溼湯 治風溼作瀉。

綠升麻 一錢 北柴胡 一錢

宣澤瀉 一錢 結猪苓 一錢

炙甘草 五分

北防風 二分 真廣皮 五分

六神麴 一錢 漂蒼朮 五分

生薑三片。大棗三枚。水煎熱服。若冒寒腸鳴。加益智仁半夏各一錢。

七味白朮散 治泄瀉津液下降。煩燥大渴。

官揀參一錢

漂白朮一錢

白雲苓一錢

南木香加木香葉一錢

凡飲食致病。傷於熱者。多爲大證。而停渴者少。傷於寒者多。爲停滯而全非火證。大都飲食之傷。必因於寒物者居多。而溫平者次之。熱者又次之。蓋熱則易於腐化流通。所以停滯者少。

馮楚瞻曰。大凡小兒傷食。皆由胃氣怯弱所致。今時之醫。以平胃散爲脾胃之準繩。孰知平胃者。胃中有高阜。則能使平之。使一平卽止。切不可過用平劑。如過用。則平坦之地。反成坑坎矣。又不若枳朮丸爲勝。方爲潔古老人所製。用枳實二兩。白朮二兩。補多於消。先補而後消也。但此丸原爲傷食者設。今若耑以爲補脾藥。又誤矣。夫枳實有推牆倒壁之功。用之不當。能無尅削。卽如山查神麴麥芽。舉世所當用者。然山查能化肉積。凡多年母猪肉。煮之不爛。但入山查一撮。登時皮肉卽糜。又產婦兒枕痛。以山查煎服。兒枕立化。可見其破滯之功。豈可輕用。麴麥者。

以米飯在磁缸中。必藉麴以釀酒。必藉藥以成糖。脾皆在人身中。非磁缸。此原有化食之功。今食不化。因其所司者病也。只補其運用之能而食自化。何必用此清劑藥哉。

大凡小兒原氣完固。脾胃素強者。多食不傷。過時不飢。若兒先因本氣不足。脾胃素虧者。多食易傷。如攻伐一用。飲食能消而脾氣復。經此一攻消伐。愈虛其虛。後日食不化。猶謂前藥已效。湯丸疊進。展轉相嘗。羸瘦日增。良可悲矣。故醫有貧賤之醫。有富貴之醫。膏粱子弟。與藜藿不同。太平之民。與瘡痍自別。鄉村里巷。頑夫壯士。暴有所傷。攻伐之劑。一投可愈。倘膏粱幼穉。稟受怯弱。嬌養柔脆。一例施之。貽害不少矣。

楚瞻曰。人之脾胃之所專。脾胃雖能化食。實由於水火二氣。運用其間。非脾能也。丙火盛則脾胃燥。水盛則脾胃溼。皆不能健運。乃生諸病。

傷食證治

經曰。飲食自倍。腸胃乃傷。東垣云。飲者無形之氣也。食者有形之血也。由此推

之乳爲血液。飲之類也。穀有糟粕。食之類也。乳之與食。原非同類。豈可不辨乎哉。凡小兒飲食傷脾之證。非可一例而論。有寒傷。有熱傷。有暫病。有久病。有虛證。有實證。但熱者暫者實者。人皆易知。而寒者久者虛者。人多不識。如今之小兒。以生冷瓜果。致傷胃氣。而爲腹痛瀉痢者。人猶以爲火熱。而治以寒涼。是不識寒證也。有偶因停滯而爲脹痛。人皆知其實也。然脾胃之素強者。卽滯亦易化。惟其不能化者。則但有脹滿之證。又或有不食。亦知飢。少食卽作脹。或有無飢無飽。全不思食。或因病有傷胃氣。亦不思食。本非有餘之證。時醫遇此。無論有餘不足。鮮有不用開胃消導之劑者。是不知虛證也。蓋脾胃原有運化之功用。今旣不能消化其食。則運用之職已失其權。而尙可專意用剋削之劑。以增益其困乎。故凡欲治病。必先藉胃氣以爲行藥之主。若胃氣壯者。攻之則去。而疾常易愈。此以胃氣強壯而藥力易行也。胃氣虛弱者。攻之亦不去。此非藥不去病。以胃氣本虛弱。攻之則益虛弱。而藥力愈不行。則胃愈傷。而病亦愈甚矣。若乃體質貴賤。尤有不同。凡藜藿之兒。壯健之質。及新暴之病。自宜消伐。惟速去爲善。如以弱質弱病。而不顧脾胃虛實。概施欲速攻治之法。則無有不危矣。

凡素喜冷食者。內必多熱。素喜熱食者。內必多寒。故內寒者不喜寒。內熱者不喜熱。然熱者嗜寒。多生中寒。寒者喜熱。多生內熱。而經所謂久而增氣。物化之常。氣增而久。夭之由也。凡治病者。又當於素秉中察其嗜好偏勝之弊。

粉乾葛二錢

炙甘草五分

水煎當茶飲。

此方治小兒陽明本虛。陰陽不和。吐瀉而亡津液。煩渴口乾。以參朮甘草之甘溫。補胃和中。木香藿香辛溫以助脾。茯苓甘淡分陰陽。利水溼。葛根甘平。倍於衆藥。其氣輕浮。鼓舞胃氣。上行津液。又解肌熱。治脾胃虛弱泄瀉之聖藥也。兼治久瀉不止。口渴無度。並痢疾口渴。幼科之方。獨推此爲第一。後賢宜留意焉。

參苓白朮散

方見卷三疳證門

泄瀉簡便方

治水瀉。或飲食過度。或飲水多。當暑而發。用生薑二錢搗爛。陳細茶三錢。濃煎湯飲立止。蓋泄瀉由臟府陰陽不和。薑能和陰。茶能和陽。是以多效。體素弱者加蓮

子去心二錢。

泄瀉因傷食而起。米穀不化。不思飲食。困弱無力。用白朮土炒。白茯苓三錢。水煎。食前服。腹痛者。加炒白芍一錢。炙甘草五分。

泄瀉因於寒者。腹痛手足冷。用胡椒十四粒。生薑一錢。淡豆豉二錢。煎湯熱服。泄瀉腹痛奇方。用鷄蛋一枚。將小頭打一小孔。入胡椒七粒在內。以紙封孔。紙包煨熟。酒送更效。胡椒吞與不吞。不拘。

脾虛久瀉。用白朮土炒。山藥酒炒。蓮肉去心蒸熟。砂仁酒炒。各一兩。共爲細末。以白砂糖二兩和勻。每服二三錢。米飲調下。

又方。用早米造飯鍋巴。取四兩研末。蓮子去心。蒸晒爲末四兩。白糖四兩。共和勻。每服二三錢。白湯調下。每日三服。

集成止瀉散。治久瀉如神。此方經驗最多。用車前子。以青鹽水炒七次。秤過二兩。白茯苓炒二兩。山藥炒二兩。炙甘草六錢。共爲細末。每服二三錢。炒米湯調。烏梅湯更好。真神方也。

渴證。火偏盛而水不能制。水腫證。水偏盛而火不能化。惟制其偏而使之平。則善。

矣。制者非謂去水去火之意。人身水火。本自均平。偏者病也。火偏多者。補水配火。不必去火。水偏多者。補火配水。不必去水。譬之天平。此重而彼輕。一邊重者。只補彼輕之一邊。決不鑿去馬子。蓋馬子一定之數。今人見水利水。見火瀉火。是鑿馬子者也。

小兒之病。傷食最多。故乳食停滯。中焦不化而成病者。必發熱惡食。或噫氣作酸。或惡聞食氣。或欲吐不吐。或吐出酸氣。或氣短痞悶。或腹痛啼叫。此皆傷食之候也。便宜損之。損之者。謂姑止之。勿與食也。使其自運。經謂傷之輕者。損穀則愈矣。損之不減。則用胃苓丸以調之。調之不減。則用保和丸以導之。導之不去。則攻下之。輕則木香檳榔丸。重則消積丹。

傷食一證。最關利害。如遷延不治。則成積成癖。治之不當。則成疳成癆。故小兒之強壯者。脾胃素實。爲其能食。父母縱之。以致太過。停留不化。此食傷脾胃。直傷食也。可用前法治之。如小兒之怯弱者。脾胃素虛。所食原少。或因略加。卽停滯而不化。此乃脾虛不能消穀。轉運遲耳。非真傷食。作傷食治。則誤矣。惟宜六君子湯助其健運。多服自運。

凡小兒脾胃實者。倘縱其口腹。不知節制。則飲食自倍。腸胃乃傷。而實者必致爲虛矣。其體之虛怯者。能節其飲食。則腸胃不傷。穀氣漸長。而虛者終變爲實矣。凡傷食吐瀉後。則其所傷之物俱去。只與和其胃氣。或異功散或六神丸。

入方

潔古枳實丸。治小兒傷食。脾不運化。以致面黃肚大。此方補多消少。可爲傷食運化之良方。

漂白朮

二兩用土拌炒

小枳實

一兩酒炒

胃虛不思飲食者。藿香葉五錢焙。西砂仁五錢酒炒。名香砂枳實丸。謂兒體質肥白有痰者。加真廣皮五錢酒炒。法半夏五錢。名橘半枳實丸。右藥炒製。以鮮荷葉包飯煨熟。去荷葉。將飯同前末撮勻。爲丸極小。每一二錢。半飢白湯下。

胃苓丸 方見卷二傷溼門。

保和丸 治飲食停滯。胸膈痞悶。腹脹等證。

六神麴炒

真廣皮炒

法半夏

白雲苓炒各一兩

京查肉三兩

淨連翹炒

蘿蔔子炒各五錢

共爲細末。煉蜜爲丸。每服一二錢。薑湯下。

木香檳榔丸。治傷食消之不去。以此下之。

黑牽牛炒取頭末五錢

尖檳榔炒五錢

錦莊黃五錢酒蒸晒乾

南木香三錢

六神麴炒一兩

共爲細末。薑汁打米糊爲丸。量兒大小加減用之。此方亦不峻厲。白湯送下。

消積丸。方見卷三嘔吐門。

六君子湯。方見卷二類搐門。

異功散。專治脾胃虛弱。吐瀉之後。以此調理。大病之後亦用。

官揀參切片

漂白朮土炒

白雲苓乳蒸

真廣皮酒炒

炙甘草各等分

生薑大棗。水煎服。共爲末。薑棗湯調服亦可。

六神丸。與異功散主治同。實脾之功勝之。

官揀參切片焙乾

漂白朮土炒

白雲苓乳蒸

懷山藥酒蒸

白扁豆炒

炙甘草各等分

共爲末。煉蜜丸。彈子大。每服一九。薑湯化下。

食積證治

經曰。新積痛可移者。易已也。積不痛。難已也。夫飲食之積。必用消導。消者散其積也。導者行其氣也。脾虛不運。則氣不流行。氣不流行。則停滯而爲積。或作瀉痢。或成癥痞。以致飲食減少。五臟無所資稟。血氣日愈虛衰。因致危困者多矣。故必消而導之。輕則和解常劑。重必峻下湯丸。蓋濁陰不降。則清陽不升。客垢不除。則真元不復。如勘定禍亂。然後可以致太平。若積因脾虛。不能健運。藥力者。或消補並行。或補多消少。或先補後消。潔古所謂養正而積自除。故前入破滯削堅之藥。必須參朮贊助成功。經曰。無攻邪。無失正。絕人長命。此之謂也。夫食者。有形之物。傷之。則宜損其穀。其次莫若消之。消之不去。則攻之。此治初傷乳食之法也。倘治之不早。以致陳莖菴聚。乃成積也。其候面色黃白。或青黃。腹大。

或緊。食少腹痛。發則數日不止。而醫者治積。不問平日所傷之物。是寒是熱。并不察兒之形氣。或虛或實。可攻不可攻。竟用偏寒偏熱峻下之藥。而犯虛虛之戒。其害豈勝言哉。如先傷熱乳熱食者。則爲熱積。傷冷乳冷食者。則爲冷積。五穀之類。爲食積。禽畜之類。爲肉積。菜菓之類。爲冷積。故用藥宜分寒熱。冷積應用消積丸。熱積應用木香檳榔丸。仍用原傷之物。作湯送之。謂之遡源。凡用攻下取積之藥。必先補其胃氣。如六君之類。頓服數劑。扶其元神。然後下之。免傷胃氣也。如小兒體質素弱者。雖有積。必不宜下。當以補爲消。六君子湯加莪朮木香。共爲細末。薑汁打神麴糊爲丸。每服一二錢。米湯下。久服自消。今兒稟受怯弱者。易有積。皆當識此。攻積之藥。慎勿輕用。

入方

清積丸 方見卷三嘔吐門。

木香檳榔丸 方見卷三傷食門。

六君子湯 方見卷二類搐門。此加莪朮木香。

食積簡便方

消積丸。消食。消水。消氣。消痞。消脹。消腫。消積。其功甚捷。惟人病虛羸者。不宜用。

此比前消積丸藥力輕緩。不甚峻厲。

香附米酒炒一枚

五靈脂淘淨一兩

黑牽牛炒取頭二兩

共爲細末。醋打麵糊爲丸。菴豆大。每服一二十九。食遠薑湯服。

治傷冷食及難化之物。用生薑紫蘇煎濃湯。置浴盆內。令患者乘熱坐湯內。以手揉其脾胸。以熱湯淋之。氣通卽化矣。

又方。以生薑搗爛。紫蘇搗爛。炒熱布包。熨胸腹。如冷。再炒再熨。神效。

治傷食停積不消。用白酒麴即酒二兩老麥芽取淨末一兩。共爲細末。每服二錢。

白湯調下。治粽傷及糯米所傷。更妙。

治飲食停滯。飽悶不消。以糯米一升炒熟。以布包之。分作二包。於臍腹上輪換熨。

之助其脾氣。轉運立消。因食肉停滯不消。用山查子三十粒。搥碎。煎濃湯。食之。

自化。因食大肉成積不治。則殺人。用山查肉十四粒。杏仁去皮尖二十四粒。煎。

濃湯飲之自化。因食牛肉腹脹不消。用乾稻草一把煎濃湯。乘熱飲之。自消。因麵食腹脹。生薑搗汁。沖好酒熱服。卽消。又方。以生蘿蔔取汁。溫熱服。神應。凡食麵必用醋。斷不作脹。因食菱角腹痛作脹。生薑搗爛。取自然汁。以滾湯沖服。立消。因食瓜果生冷太多。以致腹脹氣急。用真青化桂去麤皮。取肉研細末。以飯搗和爲丸。菉豆大小。小兒每服五丸。稍長者十丸。水送。病愈藥停。凡小兒病。醫認證不確。錯用反藥。或煩躁不寧。或吐瀉不止。欲與解去其藥。用黑豆一杯。甘草三錢。煎濃湯服之。自解。倘無黑豆。菉豆亦好。

發熱證治

經曰。陽勝則熱。陰勝則寒。重寒則熱。重熱則寒。寒傷形。熱傷氣。又曰。氣實者熱也。小兒之病。多有發熱。然幼科論證太繁。來學眩目。莫得其要。予謂小兒之證。惟宜明顯簡便。有裨於治療足矣。今以小兒發熱。分爲四大證。一曰表熱。一曰裏熱。一曰虛熱。一曰實熱。表裏虛實既明。則大綱在手。然後遂證辨認。又豈能逃其冰。

鑑乎。

一、小兒無故發熱。多由外感風寒。其證喜人懷抱。畏縮。惡風寒。不欲露出頭面。面帶慘色。不渴。清便自調。吮乳口不熱。或鼻塞流涕。或嚏噴。渾身拘急。此表熱也。初起時一汗可解。桂枝湯加柴胡粉葛熱服。取微汗效。若元氣怯弱者。四君子湯加防風柴胡粉葛。

一、發熱時喜露頭面。仰身臥。揚手擲足。揭去衣被。渴欲飲水。吮乳不化。吮乳口熱。小便赤。大便閉。此裏熱也。宜解利之。導赤散煎送瀉青丸。

一、虛熱者。多從大病之後。或溫熱。或潮熱。如潮汐有定期也。或渴或不渴。大小便如常。宜補之。竹葉調元湯。

一、實熱者。面赤腮燥。鼻孔乾焦。喜就冷。或合面臥。或仰面臥。露出手足。揭去衣被。大渴不休。大小便秘。宜微下。集成沆瀣丹。已上四熱爲綱。其下雜證爲目。有綱有目。而猶不能辨別者。未之有也。

傷風發熱。其證自汗身熱。呵欠。目赤多睡。惡風喘急。此因解換襦裳受風所致。治宜解肌。柴葛桂枝湯。退熱之後。略宜滋陰。

傷寒發熱。其證無汗身熱。呵欠頓悶。項急面赤。喘急惡寒。口中氣熱。此因脫換受寒所致。治宜惺惺散。熱退後。微服沆瀣丹。以防內熱。既傷風寒發熱。又兼吐瀉者。不可發散。此胃脾虛怯也。但以五苓散煎送理中丸。傷熱發熱者。多在夏月。其證身熱自汗。作渴昏睡。手足俱熱。此因天氣過熱。而包裹過後受其熱也。人參白虎湯以解其熱。次以調元生脈散補之。傷暑發熱。夏月有之。其證身熱自汗。作渴昏睡。手足冷。此由高堂廣廈。陰冷太過。中氣受傷所致。先以調元生脈散補其氣。次服四君子湯。以防吐瀉。心熱者。渾身發熱。面青目浮。心悸不寧。脈數煩躁。狂叫恍惚。此心熱也。導赤散加黃連。

板熱者。夜間作熱。旦則退去。此血虛也。六味地黃湯加龜板當歸白芍。斂納陰氣。傷寒無汗。服表藥而汗出。其熱不退。又復下之。熱仍不退。乃表裏俱虛。氣不歸元。陽浮於外。此爲虛熱。不可誤用寒涼。卽當和其胃氣。裨陽氣收斂。其熱自退。四君子湯加炮薑。疳熱者。形色黃瘦。食不長肌。骨蒸盜汗。泄瀉無恆。肚大脚小。多起於大病之後。失於將息。又或傷饑食飽。脾氣受傷。六君子湯加當歸白芍。壯熱者。一向熱而不已。由氣血壅實。五臟生熱。鬱蒸於內。則睡臥不安。精神恍惚。蒸

發於外。則表裏俱熱。氣急喘急。甚則搐溺。以導赤散煎湯送瀉青丸。大小便秘者。集成沆瀣丹。煩熱者。躁熱不安。五心煩躁。四肢溫壯。小便赤色。此心經有熱。宜導赤散加麥冬梔仁。積熱者。面赤口瘡。大小便黃赤。此表裏俱實。或因內傷酒麵。煎炒炙燂。或誤投峻補之藥。或外因厚棉爐火。溫暖過度。皆能生熱。此人事所致。宜沆瀣丹清解之。

虛熱者。或汗下太過。津液枯焦。或大病之後。元氣受傷。皆能生熱。其證困倦少力。面色青白。虛汗自出。神慢氣怯。四肢軟弱。手足厥冷。此氣虛發厥。血氣發熱。大虛證也。四君子湯加炮薑。甚則加附子。熱退以平劑調之。客熱者。乍有乍無。熱邪干心。則熱形於頭。故先起於頭面。而後身熱恍惚多恐。聞聲則惕。此正氣虛而熱邪勝。故邪正交爭。發熱無定。乍進乍退。如客之往來莫測也。導赤散先徹其邪。後以團參散護其正氣。

血熱者。每日巳午時發熱。過夜則涼。此心經血熱也。輕則導赤散。重則四順散。

柴葛桂枝湯 治小兒傷風。自汗發熱。

嫩桂枝 一錢

杭芍藥 五分

北柴胡 一錢

粉乾葛 二錢

炙甘草 八分

老生薑 一錢

大紅棗 五兩

淨水濃煎。熱服。

惺惺散 方見卷二乳子傷寒門。

集成沆瀣丹 方見卷一胎疾門。

五苓散 方見卷二傷暑門。

理中湯 方見卷二乳子傷寒門。

人參白虎湯 方見卷二傷暑門。

調元生脈散 治夏月傷熱發熱。以此扶其元氣。

官揀參 六分

炙黃耆 五分

杭麥冬 一錢

北五味 五分

炙甘草 五分

老生薑 三片

大紅棗 三枚

淨水煎。溫服。

四君子湯 方見卷三瘧疾門。

導赤散 方見卷四啼哭門。

六味地黃湯 方見卷一胎疾門。

六君子湯 方見卷二類搐門。

瀉青丸 方見卷四啼哭門。

團參散 方見卷二類搐門。

四順清涼散 方見卷四腹痛門。

神奇外治法

疎表法 小兒發熱。不拘風寒食飲。時行痘疹。並宜用之。以葱一握。搗爛取汁。少

加麻油在內和勻。指蘸葱油。摩運兒之五心頭面項背諸處。每處摩擦十數下。運完以厚衣裹之。蒙其頭。略疎微汗。但不可令其大汗。此法最能疎通腠裏。宣行經絡。使邪氣外出。不致久羈榮衛。而又不傷正氣。誠良法也。

清裏法 小兒發熱至二三日。邪已入裏。或乳食停滯。內成鬱熱。其候五心煩躁。睡臥不寧。口渴多啼。胸滿氣急。面赤脣焦。大小便秘。此爲內熱。以雞蛋一枚。去

黃取清。以碗盛之。入麻油約與蛋清等。再加雄黃細末一錢。攪極勻。復以婦女亂髮一團。蘸染蛋清。於小兒胸口拍之。寒天以火烘煖。不可冷用。自胸口拍至臍輪止。須拍半時之久。仍以頭髮敷於胸口。以布紮之一炷香久。取下不用。一切諸熱。皆能退去。蓋蛋清能滋陰退熱。麻油雄黃拔毒涼肌故也。此身有熱者。用之。倘身無熱。惟啼哭焦煩。神志不安者。不必蛋清。專以麻油雄黃亂髮拍之。仍敷胸口。卽時安臥。此法多救危險之症。功難殫述。

解煩法 凡小兒實熱之證。及麻疹毒盛熱極。其候面赤口渴。五心煩熱。啼哭焦擾。身熱如火。上氣喘急。揚手擲足。一時藥不能及。用水粳一匙。以雞蛋清調勻。略塗兒口。及兩手掌心。復以釀酒小麴十數枚。研爛。熱酒和作二餅。貼兩足心。布紮之。少頃。其熱散於四肢。心內清涼。不復啼哭。

開閉法 凡小兒風痰閉實。昏沉不醒。藥不能入。甚至用艾火灸之。亦不知痛。蓋因痰塞其脾之大絡。截其陰陽升降之隧道也。原非死證。用生薑蒲生艾葉生薑生葱各一握。共入石臼內。搗如泥。以麻油好醋同前四味。炙熱。布包之。從頭頂背胸四肢。乘熱往下熨之。其痰一消。昏沉卽醒。此方不特小兒。凡閉證皆效。

引痰法 凡小兒痰嗽氣喘急。有升無降。喉中葷傷之聲。須當引而下行。用生白礬一兩研末。少入麵粉米粉亦可。蓋生礬見醋卽化成水。入麵粉取其膠黏故也。好醋和作二小餅。貼兩足心。布包之一宿。其痰自下。

煖痰法 凡小兒胸有寒痰。不時昏絕。醒則吐出。如菰豆粉濃厚而帶青色。此寒極之痰。前法皆不能化。惟以生附子一枚。生薑一兩。同搗爛炒熱。布包熨背心及胸前。熨完將薑附捻成一餅。貼於胃口。良久其痰自潤。

納氣法 凡小兒虛脫大證。上氣喘急。真氣浮散。不得歸元。諸藥莫效。用吳茱萸

五分胡椒七粒五倍子一錢。研極細末。酒和作餅。封肚臍以帶幫之。其氣自順。通脈法 凡小兒忽爾手足厥冷。此蓋表邪閉其經絡。或風痰阻其榮衛。又或大

病之後。陽不布散於四肢。速用生薑煨熟。搗汁半小杯。略以麻油調勻。以指蘸薑油。摩兒手足。往下擦挪揉振。以通其經絡。俟其熱回。以紙拭去之。凡小兒指紋滯澀。推之不動。急以此法推豁之。蓋此法不論陰陽虛實。用之皆效。

定痛法 凡小兒胸中飽悶。時腹疼痛。一時不能得藥。用食鹽一碗。鍋內炒極熱。布包之。向胸腹從上熨下。蓋鹽走血分。故能軟堅。所以止痛。冷則又炒又熨。痛

定乃止。男婦氣痛。皆同此法。已上九法。非古書所有。實予異授心傳。經驗既久。神應無方。筆之於書。以公世用。

治病端本澄源至要口訣

凡臨病家診視小兒。無論病之輕重。證之順逆。稍長者令其本身忌口。乳子即令乳母忌口。嚴禁葷酒油膩酸寒辛辣。但可香茶白飯。稍用蜜餞鋪食而已。蓋乳房爲胃經所主。飲食入胃。運化精微而爲榮血。貯於衝脈。衝脈載以上行。遂變赤爲白而爲乳汗。小兒賴此以爲命。與乳母氣候相關。吉凶共際。是以母食熱。子受熱。母食寒。子受寒。母食毒。子中毒。又惟葷酒油膩。口肥凝滯之物爲尤甚。故凡小兒有病。但得乳母忌口。卽不藥亦能自愈。不觀窮鄉僻壤。藜藿單寒之家。所育之子。肥實壯健。而且少病。病亦易愈。人但云他人之子。何以易育。不知他家無甘肥凝膩。口腹清淡。所以病少而易育。自家乳母。縱口飲啖。葷酒不忌。醫雖用藥得法。其如乳汁不清。胃口油滯。不能宣布藥力。所以多病難醫也。此至緊至要關頭。醫者不爲切戒。其咎在醫。至於病家。每多自誤。凡乳子有病。其母於房勞食飲。寒暑喜

怒。一毫不慎。惟責效於醫之草根樹皮。詎知刀頭圭角。能勝其無情之相火。能制其有質之油膩耶。徒令醫者勞心。病兒受苦。深可悲憫。復有婦人姑息之愛。切要提防。昔予一堂弟。年八歲。因病傷寒幾死。得遇明者保全。稍能步履。醫囑嚴忌葷腥。予伯母覲面承錯。私以爛蹄花一碗與之。病人見肉。登時食盡。時予目覲其事。後卽變證。四肢厥冷。口吐白沫。喉內痰鳴。兩目直視而絕。予伯與醫者驚惶無措。莫測其由。因詢曾食何物。伯母堅辭無有。微風不露。予亦莫敢直言。醫者無可下手。遂辭去。予取山查肉炒研細末。以濃薑湯調灌數次。蓋山查多服。最能通利五臟。大瀉數行。所下油膩膠滯之物。內有精肉猶存。人事倏清。伯見所下之物。始知食肉生變。痛詈其母。幾至反目。幸予在側開解之。令予調理。予爲暢所而安。此等曖昧。苟非予之目擊。伯母必不直告。卽至真死。彼亦不言。醫者亦不知其何以變證而死。可見婦女誤事。爲禍如此其烈也。凡類此者。以天下之大。又豈特一人而已。故凡遇膏粱宦室。不可不諄切言之。以杜其姑息之害。

小兒在胎之日。衝脈運血以養之。及其產下。衝脈載血以乳之。乳爲血化。所以兒之脾胃。獨與此乳汁相脗合。其他則皆非所宜矣。凡小兒一週二歲。止可飲之以

乳。切不可鋪以穀食。蓋穀食有形之物。堅硬難消。兒之脾氣未強。不能運化。每多因食致病。倘乳少。必欲借穀食調養者。須以早米炒熟。胡粉微入。白糖滾湯調服。不致停滯。至於肉食。尤爲有害。凡小兒五證之內。能忌肉食。終身無脾病。無奈愚婦愚夫。莫可曉喻。見兒病稍愈。卽以肉食飼之。謬云虛補不如實補。謂藥補爲虛。肉補爲實。不知此語出於何經。妄誕無知。真堪唾罵。及其脾胃凝滯。兒病復作。始爲倉惶懊悔。是誰之咎。故小兒病後。必不可妄用葷腥。只可素食調理。或一月半月。待其脾氣已健。始可略與清湯。仍不得過用甘肥。蓋甘肥之物。非但不能益兒。適足以致病。醫者能知此意。治病必不掣肘。病家能依禁忌。斷無反復之虞。此非摹擬之辭。實知之深見之確。端本澄源。莫切乎此。予雖未學。臨證有年。病家之弊。無不周知。故不得不剖心相告。庶後賢知所提備云。

痢疾證治

經曰。飲食不節。起居不時。陰受之則入五臟。填滿閉塞。下爲飧泄。久爲腸癖。夫飧泄者。水穀不化也。腸癖者。下痢是也。小兒之病。傷食最多。內有宿食停積。更受

外感則成痢矣。古今方書以其閉滯不利。或又謂之滯下。其證裏急後重。或垢或血。或見五色。或多經紫。或痛或不痛。或嘔或不嘔。或爲發熱。或爲惡寒。此證之陰陽虛實最宜詳審。庶不差誤。仍當以脈證辨之。凡身熱作渴。脈數有力而能食者。爲熱。身涼不渴。脈沉無力而不能食者。爲寒。熱初起。腹中苦痛。裏急後重者。爲實。宜急下之。集成沆瀣丹。集成三仙丹。二藥同服立效。

如兼外感者。必身有寒熱。不可遽下。凡痢由外感而發者最多。急宜發散。若下之早。必致引邪入裏。而爲綿延之證。以倉廩散疎解之。因傷風而得之者。則純主清血。蓋風傷其陰絡。致血不循經。所以血妄下。宜胃風湯。若赤白相兼者。心主血。因傷熱得之。則心移熱於小腸。故赤者從小腸來。肺主氣。因傷熱者之。則肺移熱於大腸。故白者從大腸來。皆以芍藥湯治之。調血則便膿愈。行氣則後重除。此治痢之要法也。又法以黃連阿膠丸加當歸木香治血痢。於血中行氣。以胃苓丸加當歸白芍治血痢。於氣中養血。有積者治痢保和丸。痢久不止。名休息痢。切不可止瀉。和中丸最妙。後有集成至聖丹。專治久痢。百不失一。有泄瀉變痢者。有痢變泄瀉者。先瀉後變痢者。脾傳腎也。爲賊邪。難治。先

痢後變瀉者。腎傳脾也。爲微邪。易治。蓋初瀉變痢者。此氣病傳入血中。宜養血爲主。加調氣之藥。不可誤下。以傷胃氣。初痢變瀉者。血病專入氣中。以調氣爲主。加養血之藥。不可以瀉。恐毒氣留而不去。復成痢也。瀉變痢者。加味四物湯。痢變瀉者。加味四君子湯。病久不止。脾胃受傷。中氣下陷。則爲脫肛。熱毒上逆。則食入便吐。不思飲食。謂之禁口。已久痢陰傷。腎氣虛敗。則兩膝紅腫。謂之鶴膝。脫肛者。胃氣下陷。後重不除。弩掙太過。故腸頭脫出。宜養血調氣。微加升提之品。則痢止肛自收矣。白麻湯。外用洗法托法。禁口者。乃自虛逆氣上衝而吐也。有不思飲食。皆虛損也。宜參苓白朮散。米湯調服。凡痢疾能食者吉。不能食者凶。鶴膝者。兩膝紅腫。如鶴之膝。小兒痢後多有此證。乃腎虛之極。宜補腎地黃丸。加牛膝鹿茸。痢疾腹脹中氣虛也。胃苓丸調之。倘因毒氣未盡。庸流誤服瀉藥。而致腹脹者。爲實也。不可作虛治。保和丸消導之。痢疾不治證。痢見五色。五臟俱敗。痢如烟塵水。如屋漏水。下痢久。肛門如竹筒。如魚膠。久痢脣紅。胸高氣促。心煩。坐臥不安。大渴飲水。面容似朱者。

皆死證也。

入方

集成沆瀣丹 方見卷一胎疾門。

集成三仙丹 方見卷二類搐門。

倉廩湯 即人參敗毒散加陳倉米 方見卷二小兒傷風門。

治傷疫痢疾。及時行疫痢。大小相似者。宜先服此。即人參敗毒散。加陳倉米煎服。即名倉廩湯。喻嘉言以此方爲治痢之聖藥。無論新久。必用此藥升散之。是得逆流挽舟之法也。予每用之。輕者三四劑即愈矣。不必另方。重者服藥後。外證悉去。惟腹痛裏急後重未除者。以沆瀣丹三仙丹同服。推去積滯。無不愈者。蓋倉廩湯治痢。與用四逆散治痛同意。後賢宜深究焉。

胃風湯 治風冷客於腸胃。泄下鮮血。及腸胃溼毒。下如豆汁。或下瘀血。

官揀參 一錢 漂白朮 五錢 白雲苓 一錢 白當歸 一錢

正川芎 杭白芍 一錢 上桂心 五分 陳倉米 二撮

薑一片。棗一枚。水煎溫服。

河澗芍藥湯 調血便膿愈。行氣後重除。此方是也。

杭白芍 一錢五分

大當歸 一錢

雅川連 五分

實黃芩 八分

錦莊黃 五分

尖檳榔 一錢

南木香 三分

上桂心 三分

淨水濃煎。熱服。

黃連阿膠丸 治血痢。於血中行氣。

正雅連 一錢

東阿膠 二錢

白雲苓 一錢

當歸身 一錢

南木香 一錢

共爲細末。水丸。每服一二錢。米飲下。

胃苓丸 方見卷二傷暑門。

治白痢。於氣中養血。本方加當歸白芍白朮。

治痢保和丸 治痢疾。積滯未盡。或在先原未得下。今已脾虛不可下者。宜服此。

廣陳皮 一錢

法半夏 一錢

白雲苓 一錢

陳枳殼 一錢

川厚朴 一錢

正雅連 一錢

京查肉 一錢

六神麴 一錢

老麥芽一錢

南木香五分

尖檳榔五分

炙甘草五分

共爲細末。另以神麴煮糊爲丸。每服一二錢。米飲下。

和中丸 治休息痢及疳痢。

官揀參

炙甘草

當歸身

正川芎

車前子

結猪苓

宣澤瀉

六神麴

老麥芽

建蓮肉以上各二錢

漂白朮

白雲苓

真廣皮

杭白芍

南木香

炮薑炭

肉豆蔻

以上各一錢

共爲細末。酒煮麴糊爲丸。每服一二錢。米飲下。

加味四物湯 治先水瀉而變痢者。

當歸身

正川芎

杭白芍

懷生地

白雲苓

正雅連

南木香各等分

水煎。空心熱服。

加味四君子湯 治先痢而後瀉者。

上官揀

漂白朮

白雲苓

當歸身

杭白芍

炙甘草

各一錢

生薑三片。大棗三枚。水煎溫服。

升麻湯 治虛痢脫肛。仍調氣養血。微帶升提。

綠升麻

五分

官揀參

一錢

漂白朮

一錢

白雲苓

一錢

荊芥穗

一錢

真廣皮

一錢

當歸身

一錢

北防風

一錢

杭白芍

一錢

炙甘草

三分

肥烏梅

一粒

水煎食後服。

脫肛洗藥方

五倍子

五錢

白芒硝

一錢

荊芥穗

五分

煎湯薰洗。仍以五倍子研末敷之。方以軟帛托入。

參苓白朮散 方見卷三疳證門。

補腎地黃丸 方見卷三哮喘門。此加虎脰牛膝鹿茸。

胃苓丸 方見卷二傷暑門。

保和丸 方見卷三傷食門。

痢疾簡便方

治痢疾。用乾馬齒莧煮爛。紅痢以蜂蜜拌。白痢以砂糖拌。紅白相兼。蜂蜜砂糖各半拌食。一日二次。連湯服之。更妙。

治。按馬齒莧名五芳草。其葉青梗赤。根白花黃子黑。五行俱備。所以寒熱赤白皆

六一散。此方取天乙生水。地六成之之義。為北方壬癸之精。以其清暑毒。去溼熱。分陰陽。利小便。瀉丙火。從小水而出。故為治痢妙方。白滑石研細末。以清水調飛。其重濁滓質不用。待其水清。去水晒乾。每滑石末六兩。加甘草細末一兩。研勻聽用。白痢用六一散七錢。乾薑末七分。紅痢用六一散七錢。紅麴末七分。各用薑汁打麴糊為丸。梧桐子大。每服一二錢。白湯下。久痢不止。用紅糖白糖錫糖各三錢。甘草一錢。陳茶葉二錢。同煎熟。露一宿。次早溫熱服。神效。噤口痢不思飲食。以臘猪肉去肉取骨。鍋內煎膿湯。徐徐服之。百發百中。治赤

白相兼。用山查肉不拘多少。炒研爲末。每服一二錢。紅痢蜜拌。白痢白砂糖拌。紅白相兼。蜜砂糖各半拌勻。白湯調服。空心下更妙。此藥不分虛實。不分久近。皆效。甚穩甚驗。

集成至聖丹。新出治冷痢久瀉。百方無驗者。一服卽痊。凡痢之初起。實熱實積。易知而易治。惟虛人冷積致痢。醫多不以爲意。蓋實熱之證。外候有身熱煩燥。脣焦口渴。肚疼窘迫。裏急後重。舌上黃胎。六脈洪數。證候旣急。治者亦急。輕則疎利之。重則寒下之。積去而和其陰陽。無不愈者。至於虛人冷積致痢。外無煩熱躁擾。內無肚腹急痛。有赤白相兼。無裏急後重。大便流利。小便清長。此由陰性遲緩。所以外證不急。遇此切不可姑息。俱以集成三仙丹下之。以去其積。倘不急下。必致養虎貽患。其積日久。漸次下墜。竟至大腸下口直腸上口交界之處。有小曲摺隱匿於此。爲腸臟最深之處。藥所不到之地。證則乍輕乍重。或愈或發。便則乍紅乍白。或硬或溏。總無一定。任是神丹。分毫無濟。蓋此謂不在腹內而在大腸之下。諸藥至此。性力已過。盡成糠粃。安能去此沉匿之精。所以冷痢有至三五年十數年不愈者。由此故也。古方用巴豆爲丸下之者。第恐久病神虛。未敢輕用。今以至捷至

穩鴉膽子一味治之。此物出閩省雲貴。雖諸家本草未收。而藥肆皆有。其形似益智子而小。外殼蒼褐色。內肉白有油。其味至苦。用小鐵錘輕敲其殼。殼破肉出。其大如米。敲碎者不用。專取全仁用之。三五歲兒。二十餘粒。十餘歲者。三十多粒。大人則四十九粒。取天圓肉包之。小兒一包三粒。大人一包七粒。緊包空腹吞下。以飯食壓之。使其下行。更藉此天圓包裹。可以直至大腸之下也。此藥並不峻厲。復不肚痛。俟大便行時。有白凍如魚腦者。卽冷積也。如白凍未見過一二日。再進一服。或微加數粒。此後不須再服。服時忌葷酒三日。戒鴨肉一月。從此除根。永不再發矣。倘次日肚中虛痛。用白芍一根。甘草一根。重三錢等。紙包水溼。火內煨熟。取起。搥爛煎湯。服之立止。此方不忍隱秘。筆之於書。以公世用。

瘧疾證治

經曰。瘧瘧皆生於風。又曰。夏傷於暑。秋必瘧瘧。夫風與暑。陽邪也。寒與水。陰邪也。然風爲陽中之涼氣。暑爲熱中之寒邪。合是四者而言。無非皆屬乎寒。故俗號爲脾寒。謂病邪客於肌肉之間。而脾應肉也。及瘧之將發。必先手足厥冷。以脾主

四肢也。經言暑者言時氣也。寒者言病氣也。雖邪氣自淺而深。鬱寒成熱。然終不免寒爲本。熱爲標耳。人而不解。縱實亦虛。非大補真氣。大健脾胃。莫能瘳也。瘳必有寒有熱。蓋外邪伏於半表半裏。正在少陽所主之界。出與陽爭。陰勝則寒。入與陰爭。陽勝則熱。卽純熱無寒爲溫瘳。純寒無熱爲牝瘳。要皆自少陽而造其極偏。故補偏救弊。亦必還返少陽之界。使陰陽協和而後愈也。謂少陽而兼他經。則有之。謂他經而不涉少陽。則不成其爲瘳矣。瘳之不離於少陽。如咳嗽之不離於肺也。

凡小兒觸冒風寒暑溼。客於皮膚。積於臟腑。邪正相攻。陰陽偏勝。發爲寒熱往來。陽不足則先寒後熱。陰不足則先熱後寒。寒多熱少者。陰勝陽也。熱多寒少者。陽勝陰也。陰陽互攻。則寒熱相對。其初也。必內有痰食。致臟氣不流。故發而爲瘳。瘳之正發有定期。其間有一日間日二三日者。此臟氣有盛衰。邪之輕重不等也。發於夏至後處暑前者。三陽受病。傷之淺而暴也。發於處暑後冬至前者。三陰受病。傷之遠而深也。發在子後午前者。陽分受病。易愈。發在午後子前者。陰分受病。難愈。尤當以寒熱多寡。稟受強弱而參之。則得矣。瘳疾之證。始而呵欠。變而足

冷。面色青黃。身體拘急戰慄。頭項腰脊俱痛。寒去未已。內外皆熱。頭痛而渴。但欲飲水。嘔惡煩滿而不嗜食者。皆其候也。由小兒脾胃素弱。邪氣得以乘之。雖有寒熱虛實之不同。然要不離乎脾胃。其證亦有五。乃風寒暑溼食也。治法之要。宜分初中末而治之。初則截之。謂邪氣初中。正氣未傷。略與疎解。卽驅之使去。不可養以患也。中則和之。謂邪氣漸入。正氣漸傷。或於補中加截藥。或於截中加補藥。務適其中。以平爲期。末用補法。謂邪入不去。正氣已衰。當補其脾胃爲主。使正氣復強。則邪不攻自退。

一、風瘧。因感風得之。惡風自汗。煩渴頭痛。風陽也。故先熱後寒。初時宜發散。桂枝白朮湯。不退。小柴胡湯加常山檳榔烏梅截之。久而不退。補中益氣湯多服自愈。

一、寒瘧。因感寒得之。無汗惡寒。攣急面慘。寒陰也。故先寒後熱。宜發散寒邪。養胃湯加桂心。不止。平胃散加檳榔草果截之。久不止。六君子湯加薑桂。

一、暑瘧。因傷暑得之。陰氣獨微。陽氣獨發。但熱不寒。煩渴少睡。嘔惡時見。肌肉消爍。宜解暑毒。柴胡白虎湯。不止。去石膏。加貝母常山檳榔截之。久不止。補中益

氣湯。

一、溼瘧。因冒襲雨溼。汗出澡浴。坐臥溼地得之。身體腫痛。肢節乏力。嘔逆脹滿。胃
苓湯不退。平胃散加茯苓檳榔常山截之。久不止。用參苓白朮散。
一、食瘧。一名痰瘧。由飲食不節。饑飽有傷。然也。凡食傷生冷魚肉油膩之物。以致
中脘停痰。皆爲食瘧。其候已不欲食。食則中滿嘔逆腹痛。宜去其食。四獸飲不
止。以二陳湯送紅丸子。久不止。六君子湯加青皮薑桂。有瘧痢並作者。初用小
柴胡湯加當歸白芍檳榔。以解表導滯。不已。六君子湯加桂枝。
瘧後腫。此病極多。胃苓丸五皮湯下。不消。六君子湯加薑桂砂仁。四肢冷者加附
子。瘧後食少黃瘦。不長肌肉者。將欲成疳。俱以平瘧養脾丸調之。頻服自愈。
有夜瘧。此邪在血分。宜麻黃桂枝湯加地黃紅花。不止。以四物湯合小柴胡湯。加
升麻提出陽分。用四君子湯加常山烏梅檳榔截之。

入方

桂枝白朮湯 治感風而發熱瘧。

嫩桂枝 一錢

杭青皮 一錢

真廣皮 一錢

正川芎 五分

香白芷 五分

白雲苓 一錢

法半夏 五分

漂白朮 六分

家蘇子 七分

芽桔梗 五分

尖檳榔 五分

生薑 三片

大棗 三枚

水煎。於未發前二時服。

小柴胡湯 方見卷二傷寒門。

補中益氣湯 方見卷一保產門。

養胃湯 治感寒發瘧。

草菓仁 二錢

薑製

藿香葉 五分

真廣皮 一錢

薑汁炒

上桂心 一錢

炙甘草 五分

生薑 三片

烏梅 一粒

水煎熱服。

平胃散 治寒瘧不止。以此截之。

漂蒼朮 二錢

錢

紫川樸 五分

錢

真廣皮 五分

錢

炙甘草 一錢

尖檳榔 一錢

草菓仁 熟一錢

薑汁炒極

生薑 三片

大棗 三枚

水煎。清早空心服。

六君子湯 方見卷二類搐門。

柴胡白虎湯 治傷暑後瘧。但熱不寒。

官揀參 一錢 北柴胡 二分

熟石膏 五分 淨知母 一錢

生薑 三片 大棗 三枚

水煎。未發前服。

胃苓湯 方見卷二傷溼門。

參苓白朮散 方見卷三疳證門。

四獸飲 治食瘧和胃消痰。

官揀參 二錢 法半夏 五分

漂白朮 二錢 老生薑 一錢

炙甘草 五分

淨水煎。半饑服。

片黃芩 一錢 法半夏 一錢

炙甘草 一錢 晚粳米 一握

白茯苓 二錢 真廣皮 一錢

大棗 一枚 肥烏梅 三枚

二陳湯 方見卷三泄瀉門。

紅丸子 治食瘕食積氣滯腹脹。

京三稜 三錢

蓬莪朮 三錢

杭青皮 三錢

真廣皮 三錢

真胡椒 一錢

白乾薑 三錢

共爲細末。早米粉煮糊爲丸。菴豆大。黃丹爲衣。每服一二十丸。二陳湯煎送。

五皮湯 方見卷二傷溼門。

平瘕養脾丸 不問遠年近日。此藥不發不截。誠治瘕之王道。又擅去瘕之良能

也。

官揀參 焙乾 切片

漂白朮 土炒

白茯苓 乳蒸

真廣皮 酒炒

杭青皮 醋炒

法半夏 焙乾

漂蒼朮 炒

紫川樸 薑製

北柴胡 酒炒

嫩黃耆 蜜炙

結猪苓 炒

宣澤瀉 炒

嫩桂枝 焙

小常山 炒

大鱉甲 醋炙

正川芎 酒炒

粉甘草 炙

草果仁 薑製各等分

共爲細末。酒煮麵糊爲丸。米粒大。每服一二錢。米飲下。有痞塊者。加三稜莪朮。

久瘧體虛者。非此不可。

麻黃桂枝湯 治夜瘧血分有邪。宜用此發散其血中風寒。

淨麻黃二錢

嫩桂枝二錢

片黃芩一錢

光桃仁十五粒

炙甘草一錢

大生地一錢

鮮紅花五分

葱白一莖

水煎。熱服。

四物湯合小柴胡湯

治夜瘧。以此提出陽分。

大熟地二錢

杭白芍一錢

正川芎一錢

大當歸五分

官揀參五分

北柴胡一錢

片黃芩一錢

法半夏二錢

炙甘草五分

綠升麻二錢

生薑三片

大棗三枚

水煎。熱服。

加味四君子湯

治夜瘧已出陽分。以此截之。

官揀參一錢

漂白朮二錢

白雲苓一錢五分

炙甘草一錢

小常山一錢

尖檳榔一枚

肥烏梅三枚

生薑三片

大棗三枚

水煎。發日。微溫服。

瘧疾簡便方

小兒凡發瘧疾。多有邪氣。須常燒檀香以僻其邪。更當熏其衣襟等物。氣穢去而邪易除矣。

凡瘧藥必露者。瘧乃暑邪之因。露乃肅殺之氣。性理大全謂霧屬陽。露屬陰。露生

物。霧殺物。則知暑邪逢露即解矣。凡瘧疾口渴。切不可飲冷水冷茶。併生冷之物。犯之其病益甚。惟以薑湯乘熱飲之。此良法也。

凡瘧疾熱未全退。切不可令其飲食。必候其熱已退盡。方可食之。不然。必成癖積。凡服止截之藥。必須餓過發時。熱發過可喫粥食。早食則瘧必再作。下次截藥無靈矣。

清邪止瘧方。李士材製 升麻柴胡各二錢。提陽氣上升。使達於陰而寒可止。黃芩知母各一錢五分。使陰氣下降。使達於陽而熱自己。生薑三錢。却邪歸正。甘草五分。

和其陰陽。二三劑自止。四神酒治久瘧不止。一服却住。永不再發。用常山一錢五分。檳榔一錢。丁香五分。烏梅一箇。好酒大半碗。略煎露一宿。發日空心冷服。無痰不成瘧。所以瘧家多蓄痰涎。溢飲常山能破涎。逐飲。故有截瘧之功。然須於發散表邪之後。以及提出陽分之時。則發無不中矣。凡服常山。切勿熱服。露一宿爲妙。熱服之則吐。生用亦吐。與甘草同服亦吐。凡大虛之體。切宜斟酌。未可遽投。小兒邪瘧。其發無時。日期不定。乍早乍晚。或有或無者。名爲邪瘧。以麝香五厘。同好京墨同研書去邪辟魔四字於額上效。小兒熱瘧不寒者。用川山甲一兩。大紅棗十個。同燒存性爲末。每服一錢。發日五更。白湯調服。

小兒久瘧不止。用大鱉甲。小者不用。以醋炙枯研末。每一錢。或錢五。隔夜一服。清晨一服。將發時一服。無不斷者。瘧來寒多熱少。飲食不思。用良薑一兩。麻油炒。炮薑一兩。共爲末。每二錢。用猪膽汁調成膏。臨發時熱酒調服。或用猪膽汁和丸。如芡實大。每服七丸。酒送亦佳。膽屬甲木。取之引入少陽也。

消渴證治

經曰。心移熱於肺。傳爲膈消。又曰。二陽結謂之消。夫消渴者。枯燥之病也。凡渴而多飲爲上消。肺熱也。多食善餓爲中消。胃熱也。渴而小便數。膏濁不禁爲下消。腎熱也。雖爲火盛水衰之證。然由虛熱者多。實熱者少。若作有餘治之。誤之甚矣。始而心肺消渴。脾胃消中。或腎虛消濁。傳染日久。則腸胃合消。五臟乾燥。精神倦怠。以致消瘦四肢。將爲不起之候。初起治之得法。必不至是。

一、消渴由心火動而消上。上消乎心。移熱於肺。渴飲茶水。飲之又渴。名曰上消。小便最多。由其水不能停。所以飲水無厭。凡飲一澠一者可治。飲一澠二者不可治。宜蓮花飲爲主。次以生津四物湯滋其陰。用必有濟。

一、消肌。脾火動而消中。中消於脾。移熱於胃。喜多食。食無足時。小便色黃。名曰中消。宜人參白虎清胃保中。

一、消濁。乃上消之傳變。肺胃之熱久不清勻。致動而消腎。移熱於膀胱。小便渾濁。色如膏脂。名曰下消。宜加味地黃湯。滋其真陰。久服可愈。

已上渴證。初起者宜用前法。倘日久不愈。津液枯焦。其渴愈甚。若仍用黃連花粉苦寒之類。未有不致危殆者。惟七味白朮散對證之藥。放膽用之。非此不愈。

入方

蓮花飲 治上消口渴。飲水不休。

白蓮鬚 一錢

粉乾葛 一錢

白雲苓 一錢

大生地 一錢

真雅連 五分

天花粉 五分

官揀參 五分

北五味 五分

淨知母 五分

炙甘草 五分

淡竹葉 五分

燈心十莖

水煎熱服。

生津四物湯 治上消已服蓮花飲後用此。

白歸身 一錢

大生地 一錢

杭白芍 一錢

淨知母 一錢

大麥冬 一錢

揀官參 一錢

正川芎 五分

正雅連 五分

天花粉 五分

川黃柏 五分

炙甘草 五分

肥烏梅 一粒

燈心十莖

水煎熱服。

人參白虎湯 治中消消穀易餓。食無厭足。

官揀參一錢

熟石膏二錢

淨知母五分

炙甘草一錢

加晚粳米一兩爲引。水煎。以米熟爲度。澄清熱服。

加味地黃湯 治下消小便渾濁。色如膏脂。

大懷地一錢

正懷山五分

山茱肉二錢

宣澤瀉六分

粉丹皮一錢

淨知母五分

白雲苓二錢

北五味粒十四

建蓮肉七分

芡實米一錢

大麥冬一錢

淨水濃煎。清晨空服。

七味白朮散 治小兒久病作渴。口乾不止。惟此最神。放膽用。方見卷三泄瀉門。

消渴簡便方

蠶繭湯。通治三消之證。用蠶繭殼。或取絲綿結塊者。取來煎湯。時時當茶飲之。飲至二七無不愈者。蓋此物與馬同氣。皆屬午火。在人爲少陰君火。善伏膀胱之火。引陰液上潮於口。而渴自止。昧者以爲膀胱之火作祟。不知膀胱之火。不能收攝。已隨小便而去。惟其不能上潮。所以津液不生。而口作渴。不觀仙家運用三昧真。

火。以心爲君火。命門相火。膀胱民火。起火必自膀胱始。而後相火君火三火齊發。煅煉陰魔。真火熏蒸。甘露自降。何渴之有。消渴日夜飲水無度。用猪肚一個。洗極淨。入淡豆豉五錢在內。以線縫之。煮極爛。取汁飲之。肚亦可食。又方。煮猪血清湯。不入油鹽。多飲極效。此物善能滋陰降火。專走血分。脾氣虛者。間日飲之。恐防作泄故也。

諸血證治

經曰。營者水穀之精也。調和於五臟。灑陳於六腑。乃能入於脈也。生化於脾。總統於心。受藏於肝。宣布於肺。施泄於腎。濡潤宣通。靡不由此。凡吐血者。榮衛之氣逆也。蓋心者血之主。肺者氣之主。氣主噓之。血主濡之。榮養百骸。澆灌筋脈。升降有常。自然順適。或外干六淫。內傷飲食。氣留不行。血壅不濡。是以熱極湧泄。不無妄動之患。且氣有餘便是火。火乘於血。得熱妄行。上奔而爲吐血也。故小兒吐血。因傷食者最多。蓋陽明多氣多血。若鬱熱內逼。必致營血妄行。所以小兒吐血。屬胃者十之七八。更有尙在襁褓而吐血者。多由重帷煖閣。火氣熏過。或過啖辛辣。

流於乳房。兒飲之後。積溫成熱。熱極上崩。或吐血。或衄血。或尿血。或便血者。有之矣。若久嗽血者。是又肺虛所致。宜保肺滋陰。肺朝百脈之氣。肝統諸經之血。脾胃有傷。榮衛虛損。故血失常道而妄行。倘氣虛神倦。脣無紅色者。切勿寒涼。宜四君子湯。先救其脾。脾實則血止矣。

血虛者。精神如舊。脣舌如常。以四物湯加參朮。補氣卽所以生血也。吐血者。胃中積熱。火遇其血而妄行。故從口吐出。宜清其胃火。使血歸經。蓋血屬陰。陰主降。凡血證從下出者順。從上出者皆逆也。清胃散。鼻血者。脾熱傳肺。虛火上炎。血行清道。故血從鼻出。宜加味四君子湯。更有咳嗽而吐血者。此心腎水火不升降。火炎無制。肺胃枯燥。宜滋陰降火湯。切不可作童子癆治。有大便下血者。糞前見血者爲近血。蓋血自大腸來也。黃連解毒湯。糞後見血者爲遠血。從胃腕小腸來也。清胃散止之。久不止者。補中益氣湯加胡連。

入方

四君子湯 方見卷三瘧疾門。

四物湯 方見卷三瘧疾門加人參白朮各一錢。

清胃湯 治吐血并糞後血。

黑梔仁

懷生地

粉丹皮

大當歸 已上四味 各一錢

雅川連五分

淨水濃煎滾熱服。

加味四君湯 治脾傳肺血從鼻出。

官揀參一錢

漂白朮一錢

白雲苓一錢

粉甘草 八分

芽桔梗一錢

大麥冬二錢

黑梔仁一錢

片黃芩 五分

燈心十根

竹葉七片

水煎熱服。

滋陰降火湯 治小兒咳嗽見血升水降火。

大生地一錢

當歸身一錢

杭白芍一錢

淨知母一錢

建蓮肉一錢

潤玄參一錢

大杭冬一錢

真雅連五分

天花粉五分

炙甘草五分

淨水濃煎。清晨空心服。

黃連解毒湯 治吐血并便前下血。

正雅連五分

川黃檗二錢

小條芩二錢

黑梔仁一錢

燈心十莖

水煎滾熱服。

補中益氣湯 方見卷一保產門。

諸血簡便方

凡吐血鼻血。低頭掬損肺臟而吐血。以及上下一切血證。用百草霜掃下。研爲細末。以糯米煎湯。大人每服三錢。小兒每服一錢。米飲調服。三服立愈。百草霜須鄉間燒茅草鍋底取之。燒柴炭者不用。凡鼻血如注。頃刻流至數升。無藥可解。急將患者頭髮解開。將髮稍浸新水盆內。良久血卽止。止後仍服涼血清火之藥。至浸髮亦不可太久。只問病者心內覺有涼氣卽止。久則涼冷入心。恐生別證。至神至奇。此可治稍大之兒。乳子無髮可浸。又治鼻血不止。用大蒜一枚。去皮研如

泥作餅子如錢大。左鼻出。貼左足心。右鼻出。貼右足心。兩鼻俱出。貼兩足心。立時卽止。卽以溫水洗去之。又方。以亂髮燒灰吹鼻。又以線扎中手指根。右鼻出。扎右。左鼻扎左。又以梔子燒灰。研末吹鼻內。又方。治鼻血以韭菜搗汁一杯。童子小便一杯和勻。溫煖服之。血散火降。立時卽止。蓋韭菜散血。童便降火故也。大便瀉血。用亂油髮雞冠花側柏葉俱燒灰。三味等分。研極細末。每服一錢。水酒調服。

又方。用霜後乾絲瓜燒灰存性。研爲細末。每服一錢。酒調。空心服。下血危篤不可救者。用乾絲瓜一條。燒灰存性。研末聽用。槐花燒灰存性。研末聽用。每服以絲瓜末一錢。槐花末五分。共研勻。米飲調。空心服。小兒小便血淋。用雞白尿白如粉者。炒極焦研末。每五分。酒調。空心服。小兒尿血。烏梅燒灰存性。研爲細末。每次一錢。米飲調下。

幼幼集成卷三 諸血簡便方

