幼幼集成

四

中國醫學大成第十集

兒科類甲
兒科叢刊之一

幼幼集成

四

上海大東書局印行

幼幼集成

清　羅浮　陳復正飛霞輯訂
鄞縣　曹赤電炳章圈校

卷四

腫滿證治

經曰。膚脹者。寒氣客於皮膚之間。腹大。身盡腫。皮厚。按之突而不起。脈色不變。此其候也。又曰。諸溼腫滿。皆屬於脾。又曰。水病下爲胕腫。腹大。上爲喘呼。不得臥者。標本俱病。

夫腫滿之證。悉由脾胃之虛也。脾土喜燥而惡溼。因中氣素弱。脾虛無火。故水溼得以乘之。而脾愈不運。則乳食凝而不化。停積於中。而腫滿作焉。治腫者。當以脾胃爲本。而以浮腫爲標。斯庶幾矣。若以消伐尅削爲能事。未有不致危殆者也。治腫當分上下。經曰。面腫者風。足腫者溼。凡腫自上而起者。皆因於風。其治在肺。

宜發散之。參蘇飲合五皮湯。腫自下而起者。因於腎虛水泛。或因於脾氣受溼。宜滲利之。故仲景云。治溼不利小便。非其治也。宜五苓散加防己檳榔。

一、身盡腫者。或胎稟不足。卒冒風寒。或因瘧痢脾虛。皆能作腫。輕者胃苓丸。重者加味胃苓丸。當與本條參考。

一、小兒之腫。在表者。頭痛身熱。此風寒在表。宜微汗之。五苓散少加麻黃葛根蘇葉杏仁以發之。若身無熱。五苓散加肉桂。

一、膀胱氣化。小便利而腫消矣。陽水腫。身熱。大便秘。小便赤澀。煩燥口渴。以五皮湯作煎。送沉香化滯丸微下之。陰水腫。身不熱。口不渴。身冷怯寒。二便自調。平胃散加白茯苓草果木香藿香。

凡腫證先起於腹。而散於四肢者可治。先起四肢。而後歸於腹者不可治。若小兒元氣本虛。復遇大病之後。而渾身浮腫。四肢冷。不渴。小便清長。大便滑泄。不思飲食。此陰寒之極。脾胃將絕。治腫之方。俱不可用。惟以四君子湯加青化桂炮薑砂仁白蔻。以救其脾胃。斯可矣。昧者但見其腫。不知元氣之竭絕。而猶消導利水。復以舟車禹功。暨大戟芫花甘遂劫奪之者。此殺人之事。慎之戒之。

入方

參蘇飲　方見卷三咳嗽門。

五苓散　方見卷二傷暑門。

五皮湯　方見卷二傷溼門。

胃苓丸　方見卷二傷溼門。

加味胃苓丸　卽胃苓丸本方加後藥。頭面腫初起。略加麻黃佐之。喘。加桑白皮杏仁。小便黃赤。加木通。身腫。加五加皮。腹脹。加砂仁白蔻丁香枳殼。脚冷不溫。加附子上桂防己。

平胃散　方見卷三瘧疾門。

加味四君子湯　治脾敗胃傷。陰寒作腫。多服自消。

官揀參一錢　漂白朮一錢　白雲苓五分　上青桂入分

黑炮薑一錢　西砂仁一錢　白荳蔻一錢　公丁香三分

炙甘草五分　大棗三枚

水煎。半飢溫服。以愈爲度。

水腫簡便方

凡小兒患腫。切須忌鹽。鹽助水邪。服之愈甚。必待腫消之後。以鹽煅過。少少用之。治水腫從脚起。入腹則難治。用紅飯豆五升。水煮極熟。取湯四五升。溫浸兩膝之下。冷則重煖。若已入腹。以紅豆煮湯日日服之亦消。蓋紅豆之功。專於行溼利小便故也。

治脚腫。掘杉木根切斷。而內色紅者爲油杉。方可熏。若切開白色者不堪用。以紅根切碎。煎濃湯。將腫脚先熏後洗一二次。自消。

又方以紅糟一大碗。加入生薑生葱三味同煎湯。先熏後洗。

又治頭面手足俱腫。用苦葶藶一兩。隔紙炒熟。研細末。以大紅棗蒸過。去核取肉。和前末杵勻爲丸。如小豆大。每服七粒。白湯下。日三服。五七日。則小便多。腫自消也。忌鹹酸生冷之物。

傷寒傷溼腫。以羌活切片。萊菔子二味等分。同炒香。取起。揀去萊菔不用。只以羌

活爲末。每服一錢。初日一服。二日二服。三日三服效。腫證氣喘。男女大小。腫因積得。既取積而腫再作。小便不利。若再用利藥。性寒而小便愈不通矣。醫者至此束手。蓋中下二焦氣不升降。爲陰寒否隔水。遂凝而不通。用熟附子三錢。生薑二錢。沉香三分。同煎濃湯冷服。大人附子一兩。生薑六錢。沉香磨濃汁。以附子生薑煎湯對服。不拘服數。以愈爲度。身面浮腫。坐臥不得。取向東桑枝燒灰淋汁。煮紅豆數升。每饑卽食之。不得別飲湯水。

水腫本於脾虛不能制水。水積妄行而爲腫。當以參朮補脾爲主。使脾氣實則能健運而水自行。切不可下。

脹滿證治

經曰。足太陰虛則鼓脹。又曰。胃中寒則脹滿。又曰。濁氣在上。則生膜脹。夫脹滿者。腹脹氣滿也。因於脾肺氣虛。不能健運。所以作脹也。有虛脹實脹熱脹寒脹。大抵虛脹冷脹。十之七八。實脹熱脹。十之二三。蓋實熱之證。人所易見。或因傷食或

因傷寒。入裏所以易知而易治。虛冷之證。由中氣虛衰。脾氣不化而脹。所以難見而難醫。若以虛冷之脹。而誤以爲實熱之脹治之。其禍不可勝言矣。虛脹者。或因吐瀉之後。或因服藥攻下太過。致成腹脹者。宜溫中調氣。厚樸溫中湯。若虛而兼寒者。加附桂。實脹者。腹中原有食積。或飲食過飽。固結於中。外證則胃口胸前高脹。身熱口渴。倦臥不語。腹痛微喘。目閉不開。儼然虛極之象。小兒此證最多而難識。昧者不爲詳審。見其四肢不舉。口閉不開。誤以爲慢驚而用寧神導痰之藥。千中千死。無一活者。不知大實有羸狀。卽此是也。急宜下之。集成沆瀣丹。集成三仙丹同服。熱脹者。或傷寒熱邪入裏。大便閉結。小便短赤。渾身壯熱。面赤燥煩。

集成沆瀣丹

寒脹者。由中氣素寒。冷滯鬱結。無身熱口渴。面脣青。手足厥冷。氣喘腹脹。先以塌氣丸消之。後以異功散調其脾胃。凡遍身瘡疥。因淋洗塗搽。逼毒歸內而腹脹者。輕則荊防敗毒散升散之。重則集成沆瀣丹微利之。瘡出脹消者吉。瘡不出者凶。

經謂臟寒生脹滿。蓋脾爲陰中之至陰。因脾溼有餘。無陽不能施化。如土之久於

雨水則爲泥矣。豈能生畜萬物。必待和風暖日。溼去陽生。自然生長也。凡此宜以辛熱之藥運用之可也。

謂下之則脹已。此以淫熱飲食有餘。脾胃素實。形體氣質壯實者言之也。若脾虛內寒。而氣不能運精微以成脹滿者。只宜以甘溫補脾爲主。少佐辛熱以行壅滯之氣。庶使脾土健旺。脹滿運行。斯可愈矣。此經之所謂塞因塞用。從治之法耳。醫者不察乎此。惟執下之。脹已急於獲效。病者喜行利藥以求通快。不知暫快一時。則脾氣愈傷。脹滿愈甚。去死不遠矣。

諸家治脹治腫。但知行氣利水。尅削並行。凡以猛劑下之。此速死之道。不知脾氣虛極而腫而脹。愈下愈虛。惟圖目前之快。而陰傷真元。禍不旋踵。後賢幸加意焉。

入方

厚樸溫中湯　治胃寒心腹脹。

紫厚樸一錢五分　真廣皮一錢　黑薑炭一錢　白雲苓一錢
草蔻仁五分　南木香五分　炙甘草五分

虛兼寒者。加熟附子五分。青化桂五分。生薑三片。

塡氣丸　治寒氣鬱結。肚腹虛脹。

胡椒仁一兩　全蠍尾五錢（揀去鉤子洗淨炒乾）

右以胡椒略去皮取淨一兩。炒過和蠍尾研末。麵糊丸極小。每服一二錢。陳皮湯送下。

集成沉鹽丹　方見卷二胎疾門。

異功散　方見卷二傷食門。

集成三仙丹　方見卷二類搐門。

荊防敗毒散　治瘡疥毒氣內陷。小腹作腫。

荊芥穗　北防風　淨連翹　陳枳殼

綠升麻　南薄荷　川羌活　川獨活

粉乾葛　川木通　金銀花　片黃芩

正川芎　黑梔仁　炙甘草（已上每味各一錢）

上身腫。加葱三莖。下身腫。加燈心十莖。水煎服。

腹脹簡便方

治氣脹水脹。用雄雞糞乾者一升。炒焦黃色。出火毒。研細末。以百沸湯三升淋汁。每服一盞。調木香檳榔末各五分。此中滿蠱毒脹。有一無二之方也。治食脹氣脹。用蘿蔔子一兩。研細末。水調濾汁。用砂仁一兩。以蘿蔔子浸汁一宿。炒乾又浸又炒。共七次。爲末。每服一錢。米飲調下。

黃癉證治

經曰。身痛而色微黃。齒垢黃。耳目上黃。黃癉也。又溺黃赤。安臥者。曰黃癉。已食如饑者。胃癉。夫黃癉之證。古人多言爲溼熱。及有五癉之分。皆未足以盡之。予謂黃之大要。亦惟有二。曰陽黃。曰陰黃。而寒熱虛實。總括二者之中。無餘義矣。一、陽黃證。因溼多成熱。熱則生黃。此則所謂溼熱證也。其證必身熱煩渴。或躁擾不寧。或消穀善饑。或小便熱痛。或大便祕結。其脈實而有力。此證不拘外感風溼。內傷食飲。皆能治之。但察兒之元氣尚強。脾胃無損。而熱溼果盛者。直宜清

火邪。利小便。茵陳五苓散最穩。胃苓湯加茵陳亦佳。若大便秘結熱甚者。集成沆瀣丹。

一、陰黃證。全非溼熱。而總由氣血之敗。蓋氣不生血。所以血敗。血不華色。所以色敗。凡病黃而絕無陽證陽脈者。便是陰黃。或因大病之後。或脾胃久虧。故脾土之色自現於外。其證喜靜惡動。喜暗畏明。神思困倦。言語輕微。畏寒少食。四肢無力。或大便不實。下水如膏。此皆陽虛之後。與溼熱發黃者。反如冰炭。使非速救元氣。大補脾胃。終無復元之理。且此證最多。而昧者不察。遂云黃癉同時溼熱。而用茵陳梔子。清火利水。則無有不隨藥而斃者。卽四君子五君煎溫胃飲。是其宜也。

凡小兒脾胃素弱。常有積滯。面色多帶黃白。不可消積。惟以集成肥兒丸多服。使脾胃健。食自消。澣溉膿脯流行。榮衛自然五色修明。何黃之有。　小兒黃病。昧者一概呼爲溼熱。無非除溼利水。清熱退黃。除此之外。無別法矣。豈知溼熱發黃者少。脾虛發黃者多。蓋脾土強者。足以捍禦溼熱。必不生黃。惟其脾虛不運。所以溼熱乘之。治此者。無非暫去溼熱。茵陳五苓散亦佳。黃稍退。卽速健脾。不得屢用消

耗。而謂有是病用是藥也。若面目俱黃而帶虛浮。脣白舌淡。口不渴。身不熱。夜無煩熱。小便不澀。不可認爲溼熱而分利之。速救脾胃。四君子湯六君子湯。是其宜也。凡服分利之藥。黃久不退。以致口淡心荒。四肢輭弱。憎寒發熱。小便帶濁。皆爲虛甚。宜四君子煎。併入味地黃丸。不可再行分利。以致脾敗腎絕而死矣。

入方

茵陳五苓散　方見卷二傷溼門。

胃苓湯加茵陳　方見卷二傷溼門此加茵陳一錢。

集成沉香化滯丹　方見卷一胎疾門。

四君子湯　方見卷三瘧疾門。

五君煎　治脾胃虛寒。嘔吐泄瀉而兼溼者。

官桂參一錢　漂白朮二錢　白雲苓二錢　炮薑炭一錢

炙甘草一錢

水一鍾半煎服。

溫胃飲 治中寒嘔吐。吞酸泄瀉。不思飲食。

官揀參一錢 漂白朮二錢 白扁豆一錢 廣陳皮五分
炮薑炭一錢 大當歸一錢 炙甘草六分

水一鍾。煎七分服。

集成肥兒丸 治小兒脾胃虛弱。飲食不消。肌膚瘦削。多服能令兒肥。此丸久經效驗。比諸家肥兒丸功獨甚。

建蓮肉二兩去心皮炒 西砂仁六錢酒炒 漂白朮一兩土炒 官揀參一錢焙乾切片
京查肉四錢 杭白芍四錢酒炒 廣陳皮四錢去筋白用酒炒 法半夏四錢
白雲苓一兩乳汁蒸晒 雅連三錢薑製 苡仁米六錢炒 六神麴六錢炒
炙甘草二錢

共爲細末。煉蜜爲丸。彈子大。每日早午晚各服一丸。米飲化服。

六君子湯 方見卷二類搐門。

八味地黃丸 方見卷一保產門。

黃癉簡便方

小兒急黃。以絲瓜連皮帶子。火燒存性研末。每服一錢。米湯下。連進數服愈。小兒黃如金色。因積滯凝於脾家。以糯稻草煎濃湯飲之。數次效。治小兒黃癉如金。取山間薏苡仁根。洗極淨。煎湯服之自愈。治陰熱發黃。用生薑半斤。茵陳半斤同搗爛。以布包之。時時周身擦之。其黃自退。

腹痛證治

帝曰。願聞人之五臟卒痛。何氣使然。岐伯對曰。經脈流行不止。環周不休。寒氣入經而稽遲。泣而不行。客於脈外則血少。客於脈中則氣不通。故卒然而痛。凡病心腹痛者。有上中下三焦之別。上焦者痛在膈上。此以卽胃脘痛也。中焦者在中脘。脾胃間病也。下焦痛者在臍下。肝腎病也。然有虛實之分。不可不辨。辨之之法。但察其可按者爲虛。拒按者爲實。久病者多虛。暴病者多實。得食稍減者爲虛。脹滿畏食者爲實。痛而輕緩。莫得其處者爲虛。痛劇而堅定不移者爲實。虛實既確。

而治有準則矣。夫腹痛之證。因邪正交攻。與臟氣相較而作也。有冷有熱。有蟲痛。有食積。辨證無訛。而施治必效。

挾冷痛者。面色或青或白。冷甚者。面色闇淡。脣口爪甲皆青。此脾氣虛寒之極。輕者當歸散。重則燒脾散。有吐瀉者。保童丸。

挾熱痛者。面赤壯熱。四肢煩燥。手足心熱。宜四順清涼散。加青皮枳殼。大便祕者。木香檳榔丸。大便調者。芍藥甘草湯。

食積痛者。口中氣溫。面黃脣白。目無精光。或白睛多。多眠惡食。大便酸臭。宜三稜丸。甚則消積丸下之。後用六君子湯調之。

蟲痛者。面白脣紅。六脈洪大。心腹疼痛。口中涎沫及青水出。腹內結聚成團。摸之梗起一條。小兒脾胃虛者。極多此證。宜烏梅丸。凡腹痛喜手按及熱熨者。爲虛爲寒。速宜溫補。如手不可按者爲實。速宜下之。

入方

當歸散　治腹痛有寒無熱。

大當歸一錢　南木香五分　青化桂一錢　大揀參一錢
炙甘草五分　生薑三片　大棗二枚
水煎溫服。

燒脾散　治傷生冷菓菜停積中焦。心脾冷痛。
黑炮薑一錢　紫厚樸一錢　草蔻仁五分　西砂仁一錢
六神麴一錢　老麥芽一錢　真廣皮二錢　高良薑五分
炙甘草一錢
或丸。或散。或水煎。俱可。

保童丸　因傷風冷食積。肚疼泄瀉嘔惡。
官揀參切片焙乾　漂白朮土炒　紫厚樸薑炒　正廣皮酒炒
白雲苓乳汁拌蒸　結猪苓焙　宣澤瀉炒　藿香葉焙
公丁香搗　法半夏焙　青化桂去粗皮　白乾薑炒
白蔻仁焙　杭青皮醋炒　肉豆蔻煨　南木香屑
炙甘草各等分

并焙燥爲細末。神麴糊爲丸。彈子大。每服一丸。米飲化下。

四順清凉散　治挾熱腹痛。面赤壯熱。四肢煩燥。手足心熱。

杭白芍一錢　白當歸一錢　錦莊黃二錢　炙甘草

淨水煎滾。熱服。

芍藥甘草散　此方無論寒熱虛實。一切腹痛。服之神效。

白芍藥三錢（一根重）　粉甘草一錢（一枝重）

右二味俱要整的。用紙七重包之。水溼慢火煨熟。取其杵爛。煎湯服。寒月略加肉桂數分更妙。

三稜丸　治食積胃脘痛。心腹痛。小腹痛。癖痛蟲痛。

京三稜煨　蓬莪朮煨　半夏麴焙　小枳實炒

正川連薑炒　吳茱萸焙　正廣皮酒炒　杭青皮醋炒

南木香屑　尖檳榔炒　川厚朴薑炒　川楝肉炒

小茴香酒炒

共爲末。神麴糊爲丸。量兒大小加減。米飲調服。

木香檳榔丸　方見卷三食積門。

烏梅丸　治胃冷。蟲痛攻心。嘔吐。四肢冷。

官桂參六錢　川黃蘗六錢　北細辛六錢　青化桂六錢

川熟附六錢　川黃連五錢　正花椒四錢　大當歸四錢

黑薑炭四錢　肥烏梅三十個蒸去肉搗爛

共爲細末。酒蒸烏梅肉搗膏和藥。少加煉蜜爲丸。如芡實大。每服一丸。水送。每日二三服。以十分之一。水煎服亦可。

腹痛簡便方

治一切胃痛胸痛。腹痛腰痛。疼如錐刺不可忍者。花根不拘多少。研爲細末。和少麵粉醋和成餅。則於痛處鋪艾絨。用火灸之。其疼立止矣。一切腹痛。不問虛實寒熱者效。用小麥稈燒灰。地上出火毒。將布包之。滾水淋汁。一服立止。

一切疼痛。或寒或熱。或積食。或積血。證莫能辨。藥不能施。有起死回生之妙。用生薑一觔。搗爛。略擠去汁。入鍋內炒熱。用布分作二包。先以一包熨痛處。冷則換熱

者。勿令間斷。如薑已乾。略加煎汁拌之。又炒又熨。痛止乃止。

凡小兒肚痛。摸其腹有一塊硬起者。蟲痛也。不須服藥。惟令大人以手摸揉其塊處。久久搓之。半日許。其蟲將死。皆從大便而出。其痛立止。小兒腹痛。啼哭不止。用南木香明乳香黑沒藥俱去油各五分。水煎溫服。小兒胎寒腹痛。啼哭吐乳。大便青色。身出冷汗。用薑黃一錢。南木香乳香沒藥俱去油各三錢。共爲細末。蜜丸。芡實大。每服一丸。薑湯調下。

小兒盤腸氣痛。月內之兒多有之。其症腹內如蛙聲。啼哭不止者是也。蓋寒熱不和。臟氣不行。用梔仁五錢。附子三錢。同炒極枯。取起。揀去附子不用。單取梔仁。加入白芷一錢爲末。每服五分。小茴香湯下。小兒腹痛。啼哭不止。用乳香一錢。去油燈花七枚。同爲末。每服二分。乳汁調服。小兒腹痛一痛即死者。名爲蟲痛似癇。用乾漆燒灰。同蕪荑二味。等分爲末。每服五分。米飲調下。證重者。每服一錢。

小兒蟲痛。口流涎沫。使君子取肉。微炒爲末。五更時。米飲調下。小兒盤腸腹痛。濃煎葱湯。澆洗兒腹。仍以葱共爛炒熱作餅。貼臍上。良久屎出痛止。

癖積症治

經曰新積痛可移者易已積不痛難已也又曰胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動應衣脈宗氣也結而橫有積矣凡飲食之積其漸積皆不過以飲食偶傷必在腸胃之內故可行可逐治無難也惟飲食無節以漸留滯者多成癖積於左脇膈膜之間此陽明宗氣所出之道也若飢飽無論飲食疊進以致陽明胃氣一有所逆則陰寒之氣得以乘之而脾不及化故餘滯未消併腸外汁沫搏聚不散漸成積疾矣然其初起甚微人多不覺及其既久則根深蒂固而藥餌難及今西北小兒多有此積而尤於食麵之鄉爲最正以麵性多滯而留於皮裏膜外所以不易治也惟當以漸消磨求法治之幸毋孟浪下速妄行攻擊徒致胃氣受傷而積仍未去以速其危也癖者血膜化水則癖脇傍時時作痛時發潮熱或寒熱往來似瘧故瘧家多有此症凡瘧疾發過之後必令其熱退極盡方可飲食若熱未盡而飲食之則中脘多蓄黃水日久而成癖積小兒臟腑和平脾胃壯實則榮衛宣暢津液流通縱使多飲水漿不能爲病惟脾胃不勝乳哺失調三焦不運水飲停滯令氣搏之結聚而成癖也行素弱者消癖丸氣壯實者赭石挨癖丸大約有癖之兒虛者居多攻下之藥非可常用即不得已而用之待日略減

用消癖丸緩緩消之。至爲良法。

入方

消癖丸　治癖在脇下。面黃肌瘦。午後發熱似瘧。

官揀參（切片焙乾）　漂白朮（土炒）　正廣皮（酒炒）　白雲苓（乳蒸）
杭青皮（醋炒）　川厚樸（薑汁製）　小枳實（酒炒）　法半夏（焙炒）
西砂仁（酒炒）　六神麴（炒）　陳麥芽（炒）　己上十一味俱各二錢
九肋鼈（炙）三錢　京三稜（煨）一錢　蓬莪朮（煨）一錢　南木香二錢
青化桂二錢　炮黑薑（用）一錢　正雅連（薑汁炒）二錢

共爲細末。早米粉糊爲丸。每服一二錢。量兒大小加減。米飲下。以癖消藥止。

赭石揀癖丸　治腹中癖塊。或生寒熱。或時作痛。小兒壯實。飲食素少者。方宜用之。脾胃素虛者。切不可服。惟以前消癖丸攻補兼施。久之自愈。

代赭石（火煅醋焠至酥研末水飛過）用　杭青皮（醋炒）　蓬莪朮（煨炒）
南木香（銼屑）　青化桂（各三錢）　巴豆霜（去油極淨取霜一錢）　川大黃二錢

右爲細末。醋煮麵糊爲丸。蘿蔔子大。每服五丸。淡薑湯送下。

癖積簡便方

治癖積心腹內結如拳。及臍腹痛不可忍。用莊黃一兩。酒蒸炮薑五錢。熟附子三錢。九劑鱉甲八錢。用好醋將鱉甲煮一時久。取起酥炙黃色爲度。共爲細末。用三年老米醋一升。熬至半升。和前末爲丸。菜豆大。每服十丸。空心米湯下。取下積如魚腦敗血爛肉青泥即愈。後用補脾調理。

按此方藥廉功大。比挨癖丸力勝十倍。允稱神妙。

小兒好食茶葉成癖。用鮮榧子一劑。空心晌午黃昏。每服十四粒。嚼完即愈。榧子京菓舖有賣。

小兒食積結疳塊。用大紅棗一劑。皮硝一兩。同煮。以水乾爲度。晒乾。每日食此棗。徐徐服之自消。

小兒積久而成。於腹內有形。搖頭掉尾。大者如杯。小者如錢。上侵入喉。下蝕入肛。或附腫脊。或隱腸腹。用生硫黃研極細末。每日老酒調服一錢。空心下。久服自化。硫黃須色如初出鵝者方可用。帶青帶赤帶黑色者。皆不堪用。此物最平穩。任多服無礙。

蟲痛證治

經曰。腸中有蟲痕蛟蛕。皆不可取以小鍼。又曰。飲食者。皆入於胃。胃中有熱則蟲動。蟲動則胃緩。胃緩則涎出。夫蟲痛者。蚘蟲也。蓋由小兒脾胃虛弱。多食甘肥生冷。留而爲積。積化爲蟲。動則腹痛。發則腫聚一塊。痛有來去。乍作乍止。嘔惡吐涎。口出清水。久而不治。其蟲長至一尺。則貫胃傷心殺人矣。外證面白脣紅。六脈洪大。是其候也。內有蟲必口饞。好甜。或喜食泥土茶葉火炭之類。宜攻去之。用檳榔丸。

小兒蟲痛。凡脾胃怯弱者。多有此證。其攻蟲取積之法。却又未可常用。及取蟲之後。速宜調補脾胃。或集成肥兒丸。或爲梅丸。或六君子湯多服之。以杜蟲之復生。

入方

檳榔丸　治小兒一切蟲積。能殺諸蟲。

小檳榔一兩　南木香五錢　鶴虱子五錢　光貫仲五錢

廣錫灰五錢　陳漆渣服灰　正輕粉二錢　白雷丸二錢
巴豆霜二錢
以漆渣灰五錢。同衆藥研爲細末。醋煮麵糊爲丸。麻子大。每服二十丸。五更時。苦楝根皮煎湯下。

集成肥兒丸　方見卷四黃癉門。

爲梅丸　方見卷四腹痛門。

六君子湯　方見卷二類搐門。

下蟲簡便方

凡小兒甘肥過度。或糖食甜物太多。乃致溼熱久停而成積。積久生蟲。時發腹痛。以手摸之。腹內有塊。或一條梗起。外證面白脣紅。六脈浮洪。其痛時作時止。痛止即能飲食者。蟲痛無疑。又有腹痛一痛即死者。亦是蟲證。欲去此蟲。無如苦楝根皮。誠天下打蟲第一神方。其法於月初旬。蟲頭向上之時行之。先夜搥苦楝根須取每年結子者方是母樹其根浮於土面者。有毒不可用。專取土中者。淨洗泥土。

以刀刮其紅皮。止取白皮四五錢。兒大者六七錢。切碎聽用。次早以油煎鷄蛋。令兒嗅之。以引其蟲頭向上而求食。另於別室。以水一盞濃煎苦楝皮湯一小杯。不可使兒聞其藥氣。一聞其氣。蟲卽潛伏矣。俟藥熟以雞蛋與兒食。卽服藥。半日不可飲食。俟蟲下後方飲食之。服藥後兒似困頓。萬萬放心。蟲下後精神如舊。仍當急爲健脾。庶蟲不復生。永無患矣。

汗證證治

經曰。陽之汗。以天地之雨名之。又曰。陽加於陰謂之汗。又曰。心爲汗。夫心之所藏在內者爲血。在外者爲汗。蓋汗乃心之液。而自汗之證。未有不由心腎兩虛而得之者。然陰虛陽必湊之。故發熱而自汗。陽虛陰必湊之。故發厥而自汗。是皆陰陽偏勝所致也。小兒臟腑嬌嫩。膚腠未密。或重衣厚被。致內臟生熱。熱搏於心。故心液不能自藏而額汗出也。額爲心之位。宜取斂心氣團參湯。

大病後氣血兩虛。津液自汗。或潮熱。或寒熱。發過之後。身涼自汗。日久令人黃瘦。失治則變蒸疳。宜黃耆固真湯。

睡中汗出。醒來則止。此心虛盜汗。宜斂心氣。養心血。用團參湯。

睡中遍身有汗。覺來久不乾者。此食積盜汗。脾冷所致。益黃散。

脾虛泄瀉。自汗後而遍身冷。有時遇瀉則無汗。不瀉則有汗。此爲大虛之候。急當補脾。理中湯。待瀉止。黃耆固真湯。

凡自汗上至胸。下至臍。此胃虛也。當補胃。四君子湯加黃耆。

肺虛自汗。面白唇白。六脈無力。蓋因久嗽脾虛。故令自汗。四君子湯加麥冬五味。

傷風自汗。宜實表。桂枝湯。傷寒汗出自頭至頸而止者。欲發黃也。茵陳湯。如有實熱在內。煩躁汗出不止者。胃實也。宜集成沆瀣丹微下之。諸汗服藥不止者。用五棓子一個研細末。醋和作一小餅。貼肚臍。以帶紮之效。

入方

團參湯　收斂心氣。固心血。能止汗。

官揀參二錢　當歸身二錢　俱切焙

右二味。分作二服。用腰猪心一個。切作二片。用前藥一錢。猪心一片。水一鍾。煎

湯。空心服。

黃耆固真湯 治氣虛自汗。

嫩黃耆一錢 官揀參五分 漂白朮五分 當歸身一錢
炙甘草五分 天圓肉二枚

水煎服。

益黃散 治食積盜汗。

正廣皮五錢 杭青皮四錢 訶子肉四錢 粉甘草四錢
公丁香一錢

共爲末。大兒二錢。小者一錢。如感冒吐瀉。加薑棗同煎服。

理中湯 方見卷二乳子傷寒門。

四君子湯 方見卷三瘧疾門。

桂枝湯 方見卷二小兒傷寒門。

茵陳蒿湯 治頭汗至頸而還。將欲發黃。

茵陳蒿五錢一分 川黃柏一錢 黑梔仁一錢 燈心十莖

水煎滾熱服。

汗證簡便方

凡男婦小兒。及產母一切虛證。偶然大汗。諸藥莫能止者。蓋由玄府大開。一時難閉。所以服藥不能止。先將五棓子末。醋調作小餅子。納入臍中。以布紮之。然後以舊蒲扇燒灰。多加糯米粉和勻。以夏布袋裝之。自頭至足。遍身輕撲之。使其粉入毛竅。玄府自閉。虛汗即止。神治也。

疝氣證治

經云。邪客於足厥陰之絡。令人卒疝暴痛。又曰。病在小腹痛。不得大小便。病名曰疝。得之寒。故疝氣者。寒邪結聚而成也。內則臍腹絞痛。外則卵丸腫大。專屬肝經。與腎無涉。蓋肝主怒。小兒性急多叫哭而得之者。此氣動於內。謂之氣疝。應行氣開鬱。初宜柴苓湯升散之。次宜加減二陳湯。或木香內消丸。如因久坐溼地得之者。此冷氣入腹。謂之寒疝。宜溫中散寒。加減當歸散。茱萸內

消丸。有腫而不痛。由中溼所致。卵雖腫而無熱。腹不痛。宜行溼消腫。加減守病丸　小兒素有疝氣。或一年半年發者。發則有形。外連睾丸。內貫小腹。腫硬一條如小杵。約長五六寸。大小便不通。當歸木香湯　小兒外腎腫大不痛。連年不消者不早治。便爲終身痼疾。宜茱萸內消丸。加牽牛子半生半炒。取頭末用。更灸臍傍章門穴大效。取穴法。以本兒手掌第五指本節橫紋。對臍中心。其中指頭盡處是穴。

小兒溼地上坐。或有蚯蚓吹其卵腫大而垂者。以鹽湯浸洗之。蓋鹽能殺蚯蚓毒也。或以蒼朮煎湯加鹽少許。洗之卽效。

小兒陰囊生瘡瘡爛者。謂之脫囊。用紫蘇葉研末敷之。以荷葉包之。或用生荷葉。火烘令軟包之。雖囊丸露出。亦可治也。

小兒外腎臊臭。時復溼癢。柴胡龍膽湯。癢甚不可止者。胡椒煎湯洗之。

入方

柴苓湯　治少陽膽經有邪而病疝。

官揀參一錢　北柴胡五分　枯黃芩一錢　法半夏一錢
漂白朮二錢　白雲苓一錢　結猪苓一錢　宣澤瀉一錢
青化上肉五分　炙甘草五分　生薑一片　大棗一枚
水煎熱服。

加味二陳湯　治性急多哭。卵腫痛連小腹。謂之氣痛。
正廣皮一錢　法半夏一錢　白雲苓一錢　小茴香一錢
正川芎一錢　青化桂五分　炙甘草五分　生薑三片
水煎熱服。

木香內消丸　治證如前。
南木香屑　京三稜煨　結猪苓焙　宣澤瀉炒
川楝肉炒　正廣皮酒炒　香附米酒炒各七錢　已上杭青皮醋炒二錢
共爲細末。酒煮米糊爲丸。每服一二錢。空心鹽湯下。

加味當歸散　治受寒溼之氣。小腹絞痛。外腎紅腫。並腹痛啼哭等證。
當歸身五錢　吳茱萸三分　青化桂五分　正川芎五分

黑薑炭五錢　南木香三分屑　小茴香一錢　炙甘草五分

水煎。臨服加鹽七分。空心溫服。

茱萸內消丸　治寒溼所襲留伏作痛。癪疝偏墜。

吳茱萸醋浸一宿焙乾炒過　大茴香鹽炒　青化桂去皮

元胡索醋炒　杭青皮醋炒　桃仁炒五錢　淨棗皮蒸去核　化橘紅炒各已上一兩

白蒺藜炒　南木香屑已上各五錢

共爲細末。酒煮麵糊爲丸。龍眼核大。每服一丸。淡鹽湯送下。

加減守病丸　治卵腫不痛。此溼氣也。又名木腎。

漂蒼朮鹽炒　製南星炒　香白芷炒各一兩以上　京查肉炒

正川芎炒　廣橘核炒　法半夏炒　六神麴炒

吳茱萸炒二錢五分已上各

共爲細末。酒煮麵糊爲丸。龍眼核大。每服一丸。小茴香煎湯化下。

當歸木香湯　治小兒久疝不愈。

京橘核一錢　全當歸一錢　川芎片一錢　川木通一錢

小茴香一錢　川楝肉一錢　杭青皮一錢　結猪苓二錢
宣澤瀉一錢　南木香五分　黑梔仁五分
右用淨水濃煎。空心熱服。
龍膽湯　治小兒外腎臊臭。時復溼癢。
北柴胡二錢　宣澤瀉一錢　車前子八分　川木通一錢
懷生地一錢　當歸尾六分　龍膽草五錢
水煎。空心服。以飲食壓之。

疝氣簡便方

治小兒疝氣腫痛。用荔枝核炒焦五錢。大茴香酒炒二錢五分。共爲細末。每服一錢。溫酒調下。　又方。不論小兒及男婦一切疝氣。以及諸般氣痛。用荔枝核四十九箇炒焦。留白陳皮九錢。生硫黃四錢。共爲末。鹽水打麵糊爲丸。菜豆大。遇痛時。空心酒研送九丸。良久再進一服。不過三服全安。
小兒腎腫硬痛。橄欖核荔枝核山查核三件等分。油燒過存性研末。每服一錢。空

心。小茴香湯送下。

小兒疝氣痛。全蝎不拘多少。炒焦爲末。每三分。小茴香煎酒送下。

小兒冷疝作痛。陰囊浮腫。川楝子去核五錢。吳茱萸二錢五分。炒研爲末。酒打麵糊爲丸。小豆大。每服十丸。鹽湯化下。

小兒疝久。陰囊堅硬如石。名爲木腎。用瓜蔞連皮帶子二錢。葦撥二錢。生薑二錢。葱白二錢。酒煎熱服。被覆煖臥。取汗出效

啼哭證治

小兒初生。百日一周之內。神安意靜。不妄笑多哭者易養。如日夜啼哭不止。爲母者心誠求之。渴則飲之。饑則哺之。痛則摩之。癢則抓之。其哭止者。中其意也。如哭不止。當以意度之。蓋小兒初生性多執拘。凡有親狎之人玩弄之物。一時不見。其心不悅而哭。謂之拘哭。急與之。勿使怒傷肝氣致病也。假如久不止。請醫視之。如大哭晝夜不止者。肝熱也。瀉青丸。如日夜啼哭。身熱煩躁者。心熱也。導赤散。俱用燈心湯服。

入方

瀉青丸　此肝經之主藥。凡幼科中截風定搐之方。多用金石腦麝。無益有損。惟此方清心平肝。疎風涼血。凡小兒作熱不退。將成風搐。或已成風搐。但服此丸。其應如嚮。方雖古方。人不知用。予昔遊潭州遇師授。始能用之。凡幼科中抱龍保命至保新安金藥蘇合香丸。一概不取。惟此丸爲幼科截風定搐之第一神方也。

川羌活一兩　正川芎一兩　黑梔仁一兩　龍膽草一兩
全當歸一兩　北防風一兩　錦莊黃五錢

右藥合爲二處。以火烘燥。研爲細末。煉蜜爲丸。青黛爲衣。如大豆大。每服一二丸。茶清化下。

導赤散　治心經有熱。一切煩啼不安。皆效。

川木通一錢五分　懷生地二錢　枯黃芩一錢　生粉草五分
淡竹葉十四片　燈心十根

水煎。熱服。

夜啼證治

小兒夜啼有數證。有臟寒。有心熱。有神不安。有拘哭。此中寒熱不同。切宜詳辨。臟寒者陰盛於夜。至夜則陰極發躁。寒甚腹痛。以手按其腹。則啼止。起手又啼。外證面青手冷。口不吮乳。夜啼不止。加減當歸散。心熱煩啼者。面紅舌赤。或舌胎白滑。無燈則啼稍息。見燈則啼愈甚。宜導赤散加麥冬燈心。甚則加川連龍膽草。神不安而啼者。瞳中驚悸。抱母大哭而色紫黑。蓋神虛驚悸。宜安神丸定其心志。有吐瀉後。及大病後夜啼。亦由心血不足。治同上。凡夜啼見燈即止者。此爲點燈習慣。乃爲拘哭。實非病也。夜間切勿燃燈。任彼啼哭二三夜自定。

入方

當歸散　方見卷四疝證門。

導赤散　方見卷四啼哭門。

十味安神丸　治神虛驚悸。至夜則啼。

官揀參二錢　白茯苓三錢　大杭冬二錢　懷山藥二錢

正龍齒錢半二　鏡面砂水飛　寒水石水飛　粉甘草已上各五分

梅花片一分　赤金箔十片

共爲細末。煉蜜爲丸。芡實大。每服一丸。燈心湯下。

夜啼簡便方

小兒心熱面赤。夜多啼泣。硃砂五分。牛黃一分。共爲末。每一二分。犀角磨湯調下。

又治同前證夜啼。青黛研篩過。每服二分。燈心十莖。煎湯調服。小兒一百二十日內夜啼。用蟬退四十九箇。剪去前半截。用後半截。焙乾燥研末。每服四分。鈎藤湯下。

又方用蟬蛻十四箇。去翅足焙乾。入硃砂一分。共研末。蜜調塗母乳頭上。令兒吮之。納兒口中亦可。

小兒夜啼。不論有餘不足。皆有效。用五棓子研末。口中津唾和作餅子。始肚臍以

帶紮之皆效。又方。以竈心土研末二錢。硃砂飛過一錢。麝香少許。共爲末。蜜丸。菉豆大。每服五丸。水調下。

二便證治

經曰。北方黑氣。入通於腎。開竅於二陰。夫二陰者。前陰竅出小便。後陰竅出大便。又云。前陰主氣。後陰主血。蓋膀胱之津液。血所化也。由氣而後能出。太陰之傳送。氣之運也。由血而後能潤。此便溺之流通。見氣血之依附。而人之所以爲生者。以其有此出入關竅耳。清陽出上竅。謂呼吸也。濁陰出下竅。謂大小二便也。倘一息不運。則機緘窮而死矣。故二便不通。加以腹脹氣喘嘔惡煩燥者。不可治也。凡二便祕。宜入正散。外用掩臍法。蜜導法。則前後俱通矣。

入方

入正散　治熱聚下焦。二便不通。

淮木通　白滑石　黑梔仁　車前子

瞿麥穗　錦莊黃　白芒硝俱等分

看兒大小加減之。除大黃芒硝在外。將六味水煎極熟。加入大黃。再煎十數沸。取起。斟出澄清。以芒硝沖服。

掩臍法　治中下二焦積熱。大小便秘。用連鬚葱七莖不洗。生薑一大塊。淡豆豉三錢。食鹽三錢。同搗爛作一餅錠子。烘熱掩肚臍。以帛紮之。良久氣通。二便自利。

蜜導法　治二便不通。以此通其大便。則下焦氣行而小便自通矣。用冬蜜入兩。煉至滴水成珠不散。入皂角細末二錢。和勻。稍冷捻如小指大一條。外以葱涎塗上。輕輕插入穀道中。氣通則便利矣。

一二便不通簡便方

大小便不通。經二三日危急者。以皂角燒灰研末。米湯調下一錢。立通。　又方。以蜂蜜一盞。皮硝一錢。白湯一盞。空心調下。另以皂角於桶內燒烟。令兒坐桶上熏之。即通。　又方。用草烏一箇。削去皮。略以麝香搽上。抹以香油。輕插穀道內。名霹

靈箭至捷　二便不通百方不效肚脹痛咽喉窒塞或痰壅氣喘水米不下死在須臾宜急救之用甘遂五分麵包煨熟取出爲末入麝香一釐搗飯爲丸小兒服二分大人五分薑湯送下　又方以小竹筒抹以葱涎插入穀道以芒硝五錢切細香油半盞皂角末少許令人口含灌入穀道中少時即通

小便不利證治

經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣又曰膀胱不利爲癃不約爲遺溺又曰肝有熱則小便先赤　凡小便赤澁爲熱小便白遺爲寒熱者火有餘水不足治宜瀉心火滋腎水加味導赤散寒者火不足水有餘治宜温腎水益心火益智散　小便不通乃由臟氣虛受熱壅滯宜化不行非塞非痛但閉而不通腹脹緊滿宜五苓散加車前燈心　大病之後氣虛津液不足而小便閉者不可利之利則中氣日虛津液愈涸宜用人參散　小兒患淋小便淋瀝作痛不必分五種然皆屬於火熱宜滑利之海金沙散　小兒久病氣虛而淋病者不可利小便宜六味地黄丸滋其化源　小便自出而不禁者謂之遺尿睡中自出者謂之尿

淋。此皆腎與膀胱虛寒也。益智散加附桂龍骨。小兒初便黃赤。落地良久。凝如白膏者。謂之尿白。傷脾所致。久而成疳。胃苓丸。鹽湯下。小兒小便出時。色白渾濁。隨尿而來。謂之白濁。此心經虛熱。宜清心蓮子飲。

入方

加味導赤散　治心熱肝熱。小便赤澀。

淮木通　懷生地　炙草　枯黃芩
黑梔仁　澤瀉　北柴胡已上各一錢　淡竹葉七片
燈心十莖

水煎。空心熱服。

益智散　治水有餘。火不足而遺溺。

益智仁五錢鹽水炒　補骨脂三錢鹽水炒　白雲苓五錢酒炒

共爲細末。每服一錢。鹽湯調下。

五苓散　方見卷二暑證門。

人參散　治氣虛津液不足。小便不通。

官揀參一錢　大麥冬二錢
生薑三片
水煎服。

海金沙散　治小兒諸淋。皆屬於熱。

香附米酒炒　正川芎酒炒
陳枳殼炒　宣澤瀉炒
共爲細末。每服一錢。淡鹽湯調下。

胃苓丸　方見卷二溼證門。

清心蓮子飲　專治白濁。

白雲苓一錢五分　建蓮子二錢
官揀參五分　遠志肉五分
漂白朮六分　宣澤瀉四分
水煎。空心服。

川黃蘗五分　炙甘草二錢
赤茯苓屑炒各五錢　已上白滑石水飛一錢
陳石葦焙　尖檳榔炒已上各一錢五分

益智仁一錢　大麥冬一錢
石菖蒲五分切片　車前子五分
生甘草二分　燈心十莖

小便簡便方

凡小便不通。服藥無效。用商陸五錢研末。入麝香少許。先以舊夏布蓋於臍上。將藥放布上。待藥氣入腹。一時即通。小便數日不通。遍身手足腫滿。諸藥不應者。用蘇葉一觔。煎濃湯入脚盆內。令患者坐盆上熏之。冷則又添熱湯。外用炒鹽熨臍上。及遍身腫處。長久便通腫消而愈。又方用連鬚葱白一觔。搗爛炒熱。分作二處。各以布包。輪流熱熨臍下。即退。

小便閉結不通。藥不能效。用食鹽一兩。調溫水服之。良久。以指入喉中探吐。一吐即通。蓋上竅不通。下竅閉也。

又方。以皂角研末。吹些微入鼻中。令其噴嚏。亦是上升之意。如水注閉其上竅。則下竅不通。稍升提之。即時通矣。

大便證治

經曰。太陰司天。陰痺大便難。陰氣不用。病在於腎。又曰。太陽之勝。隱曲不利。互引

陰股。夫飲食之物。有入必有出也。苟大便不通。出入之機。幾乎息矣。急宜通之。使舊穀去而新穀得入。然有實閉有虛閉。最宜詳審。如形實氣實脈實又能食者。的有可下之證則下之。如八正散。承氣湯。木香檳榔丸之類。擇而用之。中病即止。不可過也。而形虛氣虛脈虛而兼食少者。雖有可下之證。宜緩不宜急。但用保和丸加枳實微利之。如平素便難者。血不足也。宜潤腸丸。蜜導法。

入方

八正散　方見卷四二便門。

承氣湯　方見卷二傷寒門。

木香檳榔丸　方見卷三傷食門。

保和丸　方見卷三傷食門。

潤腸丸　治老人虛人小兒產婦大便閉結。

火麻仁去殼　光杏仁去皮　當歸尾酒潤　陳枳殼已上各七錢五分

金井膠炒　蘿蔔子炒　家蘇葉已上各三錢　光桃仁去皮用七錢五分

煉蜜爲丸。每服一二錢。量人加減。白湯送下。

蜜導法　方見卷四二便門。

頭項顱證治

經曰。頭痛耳鳴。九竅不利。腸胃之所生也。小兒頭顱之證。多有由脾胃而得。又頭爲六陽所會。七竅居焉。故小兒之頭。四時宜涼。但兒頭熱即有病生。宜預防之。解顱者。謂頭縫開解而顱不合也。是由稟氣不足。先天腎元大虧。腎主腦髓。腎虧則腦髓不足。故顱爲之開解。然人無腦髓。猶樹無根。不過千日。則成廢人。其曰憂愁少喜。目白睛多。面皖白色。若成於病後者。猶凶。宜久服地黃丸。外用封顱法。

顱腫者。顱門腫起也。脾主肌肉。若乳哺不常。飽饑無度。或寒或熱。乘於脾家。致使臟腑不調。其氣上衝。爲之填脹。顱突而高。如物堆垛。毛髮短黃。骨蒸自汗。然亦有寒氣衝上而腫者。則牢韌堅硬。熱氣衝上而腫者。則柔軟紅色。然寒腫者十之一。熱腫者十之九。更有因包裹嚴密。蓋覆過厚。陽氣不得外出。亦令赤腫。皆用封顱法。熱腫者。瀉青丸。寒腫者。參蘇飲。

顖陷者。有因泄瀉久。而氣血虛弱。不能上充髓腦。故下陷如坑。此乃胃虛脾弱之極。宜急扶元氣。若與枕骨同陷者。百無一救。此中有稟受父精不足。母血虛羸而陷者。有因久病而陷者。然枕陷尤甚於顖陷。二者皆因腎元敗絕之證也。俱參苓白朮散。或八味地黃丸。　天柱骨倒。小兒有體色肥壯。不爲瘦悴。孰知形體過肥。中氣愈弱。是盛於外而歉於內也。忽然項軟傾倒者。此肝經風熱也。小柴胡加粉葛當歸白芍。

有因久病之後。及泄瀉日久。忽然頸項傾側。名天柱骨倒。最危之候。速救真元。十全大補湯加鹿茸。

有小兒食下頸便軟者。胎氣不足也。由稟父之腎元虛敗。峻補先天。其庶幾矣。補腎地黃丸。與六君子湯間服。

天柱骨倒之證。雖則三條。總係真陽大敗之候。爲小兒之惡證。保救真元。是其大要。外以生筋等藥貼之可也。

入方

六味地黃丸　方見卷一胎疾門。
封顖法　治頭縫不合。名解顖矣。
　天南星不拘多少。以薑汁炒枯。研細末。醋調塗於絹帛上。烘熱貼顖上。以合爲度。
瀉青丸　方見卷四啼哭門。
參蘇飲　方見卷三咳嗽門。
參苓白朮散　方見卷三疳證門。
八味地黃丸　方見卷一保產門。
小柴胡湯　方見卷二傷寒門。此加粉葛當歸白芍。
十全大補湯　方見卷一保產門。
補腎地黃湯　方見卷三吼喘門。
六君子湯　方見卷二類搐門。
生脈散　治筋軟無力。天柱骨倒。
　木鱉子六個　萆麻子六十箇並去殼

以藥研如泥。先抱頭起。以手摩其頸。令熱津唾調藥塗頸項。

又方　治項軟。

生附子去皮二錢　生南星去皮臍三錢

共研末。攤貼患處。

頭項簡便方

小兒解顱。或因病後忽然顖門寬大。頭縫四破。此腦髓不充。大虛之候。用鹿茸防風白芨柏子仁四味各五錢。共爲末。乳汁調作餅。貼顖門上。一日一換。以合爲度。治小兒顖如坑。由久病真元不足。氣血兩虛。大凶之候。速以十全大補加鹿茸薑棗煎服。外用狗頭骨炙黃爲末。雞蛋清調敷效。

目病證治

經曰。諸脈者。皆屬於目。又曰。東方青氣。入通於肝。開竅於目。大目雖爲肝竅。而五臟俱備。神之所托。故白珠屬肺。黑珠屬肝。瞳神屬腎。兩角屬心。上下眼胞屬脾。

五臟五色。各有所司。心主赤。赤甚者。心實熱也。赤微者。心虛熱也。肝主青。青甚者肝熱也。淡青者。肝虛也。脾主黃。黃甚者。脾熱也。淡黃者。脾虛也。目無精光。及白睛多而黑睛少者。肝腎俱不足也。目內赤色。心經積熱上攻。宜瀉內火從小便而出。導赤散加黃連防風。

目內黃者。脾熱也。宜瀉黃散。上下眼胞腫者。脾經風熱。亦同上治。

目連劄者。肝有風也。凡病或新或久。肝風入目。上下左右。如風吹兒不能任。故連劄也。瀉青丸。目直視者。肝有熱也。熱氣入目。障其筋。眼目之兩角焦緊。不能轉運。故直視者。瀉青丸。

小兒初生目閉。此胎熱也。內服生地黃湯。外用膽草煎湯洗目上。一日七次。恐延纏則損目。小兒生下眼胞赤爛者。由產時拭洗不淨。以致穢惡侵漬兩目角。故兩胞赤爛。至長不瘥。真金散。小兒久嗽。其目兩眶腫黑。如物傷損。白珠紅赤如血。謂之血眼。內服瀉白散。外用貼法。小兒生下數月內。目不見物。謂之雀目。由肝虛也。六味地黃丸。常以猪肝煮熟壓藥。

入方

小兒熱病。其目羞明喜暗者。風熱也。宜疎散風熱。清陽散火湯。

導赤散　方見四卷啼哭門。

瀉黃散　治脾經積熱。白珠生黃。

藿香梗二分錢　黑梔仁一錢　熟石膏一錢　北防風一錢

炙甘草五分

淨水煎。半餞服。

生地黃湯　治小兒胎熱。初生眼閉不開。

懷生地五分錢　赤芍藥一錢　正川芎五分　大當歸一錢

天花粉五分酒炒　炙甘草五分　燈心十莖

長流水煎。熱服。

真金散　治小兒眼胞赤爛。

雅川連二錢　川黃柏二錢　大當歸二錢　赤芍藥二錢

光杏仁五分去皮尖

右剉碎。以乳汁浸一宿。飯上蒸過。取濃汁點眼內。

瀉白散　治小兒久嗽。兩眼黑腫。白珠如血。

炙甘草　芽桔梗　廣陳皮　桑白皮

地骨皮各等分

水煎。熱服。

貼藥

大生地一兩　大黑豆一兩

二味。用水同浸一夜。取起。搗爲膏。貼眼皮上。其血自散。血淚卽出。腫黑卽消。

六味地黃丸　方見卷一胎疾門。

清陽散火湯　治小兒風熱眼疾。羞明喜暗。

荆芥穗一錢　小條芩一錢　正川芎一錢　北防風一錢

淨連翹一錢　黑梔仁二錢　當歸尾一錢　熟石膏一錢

川羌活五分　炙甘草五分　燈心十莖

水煎。食後服。

眼目簡便方

治目生努肉。赤脈貫瞳。白膜遮睛。諸般雲翳。用白丁香即麻雀屎也。倒者爲雌雀屎不用。取竪立者。雄雀屎也。不拘多少。取來研末。水飛過。如飛硃砂樣。澄滓不用。候藥澄底。傾去清水晒乾。每以些微。同乳汁研化。點翳上。其翳自去。神方也。取麻雀屎。寺院中疊城樓上有。

赤眼腫痛。用樸硝一撮。以碗盛豆腐一塊。將硝放豆腐上。飯上蒸之。俟硝已化。去豆腐不用。取汁點眼自愈。

敷火眼及風熱眼。生南星五錢。紅飯豆五錢。共爲末。取生薑自然汁。調作二餅。貼兩太陽穴。又敷火眼痛極。用大紅棗取肉五六枚。葱三四根。共搗如泥。作二小餅。閉目貼之。令其發散。蓋眼無風寒。必不疼痛。以此疎散。立時見效。昧者以爲火眼。必用涼藥敷點。而用黃連黃蘗之類。不知抑遏其火邪。不能外出。必變眼珠疼痛。久不能愈。愼之。

治爛弦風眼。百藥不治。此方最神。用鮮色銅綠三錢。研細末。以生蜂蜜濃調塗粗碗內。要調略乾稀。則少時流出矣。用艾燒煙。將碗覆艾煙上熏之。須熏至銅綠焦黑爲度。取起冷定。以乳汁調勻。飯上蒸過。搽眼皮上及爛弦處。百不失一。

治眼毛倒睫不起。用五棓子爲細末。蜜調敷眼皮上。其睫自起。
又方。以無名異爲末。紙捲作撚。點燈吹滅。開目熏之。睫自起。
赤眼腫痛不消。以精猪肉切一片。如指甲大。以水洗淨其血。貼於眼皮上。良久易一片。卽消。

耳病證治

經曰。北方生寒。在臟爲腎。在竅爲耳。又曰。腎氣通於耳。腎和則耳能聞五音矣。故耳本屬腎。耳珠前屬少陽膽經。小兒有因腎經氣實。其熱上衝於耳。遂使津液壅而爲膿。或爲清汁。亦有因沐浴水入耳中。灌爲聾者。內服蔓荆子散。外用龍骨散搽之。耳珠前後生瘡。浸淫不愈者。名月蝕瘡。俗謂以手指月。則令耳之前後生瘡。皆用外治之法。黃蘗散搽效。
若耳中忽作大痛。如有蟲在內奔走。或出血水。或乾痛不可忍者。用蛇蛻散。有忽然氣塞耳聾。此由風入於腦。停滯於手太陽經。宜疎風清火。導赤散加防風。或通竅丸。耳傍赤腫者。熱毒也。若不急治。必成大癰。外用敷毒散。內服消毒飲。

入方

蔓荊子散　治小兒腎氣上衝。灌爲聾耳。

蔓荊子一錢　粉乾葛一錢　赤芍藥一錢
桑白皮一錢　淮木通一錢　懷生地一錢
赤茯苓三錢　綠升麻五分　小甘草五分

水煎服。

龍骨散　治小兒聤耳流膿出汁。以此吹之。

正龍骨煅　明白礬煅　真鉛丹炒各二錢已上
當門子五厘

共爲末。以綿展乾耳內膿水。用小竹筒吹藥入耳。

黃蘗散　治小兒耳珠前後生瘡。浸淫不愈。

川黃蘗　白枯礬　海螵蛸
石龍骨各等分　信前胡一錢　白滑石
杭麥冬一錢　胭脂胚三錢
燈心十莖

共爲末。瘡溼用乾撚。瘡乾用猪油調搽。

蛇蜕散　治耳中痛不可忍。或出血水。或乾痛。用蛇蜕燒灰存性爲細末。鵝毛管吹入耳中。取蛇之善蜕。以解散鬱火也。

導赤散　方見卷四啼哭門。

通竅丸　治小兒耳忽暴聾。

雄磁石（煅）一錢　真麝香五釐

共爲細末。以棗研爛。和爲一丸。如棗核大。綿裹塞耳中。又以生鐵一小塊。熱酒泡過含口內。須臾氣即通矣。

敷毒散　治小兒耳傍赤腫。熱毒也。恐防作癰。用綠豆粉不拘多少。以老醋調成膏。敷腫處。乾易之。

消毒散　治小兒耳傍赤腫。內服之藥。

川羌活七分　北防風七分　片黃芩七分　淨連翹七分

芽桔梗七分　官揀參七分　正川芎七分　當歸尾七分

北柴胡七分　小甘草四分　生薑一片　燈心十莖

水煎服。

耳病簡便方

治小兒無故耳聾。取龜尿滴入耳中效。或以生蒜油日滴三五次。數日卽愈。耳內腫痛。流膿出水。用虎耳草（又名倒垂蓮）搗取汁水。灌入耳中。常常用之。此治耳聾之妙藥。略加枯礬更妙。

耳內濃水不乾。用千層石榴花焙乾爲末。以小竹筒吹入耳內。

耳外生瘡用黃丹一錢。松香八分。輕粉一分。共爲細末。香油調搽。

小兒耳後生瘡爲腎疳。以地骨皮研末。篩出細末。香油調搽。粗末煎水洗。

諸蟲入耳。取貓尿滴入耳中。其蟲自出。若用蒜油滴之。則蟲死難出。取貓尿法。以生薑揉鼻。尿自出。

一切惡蟲入耳。用稻草燒灰淋汁。灌入耳中。其蟲卽死而出也。

鼻病證治

經曰。西方白氣。入通於肺。開竅於鼻。又曰。五氣入鼻。藏於心肺。有病而鼻爲之不利也。蓋鼻爲肺之竅。鼻塞者。肺氣不通於竅。然肺主皮毛。風寒外感。則肺氣壅閉而鼻塞川芎膏

鼻涕者。肺爲寒風所襲。而津液不收。則爲鼻涕。細辛散疎之。

鼻齆者。肺受風寒。久而不散。膿涕結聚不開。使不聞香臭。則齆矣。萬全膏。已上三證。皆宜疎利。俱用通氣散　鼻乾者。心脾有熱。上蒸於肺。故津液枯渴而乾。當清熱生津。導赤散加麥冬。

如病已極。鼻乾而黑窄張。長出冷氣者。肺絕也。不治之症。

鼻淵者。流涕腥臭。此膽移熱於腦。又名腦崩。宜用辛荑散。

凡小兒初生三朝一七。忽然鼻塞。不能吮乳。不得呼吸者。因乳母夜臥之時。不知迴避。鼻中出氣。吹兒顖門。或因洗水未避風寒。所以致兒鼻塞。通關散和葱膏攤帛貼顖門愈。

鼻衄者。五臟積熱所致。蓋血隨氣行。得熱而妄動。溢出於鼻。宜涼血降火。加減地黃湯外用吹鼻散

入方

川芎膏 治小兒外感風寒。肺氣壅閉而鼻塞。

正川芎三錢 北細辛一錢 小薑本一錢 香白芷三錢
炙甘草三錢 梅花片 當門子 光杏仁去皮尖各一錢

共爲末。煉蜜爲丸。龍眼核大。每服一丸。燈心湯化服。

細辛散 治小兒風寒所襲。鼻流清涕。

官揀參 信前胡 北細辛 北防風
正川芎 炙甘草各等分

共爲末。每服一錢。薑葱湯調服。

萬金膏 治小兒風熱侵肺。鼻鼽不聞香臭。

川羌活 正川芎 北細辛 淮木通
淨麻黃 石菖蒲各一錢

共爲末。每一錢。以蜜和勻。薑湯化服。

麗澤通氣散　治小兒鼻塞。鼻涕鼻齆。

川羌活　川獨活　漂蒼朮　北防風
綠升麻　荊芥穗　粉乾葛　香白芷
正川芎　淮木通二錢已上各　淨麻黃　北細辛
炙甘草五分已上各　生薑三片　大棗三枚

水煎。食後服。

辛荑散　治小兒鼻流濁涕而腥臭。

辛荑仁五錢　蒼耳子炒二錢五分　香白芷二錢　薄荷葉一錢

雅黃連二錢

共晒乾爲末。每服一錢。葱湯調下。

通關散　治乳子鼻塞。不能吮乳。

香附子　正川芎　荊芥穗　直殭蠶
北細辛　猪牙皂五錢已上各

共爲細末。以葱白搗成膏。每用末藥五錢。與葱膏和勻。攤軟帛上。臨臥烘熱。貼

兒顖門上。早晨取去。

加減地黃湯　治小兒鼻中出血。

懷生地二錢　片黃芩二錢　黑梔仁二錢　赤芍藥一錢

白茅根一錢

水煎。空心熱服。

吹鼻散　治小兒鼻中出血。

黑梔仁炒　亂油髮燒存性各等分

共爲細末。以些微吹鼻中。

鼻病簡便方

鼻疳破爛。用杏仁去皮尖搗碎。以紙包。壓去油。以成白粉爲度。每杏仁粉二分。對真輕粉一錢。和勻。吹患處。　鼻流濁涕不止。名曰鼻淵。乃風熱在腦故也。用蒼耳子炒辛荑仁白芷薄荷等分爲細末。每用一錢。臨臥葱湯調服。不以數拘。以愈爲度。　鼻中流臭黃水。名控腦沙。川紫貝子俗名南蛇牙齒。粵人呼狗屐螺。取二三

枚。火煅醋碎爲末。紙包放地上。去火毒。每服一錢。大人二錢。以絲瓜藤煎湯調藥。空心服。以愈爲度。

鼻被破傷。或擦落。急以貓兒頭上毛剪碎。以口中津唾調。敷之自愈。

疳瘡蝕鼻。破爛不堪。用五棓子燒灰存性研末。以臘猪油和塗之。

口瘡證治

經曰。中央黃色。入通於脾。開竅於口。又曰。脾氣通於口。脾和口能知五味矣。故口者脾之外候。凡病口者。口內白屑滿舌。如鵝之口。此肺熱而心脾爲甚。故發於口也。內服沆瀣丹。外以保命散吹之。口瘡者。滿口赤爛。此因胎稟本厚。養育過溫。心脾積熱。熏蒸於上。以成口瘡。內服沆瀣丹。外以地雞擂水搽瘡上。地雞卽桶蟲。人家罐下有之。

口糜者。滿口生瘡潰爛。乃膀胱移熱於小腸。膈腸不便。上爲口糜。以導赤散去小腸之熱。五苓散去膀胱之熱。當以二方合服。

口疳服涼藥不效。乃肝脾之氣不足。虛火泛上而無制。宜理中湯。取其浮遊之火。

外以上桂末吹之。若吐瀉後口中生瘡。亦是虛火。理中湯。昧者以爲口瘡。悉爲實熱。概用寒涼。必不救。

上腭有脹起如懸癰者。此名重腭。由脾胃挾熱。氣血不能收斂而成。用針刺去惡血。內服沆瀣丹。外以碧雪散吹之。

小兒雨頤流涎。浸漬胸前者。此名滯頤。蓋涎者脾之液。口爲脾竅。脾胃寒虛。不能收斂津液。故涎從口出。雨滯於頤。宜溫脾丹。

小兒口頻撮者。氣不和也。蓋脣應乎脾。氣出於肺。脾虛不能生肺。故口頻撮。異功散。補脾生肺愈矣。

小兒口撮。面青多哭。此陰寒之至。肝脾虛冷。臍下痛也。理中湯溫之。

小兒急欲吮乳而口不能吮者。心脾有熱。舌不轉運。瀉黃湯清之。

入方

集成沆瀣丹　方見卷一胎疾門。

保命散　治小兒鵝口口瘡。

箭頭砂　枯白礬　明牙硝二味俱五錢

共爲細末吹之。

導赤散　方見卷四啼哭門。

五苓散　方見卷二傷暑門。

理中湯　方見卷二乳子傷寒門。

碧雲散　治小兒懸癰重腭。

茸蒲黃　洋青黛　白硼砂　明牙硝

生甘草各等分

共爲細末。吹之。

溫脾丹　治小兒脾冷流涎。浸漬頤間。

南木香　法半夏各三錢　黑炮薑　漂白朮各二錢

廣陳皮一錢　杭青皮一錢

右爲末。煉蜜爲丸。龍核大。每服一丸。米飲下。

異攻散　方見卷三傷食門。

瀉黃散　治小兒心脾有熱。舌不轉運。不能吮乳。

赤茯苓　片黃芩　川黃蘗　川黃連

黑梔仁　宣澤瀉　茵陳蒿各一錢　燈心十莖

水煎。熱服。

口瘡簡便方

口瘡破爛。幷治咽喉。喉癬喉癰。用鳳凰衣。卽伏雞子殼內衣也。微火焙黃。橄欖燒存性。兒茶三味俱等分。共爲末。以一錢爲則。加冰片五釐。口疳搽患處。喉病吹之。卽能進飲食。

口瘡久不食。虛火也。用生附子一箇。切焙爲末。醋和作餅。男左女右。貼脚跟。引火下行自愈。

小兒口角生瘡。名燕口瘡。以亂髮燒灰存性。米飲調服。外卽以此敷之。

又方。蒸飯時。收甑蓋上流下氣水。搽之卽愈。

口脣腫黑。癢痛不可忍。先以磁鋒砭去惡血。以古銅錢磨猪油塗之。　治走馬牙

疳及各樣口疳多年。田野中白螺螄殼研爛。少加兒茶。共爲細末。吹患處。即愈。口疳瘡及咽喉疼痛。用吳茱萸二兩研末。少加麵粉。醋調作二餅。貼於脚心。以布紮之。過夜即愈。

舌病證治

經曰。南方生熱。熱生火。火生心。心主舌。在竅爲舌。又曰。心氣通於舌。心和則舌能知五味矣。夫舌爲心之苗。胃之根。小兒多生舌病。以心脾之積熱也。故有重舌木舌弄舌舌胎等證。宜辨其虛實而治之。重舌者。心脾有熱。蓋脾之大絡。出於舌下。有熱則氣血俱盛。附舌根下。忽重生一舌而短小。內服沆瀣丹。外以針砭去惡血。用蒲黃黃柏末敷之。木舌者。心脾積熱之氣上衝。故令舌腫。漸漸長大。充滿口中。若不急救。必致害人。內服沆瀣丹。外以針刺去惡血。以碧雪散竹瀝調勻敷之。弄舌者。脾臟虛熱。令舌絡緊。時時舔舌。俗人稱爲蛇絲驚者是也。切勿以寒涼攻下之治。少與瀉黃散服之。不效。口若求湯。或渴欲飲水。面無紅赤色。此脾胃津液不足。不可誤認爲熱。宜七味白朮散。面黃肌瘦。五心煩熱而弄舌者。此

疳證也。須從疳證門參攷。宜集聖丸。大病後精神困倦。飲食少思而弄舌者。凶候。蓋氣血兩虛。精神將脫。速以十全大補湯挽救之。舌上黑胎。其熱已劇。急以薄荷煎湯洗之。如舌轉紅色者可治。涼膈散下之。洗不紅者不治。泄瀉後舌上白胎。此津液不深。不能上潮於口。爲虛熱也。理中湯。

入方

集成沉麝丹　方見卷一胎疾門。
碧雪散　方見卷四口瘡門。
瀉黃散　方見卷四口瘡門。
七味白朮散　方見卷三泄瀉門。
集聖散　方見卷三疳證門。
十全大補湯　方見卷一保產門。
涼膈散　治心脾有熱。舌上黑胎。

淨連翹一錢　黑梔仁六分　錦大黃五分　薄荷葉一錢

片黃芩六分　芒硝五分　生甘草四分　竹葉七片
燈心十莖
水煎。臨服加生蜜十匙。對服。

舌病簡便方

治重舌木舌。腫滿強鞕。或疼不止。不能言語。宜用粗鍼線紮筋頭上刺患處。甚者數十刺爲妙。只鍼舌尖及舌兩傍舌中心及舌下。切不可鍼。犯之令出血不止。其刺出之血。以紅色者毒輕。紫色者爲重。黑色者最危。仍以蒲黃末擦舌上即消。舌或脹大腫鞕。即時氣絕。名爲翌舌。（翌入聲）用皂礬不拘多少。新瓦上以火煅變紅色爲度。放地上。候冷研細搽舌上立愈。重舌木舌皆效。（翌之鞕根之節謂如翌之鞕大相上也）舌腫滿不能出聲。以梅花冰片研爛敷之。或以食鹽百草霜共爲末。井水調敷即效。絆舌者。舌根下有筋一條。絆其舌尖。令舌短縮不能吮乳。細視之。明見舌根之下有筋。如線牽絆其舌。用針輕輕挑斷之。挑時但挑此筋。不可誤傷舌根。爲禍不小。曾見愚婦以刀割斷之。誤傷舌根。流血不止而死。

舌斷能重生。用活蟹一隻。炙乾爲末敷之。此方至神至驗。

齒牙證治

經曰。天有列星。人有齒牙。又曰。手陽明之脈。入下齒中。足陽明之脈。入上齒中。故知上牙屬胃。下牙屬大腸。齒屬腎。凡齒生遲者。腎氣不足也。蓋腎主骨。齒者骨之餘。腎不足則髓虧。不能充乎齒。所以齒遲。宜地黃丸。　正下牙牀腫者。此手足陽明實熱也。涼膈散爲君。加知母石膏升麻爲佐。頻頻含嚥。　腫齦者。腎臟積熱。附齦而腫痛也。以鍼刺去其血。用鹽湯洗淨。黃蘗末敷之效。　小兒多食肥肉。齒牙臭爛不可近者。名爲臭息。此胃膈實熱也。內服沆瀣丹。外以荊竹瀝和薑汁含漱。　牙疳者。初作臭氣。次則齒牙黑。甚則齦肉爛而出血。名爲宣露。此由腎熱。其氣直奔上焦。故以走馬爲喻。宜速治之。若失治。脣破鼻穿。齒落者。名曰崩沙。氣喘痰潮。飲食減少。則不可治。內服沆瀣丹。外以如聖散敷之。　夢中咬牙。風熱也。由手足陽明二經積熱生風。故令相擊而有聲也。必在夢中者。風屬陽。動則風行於陽。靜則風歸於裏也。宣風湯。

咬牙一證。惟痘疹見此爲危候。餘則皆無大害。亦有因病戰慄。鼓頷而鬬牙者。治其本證則自止矣。牙齒落後不復生者。由於舌舔之故。其肉頑厚。用鍼刺去其血。以鼠骨散搽之自生。

入方

六味地黃丸　方見卷一胎疾門。

涼膈散　方見卷四舌病門。

如聖散　治小兒走馬疳。幷崩沙宣露。

用婦人泉桶中白垢刮下。瓦上煅至煙盡一錢。銅綠二分。麝香半分。共爲末。先以蠟樹葉浸米泔水洗淨。後搽此藥。

宣風散　治小兒夢中咬牙。

尖檳榔五錢　廣陳皮一兩五錢　黑牽牛一兩取頭末炒焦　炙甘草五錢

共爲末。每服一二錢。蜜湯調。空心服。

鼠骨散　治小兒齒落不生。

用雄鼠一隻。爛去皮。取全骨炙枯研細末。和麝香一分。擦刺處。良久以薑湯漱之。

齒病簡便方

牙齦潰爛。諸藥不效者。用欖橄二三個。連皮帶核。火中煅過存性。如冰片半分。搽之神效。走馬牙疳。臭爛出血。紅棗三枚去核。以明雄研末。填滿棗肉。新瓦盛之。火煅存性。研末搽之。

又方。鳳凰衣未得見水者。焙黃少加枯礬。共爲細末搽之。

咽喉調治

經曰。咽喉者。水穀之道也。喉嚨者。氣之所以上下者也。又曰。一陰一陽結。謂之喉痺。蓋咽者胃管。主納水穀而居後。喉者肺管。專主呼吸而居前。爲一身之總要也。若胸膈積熱毒。致生風痰。壅滯不散。發於咽喉。病名雖多。無非熱毒。速宜清解。緩則有難救之患。輕則甘桔湯。重則化毒湯。如痘瘡喉咽痛者。毒氣上攻也。加減

甘桔湯。喉中生瘡。不能吮乳。化毒湯。小兒爲諸骨所哽。骨大難嚥者。以鵝毛掃咽吐之。骨小者。用海上方治之。

入方

甘桔湯　治小兒胸膈積熱。致生風痰而患喉痺。

粉甘草四錢　芽桔梗四錢

以淨水煎。細細嚥之。

化毒湯　治小兒咽喉證危迫者。

芽桔梗　南薄荷各一錢　荊芥穗　炙甘草各一錢五分

白芒硝一兩　山豆根一錢五分　馬牙硝　白硼砂各二錢五分

明雄黃　鏡面砂各一錢

共爲細末。每服一錢。白湯調下。仍以此藥吹喉中。

海上方　治小兒諸骨所哽。

用金鳳花根搗碎。以米醋濃煎。用有嘴瓶盛之。口對瓶嘴。仰面吸藥吞之。其骨

即下。吞藥勿令霑牙。又或以王藥花根。亦可如上法嚥之。

咽喉簡便方

治喉痺乳娥。用雞內金。勿洗。陰乾燒過。存性研末。以小竹筒吹入。即破而愈。（雞內金即雞肚腹內肫皮也）

咽喉內生瘡。鼻孔內赤爛。若作喉風治立死。用白霜梅一個。燒存性。枯者一錢。穿山甲一錢炙枯。共爲細末。吹喉中。神效。

喉瘡已破。瘡口疼痛。難進乳食。用猪腦蒸熟。薑醋調和服之自愈。咽中結核不通。飲食危困欲死。用百草霜以蜜和爲丸。如芡實大。每一丸白湯化開灌之。甚者不過二次即愈。

誤吞針。用磁石研末。以黃臘鎔化。和丸如豆大。吞下。針共丸藥同從大便出。

誤吞銅錢金銀釵環之類。只以米泔多服之。久之自出。

誤吞銅錢。生慈菇搗汁多飲。自然消化。生葧薺搗汁飲更妙。

誤吞竹木及魚骨。哽咽不下。用象牙磨濃汁調服。若吞鐵鉤子。以沙糖用象牙末

服。治諸骨哽咽不下。用蕨靈仙三錢。煎湯頻頻嚥之。其骨即轉軟如綿而下。諸骨哽咽。用狗一隻。倒吊取口涎。徐徐與嚥即化。又或以狗涎半盞。沙糖半盞。調服立消。凡諸骨哽咽。穀樹葉搗爛取汁服。其骨自軟而出。若蕨靈仙穀樹葉搗爛取汁服。相資予並相能軟骨故也。

凡誤吞金銀銅鐵之類。以橄欖燒灰研末。水調下。其物自出。此方極驗。

龜胸龜背

龜胸者。胸高腹滿。形如覆掌。多因乳母多服五辛酒醴炙煿之類。或夏日熱乳宿乳與兒。蓋因肺氣最清。為諸臟華蓋。日久痰滯則生風熱。膈滯火邪。則胸骨脹起。痲痘之後。多有此症。宜清肺滌火。杏仁前胡之類。

龜背生下不能保護。以客風入於骨髓。或兒坐早勞傷氣血。或咳久不止。致肺虛而腎亦無所生矣。腎主骨。風寒乘虛則入於骨髓。致精血不能流通。故成背龜。治宜松蓋丹外。以龜尿塗法。此從前證法也。

予按龜胸有治龜背乃不治之證。前人證治猶有未善。雖曰客風入骨。骨坐早

勞傷。咳嗽肺虛。然未窺其病源。無非以現在者言之也。凡小兒稟受真元足者。嘗見其赤身裸體。當風露坐。半週之後。坐以座欄。從未聞有客風入骨。坐早勞傷嗽久而病龜背之說。此說蓋由稟父母精血不足。元陽虧損者多有之。不觀小兒龜背。正在命門之間。漸次骨節浮者。其腰如弓。實因骨痿不能支持之故。豈風邪爲患哉。此證百不一救。原無治法。而前人強立松蘿丹。反用麻黃大黃獨活防風一派攻伐之藥。適足以速其殤也。若以鄙見。但當以六味地黃丸。加上桂鹿茸。救其先天。復以四君六君之類。扶其胃氣。或可以十中保一。除此之外。並無治法。若謂松蘿丹能治龜背。吾不信也。

入方

杏仁煎　治小兒肺脫離邪而患龜胸。

錦大黃（好酒蒸九晒九晒）　天門冬去心　真杏仁去皮尖取淨仁　淮木通各一錢　桑白皮　甜葶藶　熟石膏各二分

水煎。臨臥時服。加增分兩。以蜜爲丸。徐服更妙。

松蓝丹　治小兒龜背姑存之可也。

黃松花　陳枳殼　北防風　川獨活一兩上各
淨麻黃　信前胡　川大黃　青化桂五錢上各

爲末蜜丸。菜豆大。每服十丸。米飲下。

六味地黃丸　方見卷一胎疾門。

四君子湯　方見卷三瘧疾門。

六君子湯　方見卷二類搐門。

鶴膝證治

小兒鶴膝。因稟受腎虛。血氣不充。以致肌肉瘦削。形如鶴膝。外色不變。膝內作痛。屈伸艱難。若掀腫色赤而作膿者。爲外因可治。若腫鞭色白不作膿者。是屬本性難治。屬外因者。十全大補湯加蒼朮黃檗防己。屬本性者。以六味地黃丸加鹿茸。補其精血。仍須調補脾胃。以助生化之源。

入方

十全大補湯　方見卷一保產門。此加蒼朮黃柏防己。
六味地黃丸　方見卷一胎疾門此加鹿茸。

五輭五鞕

小兒生後。有五輭五鞕之證。乃胎元怯弱。稟受先天陽氣不足。不耐寒暑。少爲六淫所犯。便爾五輭見焉。五輭者。頭項輭。身體輭。口輭。肌肉輭。手足輭。是爲五輭。頭項輭。肝腎病也。肝主筋。腎主骨。肝腎不足。故致頭項輭而無力。手足輭。脾胃病也。脾主四肢。脾胃不足。故手輭而懶於握。足輭而傭於步也。身體輭。陽衰髓怯。遍身羸弱而不能強立。口輭者。虛舌出口而懶於言。肌肉輭者。肉少皮寬。肌體虛怔之象也。總之本於先天不足。宜地黃丸以補腎。而更所重者在胃。蓋胃爲五臟六腑之化源。宜補中益氣。升舉其脾氣。倘得脾胃一旺。則臟氣有所稟。諸輭之證。其庶幾矣。

五鞕者。手鞕。脚鞕。腰鞕。內鞕。頸鞕也。仰頭取氣。難以動搖。氣壅疼痛。連於胸膈。手心脚心。冰冷而鞕。此陽氣不榮四體。爲獨陰無陽難治。若肚筋青急。乃木乘土位。

俱宜六君子湯加薑桂升麻柴胡。以補脾平肝。若面青而小腹鞕滿。不治。

入方

六味地黃丸　方見卷一胎疾門。此加鹿茸上桂。

補中益氣湯　方見卷一保產門。

六君子湯　方見卷二類搐門。此加乾薑上桂升麻柴胡。

丹毒證治

小兒赤遊丹毒。皆由心火內壅。熱與血搏。或起於手足。或發於頭面胸背。遊移上下。其熱如火。痛不可言。赤如丹砂。故名丹毒。凡自腹出四肢者易治。自四肢入腹者難治。治丹之法。先用辛涼解表。使毒漸消。方可搽敷。若先不解表。遽用搽敷。必逼毒入腹。以致不救。小兒一歲以外者易治。未週歲者難治。然治之得法。無論大小。予嘗治百日內外大丹。從陰囊不起。按法治之。三日後陰囊蛻去一殼而愈。小兒十種丹毒。如三日不治。攻入腸胃則不救。宜逐一辨認。依方治之。百不失一。

凡治丹毒。俱宜先服防風升麻湯。以解毒發表。次用磁鋒針去其血。則毒隨血散。至神至捷。百發百中。

入方

防風升麻湯　總治十理丹毒。

北防風　綠升麻　黑梔仁　大麥冬
荊芥穗　淮木通　粉乾葛　南薄荷
潤玄參　牛蒡子（以上各一錢）　粉甘草（五分）　燈心（十莖）

水煎熱服。便閉。加大黃利之。

鋒鍼砭法　用上清鎲器。輕輕敲破。取其鋒銳者一枚。將筋頭劈破。橫夾鎲鍼。露鋒於外。將線紮緊。以鎲鋒正對丹毒之處。另以筋一條。於鎲鋒筋上輕輕敲之。其血自出。多刺更妙。毒血出盡立時見功。治丹若不砭去惡血。專用搽敷。十不救一。

十種丹證

一、飛竈丹。從頭項起腫。然後散開。先用葱白搗取自然汁。塗之效。
二、走竈丹。從頭頂起紅腫。痛苦異常。用飯豆研末。和雞蛋清調塗。
三、鬼火丹。從面部起紅腫。用竈心土研爲細末。雞蛋清調塗。
四、天人丹。從背上起赤點。用桑白皮切碎焙乾研末。米醋調塗。
五、天竈丹。從兩臂赤腫黃色起。用柳木燒灰研末。淨水調塗。
六、水丹。先從兩脇起赤腫。用多年鏽鐵磨濃汁。猪油調塗。
七、葫蘆丹。先從臍下起紅腫。用尖槐螂切碎爲末。米醋調塗。
八、野火丹。先從兩脚起紅腫。用乳香去油研末。以羊油調塗。
九、煙火丹。從脚背上起紅腫。用猪糟下土研末。磨油調塗。
十、胡漏丹。從陰囊下起紅腫。用門檻下干脚土研末。羊油調塗。
更有胎毒重者。遍體皆是。速用芸薹子。即油菜子也。稱過一兩。酒一大壺。和研濾去渣。取酒復熱數沸。不拘時。温服二盞。
又方。芸薹菜即油菜也。取菜葉搗爛敷之。隨手即消。如無生菜。乾者爲末。水調敷。
凡丹毒遍身。或連腰周匝。百方不能治者。惟此最神。

水痘露丹

水痘似正痘。外候面紅脣赤。眼光如水。咳嗽噴嚏。涕唾稠黏。身熱二三日而出。明瑩如水泡。形如小痘。皮薄痂結。中心圓暈。更小易出易靨。溫之則痂難落而成爛瘡。切忌薑椒辣物。幷沐浴冷水犯之。則成薑芥水腫。自始至終。惟小麥湯爲準。小兒生後。百日內外。半歲以上。忽然眼胞紅腫。面青黯色。夜間煩啼。臉如胭脂。此因伏熱在內。發之於外。初則滿面如水痘。脚微紅而不壯。出沒無定。次至頸項。赤如丹砂。名爲露丹。以三解散疎散之。

入方

小麥湯　治小兒水痘。

白滑石五分　地骨皮五分　生甘草五分　官揀參四分
川大黃四分　淨知母四分　川羌活四分　葶藶子五分
小麥一撮引一十四

水煎。熱服。

三解散　治露丹。

官揀參　北防風　明天麻　川鬱金
節白附　錦莊黃　枯黃芩　直殭蠶
北全蠍　陳枳殼　南薄荷　京赤芍
小甘草（隨宜加減）　燈心十莖

水煎。熱服。

破傷風證

小兒或因跌撲。或刀斧破傷風邪。暗襲傷處發腫。謂之破傷風。速宜治之。不然。則發痙矣。內服疎風活血散。外以紫金錠塗之。

疎風活血散　治小兒破傷風。已痙未痙者皆治。

全當歸　懷生地　赤芍藥
鮮紅花　大川芎　廣蘇木
北防風（已上各一錢二分）
炙甘草（已上各六分）

生薑三片　大棗三枚　水煎熱服。

紫金錠

山慈菰三兩　五棓子三兩　芽大戟一兩　明雄黃鏡面砂各一兩　真麝香三錢

共爲細末。糯米飲和藥爲錠。磨水塗之。

斑疹癮疹

小兒斑與疹。宜分證候陰陽。其掀腫於外者屬少陽相火。謂之斑。其證發於面部。或背部。或四肢。極其稠密。色如錦文紅赤者。胃熱也。紫色者。胃爛也。宜消斑青黛飲。其紅點發於皮膚之內不出者。屬少陰君火。謂之疹。其證發於胸腹手足稀而少者。此由無根失守之火。聚於胸中。注蒸於肺。隱於皮膚而或小疹。其狀如蚊跡蚤斑而非錦紋也。理中湯

斑疹內吐瀉者。慎勿吐之。因其毒氣從上下出。宜調中氣。如吐瀉後遍身發熱。斑

如錦紋者。恐防熱氣乘虛入胃。其夏月多有此證。化斑湯。癮疹多屬於脾。以其隱隱在皮膚之間。發而多癢。或不紅者。俗人名爲風丹。加味羌活散。

入方

消斑毒黛飲　治陽毒發斑。

正雅連　熟石膏　淨知母
黑梔仁　潤玄參　綠升麻
片黃芩各一錢　官揀參　洋青黛
生薑三片　豆豉二十粒

水煎。熱服。

化斑湯　即人參白虎湯。治陽明胃熱發斑。

官揀參一錢　熟石膏四錢　淨知母二錢　炙甘草一錢
淡竹葉二錢　粳米一撮

水煎。熱服。

加味羌活散　治癮疹作癢。世俗謂發風丹者是也。

川羌活　信前胡　芽桔梗　蘇薄荷
陳枳殼　明天麻　香白芷　正川芎
淨蟬蛻已上俱各一錢　官揀參　炙甘草各五分　生薑三片

水煎熱服。

按藥方芸薹菜。即油菜。搗爛取汁。生鐵繡生大黃等分研末。以芸薹汁調塗之。

諸瘡證治

經曰。諸痛癢瘡。皆屬心火。世間瘡瘍癬疥。惟小兒最多。豈其稚陽純氣。易與歲運火政相乘耶。抑不識不知而寒溫動定之乘其道耶。復有父母之遺毒爲兒終身之害者。可不有以治之乎。小兒初生遍身蟲疥。與乎流水風瘡。一皆胎毒也。切勿外治。宜內服胡麻丸。倘誤用搽洗。逼毒入腹。以致腹脹。危候也。急服解毒湯爲佳　凡頭面遍體有瘡。原未搽洗而瘡忽自平。更加痰喘氣急者。切不可下。宜連翹丸解托之。

小兒未過週歲。無論一切瘡疥。皆不宜擦洗。總以胡麻丸爲主治至穩。小兒生癰毒腫癤。皆氣血凝而火熱乘之。內服大補湯。外以紫金錠塗之。頸上結核腫脹發熱者。內服胡麻丸。外以五棓子爲末。醋水調敷。一日二易爲妙。

入方

胡麻丸　治小兒風瘡疥癬。

嫩苦參五錢　何首烏蒸　胡麻仁炒　蔓荊子炒
威靈仙炒　荊芥穗炒　皂角刺炒各三錢已上　石菖蒲炒
白菊花各二錢

右爲細末。酒打米糊丸。每一二錢。量兒大小。竹葉煎湯調下。

解毒湯　治小兒瘡疥。誤用搽洗。逼毒入腹。以此托之。

潤元參　淨連翹　綠升麻　片黃芩
京赤芍　全當歸　川羌活　北防風
懷生地　荊芥穗　淮木通已上各三錢　炙甘草五分

燈心十莖

水煎。熟服。大便祕。加酒大黃。

連翹九　治小兒瘡疥。毒陷入裏。以此托之。

淨連翹　桑白皮　白頭翁　粉丹皮

北防風　川黃蘗　青化桂　淡豆豉

海螵蛸　輭秦艽　川獨活已上各三錢

右爲細末。煉蜜爲丸。龍眼核大。每一丸。燈心湯下。

大補湯　治小兒或生癰疽。出膿之後。或頑瘡破爛。久不收口。凡一切瘰瘍。皆屬不足。切不可再用寒涼。

官揀參一錢　嫩黃耆　正川芎　淨連翹

香白芷　白雲苓　大歸身　漂白朮

懷生地　赤芍藥　炙甘草各二分已上俱

生薑三片　大棗三枚

水煎。半餞服。每日一劑。

瘰癧證治

小兒瘰癧。由肝膽二經風熱血燥而成。蓋二經常多氣少血。倘怒則肝火動而血熱。腎陰虛則不生木而血燥。燥則筋病累累然結皆貫珠。其候多生於耳之前後。連及頭項。下至缺盆及胸腋之側。又謂之馬刀。初起如豆粒。漸如梅李或一粒。或數粒。按之則動而微痛不甚熱。久之則日益以甚。或頸項強痛。或午後微熱。或夜間口乾。飲食少思。四肢倦怠。或堅而不潰。或潰而不合。皆由氣血不足。往往變成疳瘡。此證本非外科。切忌刀針爛藥取去其核。昧者不識病源。誤用爛藥取核。不知肝膽二經內有相火。抑鬱不伸而生瘰癧。爲之益氣養榮。舒筋散鬱。猶恐不暇。何敢用刀針爛藥以致破爛不收。膿血交併耶。子目擊其誤治致死者。不可勝紀。凡小兒患癧。不可妄治。只宜內服單方。切忌取核。慎之戒之。

凡小兒頸項結核。或三五粒十數粒。或痛。或不痛。或熱。或不熱。用牆根下鳳尾草梗如鐵線而黑。葉似鳳尾。本草內名石長生。即牆縫中所生小蕨是也。單取其根。水洗淨。每用一兩。以糯米濃酒一碗。瓦瓶濃煎。去渣服酒。每日服。勿求速效。多則

一月。少則二十日。其核全消。再不復發。此藥氣味平淡。更不苦寒。實爲神授。藥賤而功弘。誠仙方也。

凡小兒耳之前後。忽有瘡作核如杏核。大小不一。名馬刀瘡。爲瘰癧之根。用桃樹白皮。切三指大一塊。刮去外皮。留內一層。貼瘡上。以艾炷於桃皮上灸之。覺熱痛即止。毋令傷皮。明日又灸。不數次而核消矣。　治小兒瘰癧未潰者。令內消。已破者。能收口。服此一月全愈。用真蠶殭半勫。先用清水洗三次。去石灰淨。晒乾炒枯。另將晚米半勫炒熟。共研細末。米糊爲丸。重一錢一顆。每日空心時。以夏枯草煎湯兒大者二丸。小者一丸。研爛調服。常須以甘肥葷潤之物滋潤之。

紫霞膏　治瘰癧初起。未成者。貼之自消。已成者。貼之自潰。已潰核存者。貼之自脫。并治諸色頑瘡。破爛不愈。疼痛不已者。俱皆神效。　用明淨松香一勫。研末。鮮色銅綠二兩。研末。以真麻油四兩。入鍋內。先煎數沸。滴水不散。方下松香熬化。次下銅綠。煎至白烟將盡。其膏已成。退火傾入磁灌收之。凡用時。於熱湯內頓鎔。旋攤旋貼。

集成白玉丹　專治瘰癧破爛。多年不愈。連及胸腹。

老子曰。下士聞道大笑之。不笑不足以爲道。此則世人聞方大笑之。不笑不足以爲方。藥則至賤不堪。功則神丹莫並。專治瘰癧破爛。連及胸腹。臭穢難聞。三五載十數載不愈者。藥到病起。用新出窰礦石灰一塊。滴水化開成粉。用生桐油調勻。乾溼得中。先以花椒葱煎湯。洗淨其瘡。以此塗之。不數日全愈。真奇事也。昔予道門一友。患瘰癧爛及胸腋。十數載不愈。一愚人傳此方。用之立應。後以治人。無不愈者。誠仙方也。

楊梅瘡證治

夫楊梅一證。以其腫突紅爛。狀如楊梅。故爾名之。西北人多天泡瘡。東南則名棉花瘡。蓋小兒患此者。實由於父母貽毒傳染而致也。然非尋常胎毒之可比。蓋青樓艷質。柳巷妖姬。每多患此。而少年意興。誤墮術中。由洩精之後。毒氣從精道乘虛直透命門。以灌衝脈。所以外而皮毛。內著筋骨。凡衝脈所到之處。無不受毒。此其爲毒最深最惡。設初起之時。治不如法。去毒未盡。而隨至敗壞殞生者有之矣。或遺毒兒女。以致生而不育者有之矣。世人見此惡毒。而不寒心知避者。愚亦甚

矣。

小兒亦有不因遺毒而成。蓋因偶傷溼熱。即或患此。亦不過在皮膚肌肉之間而已。治之者。能知清熱解毒除溼。自必全愈。無足慮也。

附案

予高友少年不慎。常發梅瘡。治不如法。以致毒氣內伏。外雖愈而內成結毒。每夏月則手心多現紫疹。如鵝掌風樣。及其生子。皆於月內二十七日必發此毒。初起陰囊之下紅疹數點。似火丹之狀。不數日。則延及通體。皮肉潰爛。形類火燒。晝夜啼號。諸藥莫救。延至半月。則精神竭脫而死。連生三子。有如一轍。友悔恨無及。力懇於予。予雖感其誠敬。而實不得其法。因靜思熟計。恍然有得。蓋此毒從洩精後。乘虛透入命門。直灌衝脈。已爲負嵎之虎矣。而且盤踞多年。根深蒂固。何可動搖。倘勦捕不得其法。反致蹂躪疆場。損我民物。古人云。多算勝少算不勝。苟非攻堅破壘。搗巢覆穴。不足以絕其根株。因自製一方。名竄毒。凡以鱗鯉甲頭尾胸脊以及四足。各用鱗甲數斤。取其穿山透穴。率領諸藥。直趨毒巢。則內而臟腑。外而經

絡。凡衝脈所行之地。無處不到。以之爲君。用刺蝟皮仍依上法。各取其刺。雖搜毒之功不如鱗鯉。而以毒攻毒。力則過之。故以爲臣。用蟬蛻蛇蛻。雖爲解毒清熱之需。實所以取其蛻脫之義。以之爲佐。以芩連梔蘗清其雷龍之火。用皂角上苓槐花領毒外出。不使久留精竅。以之爲使。後略加人參護其胃氣。使之宣行藥力。庶無潰亂壅遏之虞。以爲四路救應。製而服之。誠所謂得心應手。鍼芥相投。藥不盡而毒出。忽於左脚臁發一惡瘡。皮肉紫黑。痛苦異常。號呼牀第。一月方痊。嗣是手掌如故。所生子女。不特不發梅瘡而且毫無疥癬。可見病有萬殊。理無二致。予素未諳外科。而能拔茲社鼠城狐之毒。恃此理也。苟無其理。而欲邀天之幸。吾未能信。

小兒梅瘡。最爲惡候。倘發於一二月間。或半周之內。最難救治。以其毒稟先天。來路既遠。方藥難及。即日服數匙之藥。杯水車薪。終難有濟。昧者但以搽洗之法治之。適足以阻其出路。反致內攻不救。只當緩以圖之。庶能保全。先以胡麻丸修製精理。每日服之。二七之後。內毒將盡。方用點藥。不二日而瘡盡愈矣。此法至神至捷。第不可用之太早。恐內毒未盡也。

梅瘡點藥　杏仁一兩。熱湯泡去皮。以綿紙包之。木搥緩緩搥去油。此物極難得乾。必數十換紙。方得油淨。以成白粉爲度。謂之杏霜。每杏霜一錢。加入真輕粉八分。明雄一分。共研勻。先以槐蕊煎濃湯。將瘡洗淨。瘡溼則以藥乾搽之。瘡乾則以公猪膽汁調搽。三日愈矣。百發百中。此方不特治小兒梅瘡。凡外科下疳瘡。蠟燭瘡。藥到病除。久經效驗。

瘡疥雜方

凡半週一歲乳子。偶患瘡瘍。最忌外治。必先服解毒之藥數劑。然後再用外治。無不愈者。倘不先解毒而妄用搽敷。必致逼毒入內。反爲大害。愼之。　治疥神方。大風子肉三錢。輕粉明礬各五分。共爲末。聽用。先以臘猪油二兩。入麻黃五錢。同入一鍋熬之。以麻黃色黑爲度。濾去渣。退火冷定。調前末搽之。

治瘟痢白禿頭瘡方。用雞蛋十個。去殼攪勻。入小鍋香油溫成一餅。乘熱蓋兒頭上一時許。蛋冷取下。又將上面用油煎熱再覆頭上數次全愈。妙不可言。黃水頭瘡。卽肥瘡也。其瘡黃水流下。卽沿生漸至眉耳。不治則殺人。用黃連五錢。輕粉三

錢。共爲細末。麻油調成膏。塗粗碗內。須乾溼得中。將碗覆轉。下燒艾煙熏之。緩緩燒煙。熏至黑色爲度。放地上出火毒。次加冰片三分。研勻。香油調搽數次。卽愈。一切無名腫毒。諸般火丹。熱癤溼瘡。取陰地蚯蚓糞四兩。皮硝二兩。共研末。新汲井水濃調。厚敷患處。乾則易之。

治熱毒瘡疥。用生石膏生硫黃陳細茶各二錢。共爲末。以生猪油和藥。搗勻搽之。小兒諸般疳瘡。生於面上及遍身。爛成孔凹。儼如大人梅瘡。於蒸糯飯時。甑蓋四邊滴下氣水。以碗盛取。掃瘡上。數日卽愈。百方不效者。此法如神。治小兒熱瘡。用雞蛋五枚。煮熟去白。專取蛋黃。再以亂髮一團。如雞子大。同入鍋內。以炭火熬之。初甚黏。次則髮焦。乃有液出。久熬則液漸多。而黃髮盡化而成液。以黃髮盡爲度。取起冷定。取塗瘡上。卽以苦參末糝之。此神方也。

治小兒頭上軟癩。愈而復發。至難除根。用枳殼一個。刳去內中穰。磨令口平。以麵糊塗搽枳殼四圍。安貼於癩上。於一邊安一燈心。以通濃水。則膿自出。愈後枳殼自脫。更無痕跡。其枳殼鮮者更妙。卽臭橘子是也。樹名鐵籬芭。多刺而鞕。人家圍圃多植之。以禦宵人者。此方不獨治軟癩。凡久年頑瘡臁瘡不能收口。依法用之。

無不愈者。

湯火簡便方

凡湯火傷初起。卽以食鹽研末。用米醋調勻敷患處。頻塗不絕。暫時雖痛。却能護肉不壞。然後用藥敷貼。切不可用冷物塌。冷水洗。井涼藥敷貼。予每見以冷水冲擊者。使熱氣不得出。必致內攻而不救。愼之。

凡湯火傷。悶亂不省人事。急以蜂蜜調湯灌之。若至重者。急以煮過熟酒數十壺。入浴盆內。以患兒浸酒中。雖至重者不死。

女兒火燒手。且駭駭至掌。卽以醋一升餘浸之。出醋尙痛。少時痛止。不瘡不膿不疤痕。奇方也。

治湯火傷久經效驗者。凡湯火傷爛。皮已脫去。惟有鮮肉。或臭爛不堪。諸藥不治者。用猪毛一籃。以破鍋煅火煅紅。入猪毛在內煅之。少時猪毛消化而成黑液。起取冷定。略加大黃數錢。共研細末。再加冰片一分。研勻。香油菜油蠟燭油俱可調搽。至神至靈之方也。

凡遭火藥燒壞者。先以好酒洗淨。次用雞蛋黃熬油聽用。以大黃研末。雞蛋油調搽即愈。