

外科正宗

四

中國醫學大成第八集

外科類甲
外科叢刊之一

徐評

外科正宗

四

上海大東書局印行

徐評
外科正宗

卷七

流注論

夫流者行也。乃氣血之壯。自無停息之機。注者住也。因氣血之衰。是有凝滯之患。
楣案流注者其毒流走而竄注也此解似非其形漫腫無頭。皮色不變。毋論穴道。隨處可生。凡得此者。
多生於體虛之人。勤勞之輩。不慎調燮。夏秋露臥。縱意取涼。熱體當風。圖身快爽。
或中風邪。發散未盡。或慾後陰虛。外寒所侵。又或惱怒傷肝。鬱結傷脾。榮氣不從。
逆於肉裏。又或跌打損傷。瘀血凝滯。或產後惡露未盡。流宿經絡。皆成斯疾。既成

明	崇川	陳寶功	著
清	海寧	許辛木	訂
清	吳江	徐靈胎	評
鄞縣	曹炳章	校	

之後。當分表裏寒熱虛實。邪正新久而治之。初因風寒所中。表症發散未盡者。人參敗毒散散之。房慾之後。體虛寒氣外侵者。五積散加附子溫之。徐附子勞傷鬱怒。思慮傷脾而成者。歸脾湯加香附。青皮散之。跌撲傷損。瘀血凝滯而成者。復元活血湯逐之。產後惡露未盡。流注經絡而成者。木香流氣飲導之。此皆初起將成治法。一服至三四服皆可。外俱用琥珀膏敷貼。其中亦有可消者。十中五六。如服前藥不得內消者。法當大養氣血。徐曰尤當消痰培助脾胃。溫暖經絡。通行關節。木香流氣飲。十全大補湯。俱加熟附子。徐附子香附。徐附子培助根本。如此則未成者自消。已成者自潰。已潰者自斂。而終無殘敗破漏不斂之症。如有膿。宜急開之。患者又當慎起居戒七情。遠寒就溫。庶可保全。若誤用寒涼。剋伐內消等藥。終至不救者多矣。

徐曰。流注有虛痰實痰兩種。

又曰。流注一證。由風寒入膜所致。膜在皮中。旁通四達。初無定處。所以隨處作患。此真脈絡之病。故古人製大活絡丹以治之。其餘煎丸皆非正治。蘇州一小兒甫九歲。患流注。肩背腰脅十餘處。百端醫治無效。余曰。此惟大活絡丹能愈。服至三十餘丸。未破者消。已破者收口。更服補氣血之藥而愈。此條從洞溪醫案采入

流注看法

初起漫腫。皮色光亮。微熱微疼。筋骨不牽強者順。已成身體微熱。飲食有味。疼痛有時。腫生紅色者順。已潰膿稠而黃。腫消痛止。身體輕便。起坐如常者順。潰後內肉易生。膿水易止。精神易復。膿口易合者順。初起身體發熱。脈細而數。皮色微腫。痛徹筋骨者險。已成飲食少思。口乾作渴。身體疼痛。四肢沉重者險。已潰膿水清稀。腫仍不消。虛熱不退。疼痛不減者逆。潰後膿穢不止。肌膚瘦削。飲食不進。發熱皮粗者死。

徐曰。看法亦與諸症同。

流注治法

初起風寒表散未盡。而後復生腫痛者。再宜和解之。表邪已盡。而後復生流注者。宜清熱消腫。行散氣血。暴怒所傷。抑鬱所致。胸膈痞悶。中氣不舒。宜順氣寬中。腫硬已成。而不得內消者。宜和氣血。更兼補助脾胃。跌撲閃肭。瘀血凝滯爲患者。宜

調和氣血。通行經絡。寒邪所襲。筋攣骨痛。及徧身疼痛者。溫經絡。行氣血。產後敗血流注關節。致生腫痛者。當散敗瘀。養氣血。潰後膿水不止。而形衰食少者。宜滋氣血。峻補脾胃。

徐曰。亦與諸症同。

流注治驗

一男子風寒表散未盡。兩腮腫痛。微熱不退。用小柴胡湯加川芎、天花粉。徐曰。天花粉桔梗、連翹二服。熱頓退。又以二陳湯加桔梗、黃芩、牛蒡子、連翹四服。十日而安。徐曰。此乃風痰。非流注也。

一男子勞傷受寒。背生三腫。皮色不變。寒熱交作。至夜尤甚。先以萬靈丹洗浴發汗。寒熱頓退。惟腫硬不消。以琥珀膏敷之。三次。腫消痛止。漸平。

徐曰。此亦風痰所聚。

一婦人因怒脇下結腫。將近半年方痛。此肝氣鬱結之症。用木香流氣飲四服。其腫漸紅。蓋病久必欲作膿。不可內消。又以十全大補湯。徐曰。加木香、香附、青皮。

十餘服。腫漸高。又以本方加阜角刺。五服。其膿乃潰。清而且多。此元氣已經虧損所致。服人參養榮湯加熟附子。此味徐勒月餘。膿始稠少。本方倍參耆。歸朮。兩月而愈。

一男子元氣素虛。因暴怒。膊生腫塊。疼痛牽強。寒熱往來。飲食日減。以補中益氣湯。此五字徐勒加香附貝母十餘服。寒熱漸止。又服益氣養榮湯。月餘而腫潰。間服八珍湯。外用香附餅日灸二次。徐曰亦脾胃健而安。

一孀婦項間乳上各腫一塊。將近一年。漸大而痛。診之脈細數而無力。此思慮過傷之症。用歸脾湯加桔梗香附十餘服。腫漸高。以琥珀膏敷之。色漸紅。欲其作膿。以十全大補湯加桔梗貝母服之。半月膿熟。針之。頭腐膿清。虛熱復作。食少不睡。仍以歸脾湯間逍遙散服之。三月而愈。

一男子平素怯弱。腰後微腫一塊。飲食少思。口乾發熱。此腎傷也。治當朝以附桂八味丸。以上七字徐勒午用人參養榮湯。扶植根本為要。彼以口乾發熱為內有火。徐曰既有此症。欲投清涼之劑。解之。徐曰其死亦不以余辭不治。彼請內科治之。以退熱為主。正合其意。投藥三劑。腹痛作瀉。又以豬苓澤瀉厚朴。此三味徐勒批

曰大泄氣等藥投之。大熱發作。形體更變。復請余治。余曰。死期速矣。因虛致病。法當滋補。況腫在腰間。內腎受傷。口乾作渴。腎水枯竭。發熱不退。陰虛血少。今以有餘之藥。而療不足之症。豈有不死者哉。又半月而死。

徐曰。以上所載六案。皆係痰毒。並非流注之病。流注者。纏綿不已。或五或七。或九。愈者愈。發者發。變態萬端。若初生一兩箇。旋即消潰。皆非真流注也。

流注主治方

調和榮衛湯

調和榮衛湯。芎歸。獨活。甘草。耆大。茴。赤芍。白芷。併為藥。牛膝。紅花。兼陳皮。治流注初起。氣血凝聚。結腫不散。已成未成。並服。

川芎

當歸

陳皮

獨活

各一錢

赤芍

白芷

烏藥

大茴香

黃耆

名八分

甘草

炙

紅花

各五分

牛膝

下部加

水二茶鍾。煎八分。入酒一杯。量病上下服。

徐曰。通治之方。但少痰藥。

梔案大茴香一味徐勒。批曰。此味不解。

木香流氣飲

木香流氣飲。芎歸。蘇桔。青陳。烏澤。枳殼。檳。荅。防。枳實。膝。甘。半。芍。大腹皮。治流注癰癰。及鬱結爲腫。或血氣凝滯。遍身走注作痛。或心胸痞悶。咽噎不利。脇腹膨脹。嘔吐不食。上氣喘急。咳嗽痰盛。或四肢面目浮腫者。

川芎

當歸

紫蘇

桔梗

青皮

陳皮

烏藥

黃耆

枳實

茯苓

防風

半夏

白芍

錢各一

甘草

大腹皮

木香

檳榔

澤瀉

枳殼各五

牛膝下部加

水三茶鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。食遠服。

徐曰。此流注主方。藥味太雜。宜擇用。

梔案青皮。烏藥。大腹皮。木香。檳榔。徐園。

六鬱湯

六鬱湯內用川芎。半夏陳苓香附同。甘梔蒼朮砂仁等。濕痰流注卽時通。治諸鬱結腫。及左右二搭相串。濕痰流注等症。

川芎

半夏

茯苓

香附

陳皮

山梔各一錢

蒼朮

砂仁

甘草各五分

水二茶鍾。薑三片。煎服。

附子入物湯

附子入物湯芎。熟地人參朮茯苓。甘草肉桂當歸等。木香薑棗效如神。治房慾後陰虛受寒。致生腫塊。又或偏身腿脚疼痛。不能步履。

川芎

白芍

熟地

人參

白朮

茯苓

當歸

附子各一錢

肉桂五分

木香

甘草各三分

水二茶鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。食遠服。

徐曰。此通治虛寒之方。非流注之方。凡立方總當兼顧本症一二。不可全不照應。

瘡科流氣飲

瘡科流氣飲。芎歸。甘桔。蘇。檳。芍。桂。耆。防風。枳。殼。香。烏。藥。白。芷。人。參。厚。朴。隨。治。流。注。及。一。切。鬱。怒。凝。滯。氣。血。作。腫。疼。痛。或。胸。膈。痞。悶。或。風。寒。濕。毒。搏。於。經。絡。結。成。腫。塊。者。

當歸

甘草

紫蘇

人參

白芍

官桂

黃耆

防風

枳殼

烏藥

桔梗

厚朴

各七

檳榔

木香

川芎

白芷

各五

水二茶鍾煎八分。食前服。

徐曰。此亦流注通治之方。與前義同。

通經導滯湯

通經導滯湯。香附。赤芍。芎歸。熟地。隨。陳丹。枳。蘇。甘。草。節。牛膝。紅。花。獨。活。宜。

治婦人產後敗血流注經絡。結成腫塊疼痛者。

香附

赤芍

川芎

當歸

熟地

陳皮

紫蘇

牡丹皮

紅花

牛膝

枳殼

甘草節

獨活

各五分

水二茶鍾。煎八分。入酒一小杯。食前服。

徐曰。亦與前方相同。皆重出。

香附餅

香附餅用香附末。酒和調成。患上安。熨斗將來乘熱熨。兼重火力散風寒。治風寒流注。襲於經絡。結成腫痛。用香附爲末。酒和。量瘡大小做餅。覆患處。熱熨斗熨藥上。未成者自消。已成者自潰。風寒濕毒。宜薑汁作餅。

徐曰。外治良法。

醒脾湯

醒脾湯中參朮耆。黃連酸棗地骨皮。茯神遠志柴甘桔。木香香附龍眼宜。

治懷抱鬱結。思慮傷脾。致脾氣不行。逆於肉裏。乃生壅腫。疼痛不眠。心煩不安。神氣不清。

白朮

黃耆

人參

茯苓

神錢各一

酸棗仁

地骨皮

遠志

各七

柴胡

甘草

桔梗

黃連

木香

香

附各五

龍眼肉七箇

水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。不拘時服。

徐曰。即歸脾湯意。

調中大成湯

調中大成湯。朮附。苓歸。芍藥。藿參耆。砂仁。遠志。丹陳草。黑棗二枚。薑用煨。治流注潰後。膿水清稀。飲食減少。不能生肌收斂。

白朮

茯苓

歸身

白芍

陳皮

山藥

牡丹皮

黃耆

各一錢

人參二錢

藿香

砂仁

遠志

甘草各五分

附子

肉桂各八分

水二茶鍾。煨薑三片。棗二枚。煎八分。食遠服。

徐曰。此病後調養方。

黃耆六一湯

黃耆六一湯。參草三味同煎。功不小。流注膿多。併作湯。更兼煩躁。煎嘗好。

治流注潰後。膿水出多。口乾作渴。煩躁不寧。

黃耆六錢半生草一錢五分人參一錢

水二茶鍾。煎八分。食遠服。

散血葛根湯

散血葛根湯。半夏。芎防羌葛。芷升麻。甘草。細辛。併蘇葉。桔梗。香附。與紅花。

治跌撲損傷。瘀血凝滯。結成流注。身發寒熱者。

乾葛半夏夏川芎

防風

羌活升麻各八分桔梗各八分

白芷

甘草細辛蘇葉香附

紅花各六分

水二茶鍾。葱白三枚。薑三片。煎八分。不拘時服。
徐曰。如果敗血。當更加血分藥。此方尙未到。

先天大造丸

先天大造丸歸杞。朮地參苓菟蓂黃。烏茅巴骨故紙膝。車志青鹽棗二香。
治風寒濕毒襲於經絡。初起皮色不變。漫腫無頭。或陰虛外寒侵入。初起筋骨疼痛。日久遂腫。潰後膿水清稀。久而不愈。漸成漏症者。

紫河車

一具黃搗膏

熟地黃

四兩酒黃搗膏

歸身

茯苓

人參

拘杞

菟絲子

肉蓯蓉酒洗搗膏

黃精

白朮

何首烏

去皮用黑豆同蒸搗膏

川牛膝

骨碎補

微炒白

仙茅

受去赤汁蒸熟去皮搗膏各二兩

川巴戟

去骨

破故紙

炒

遠志

去心炒各一兩

木香

青鹽

各五錢

丁香

香三錢

黑棗肉

二兩

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服七十丸。空心溫酒送下。此方非獨流注成漏。

者可用。又補一切氣血虛羸。勞傷內損。及男婦久無嗣息。並有奇功。

徐曰。此通治補藥。病後調養法。

又曰。此虛人潰後補藥。初起禁用。

琥珀膏

琥珀膏中用大黃。南星。白芷。鬱金香。同蒜搗稠。敷患處。提毒之法。此爲夏。治一切皮色不變。漫腫無頭。氣血凝滯。結成流毒。毋論身體上下。年久新久。但未成膿者。

大黃二兩

鬱金

南星

白

芷各一兩

共爲細末。用大蒜頭去殼搗爛。入上藥再搗稠。入酒一二匙調勻。徧敷腫上。紙蓋。或即熱痛。或不痛。俱待藥乾便效。次日又有起泡。又有不起泡者。如有起。挑去泡中黃水。膏貼之自效。

徐曰。此弔毒法。亦有必當用之法。

又曰。此提毒之法。毒淺者自消。凡一切無頭腫痛之症俱效。楣案余所製消核膏。流注初起。貼之可消。

附錄大活絡丹

治一切中風癱瘓。痿痺痰厥。拘攣疼痛。癰疽流注。跌撲損傷。小兒驚癇。婦人停經。

當歸	白朮	黑附子	青皮	丁香	沉香	黃連	羌活	龜板	草烏	白花蛇
各一兩	各一兩	製			各二兩			炙		
歸	朮	子	皮	香	香	連	活	板	烏	蛇
兩	兩	製			兩			炙		
半	一				二					
血	防風	黃芩	骨碎補	乳香	細辛	熟地	官桂	麻黃	天麻	烏梢蛇
竭	二兩	蒸		去油					煨	
七錢	錢									
地龍	葛根	香附	白朮	僵蠶	赤芍	大黃	藿香	貫仲	全蠍	威靈仙
炙		酒炙	剉			蒸			去毒	
犀角	虎脛骨	元參	安息香	天南星	沒藥	木香	烏藥	炙草	首烏	兩頭尖
	炙		酒熬	薑製	去油				黑豆	俱酒
									水浸	

麝香

松

脂各五錢

牛黃

片腦各一錢半

人參三兩

右藥各研稱準。合和再研。蜜丸如桂圓核大。金箔爲衣。陳酒送下。須用白蠟爲匱收藏。以免泄氣。

徐曰。頑痰惡風。熱毒瘀血。入於經絡。非此不能透達。乃治肢體大症必備之藥。他書活絡丹祇用地龍。乳香等四五味。乃治藜蘘人實邪之方。不可用。流注應用方

十全大補湯

人參養榮湯

補中益氣湯

歸脾湯

益氣養榮湯

八珍湯俱見續傷門

萬靈丹見腫瘍門

小柴胡湯

二陳湯俱見癰瘍門

乳癰乳岩論

夫乳病者。乳房爲陽明胃經所司。乳頭爲厥陰肝經所屬。乳子之母。不能調養。以致胃汁濁而壅滯爲膿。又有憂鬱傷肝。肝氣滯而結腫。初起必煩渴嘔吐。寒熱交

作腫痛甚者。宜牛蒡子湯。主之。厚味飲食暴怒。肝火妄動。結腫者。宜橘葉散散之。又憂鬱傷肝。思慮傷脾。積想在心。所願不得。致經絡痞澀。聚結成核。初如豆。大漸若圍棋子。半年一年。二載三載。不疼不癢。漸漸而大。始生疼痛。痛則無解。日後腫如堆粟。或如覆碗。紫色氣穢。漸漸潰爛。深者如岩穴。凸者若泛蓮。疼痛連心。出血則臭。其時五臟俱衰。四大不救。名曰乳岩。凡犯此者。百人必百死。知覺若早。姑用清肝解鬱湯。或益氣養榮湯。患者再加清心靜養。無罣無礙。服藥調理。尚可苟延歲月。若中年已後。無夫之婦得此。其死尤速。故曰。夫乃婦之天也。惟初生核時。急用艾灸核頂。待次日起泡挑破。用拔針針入四分。此句徐勒批曰。必更用冰蠟散條插入核內。此四字糊紙封蓋。至十三日。其核自落。用玉紅膏生肌斂口。再當保養。庶不再發。又男子乳癰。與婦人微異。女損肝胃。男損肝腎。蓋怒火房慾過度。以致肝虛血燥。腎虛精怯。血脈不得上行。肝筋無以榮養。遂結腫痛。治當入珍湯加山梔、牡丹皮。入珍湯徐勒口乾作渴者。加減八味丸。八味丸徐勒腎氣素虛者。腎氣丸已潰作膿者。十全大補湯。懷孕之婦。乳疾曰內吹。因胎氣旺而上衝。致陽明乳房作腫。宜石膏散清之。此句徐勒批亦可消散。遲則遷延日久。將產出膿。乳汁亦從膿竅。

流出。其口難完。有此者純用補托生肌。其口亦易完矣。

徐曰。乳病有數種。種種各別。須知之。

又曰。乳腫不同。俱係陽明。結氣結痰。各有專方。一概瞎藥。皆有損無益也。

乳癰乳岩看法

初起紅赤腫痛。身微寒熱。無頭眩。無口乾。微疼者順。已成掀腫發熱。疼痛有時。一囊結腫。不侵別囊者輕。已潰膿黃而稠。腫消疼痛漸止。四邊作癢生肌者順。潰後膿水自止。腫痛自消。新肉易生。膿口易合者順。初起一乳通腫。木通不紅。寒熱心煩。嘔吐不食者逆。已成不熱不紅。堅硬如石。口乾不眠。胸痞食少者逆。已潰無膿。正頭腐爛。腫勢愈高。痛勢愈盛。流血者死。潰後肉色紫黑。痛苦連心。吮氣日深。形體日削者死。

徐曰。乳癰與乳岩。各有看法。此乃乳癰看法也。

乳癰乳岩治法

初起發熱惡寒。頭眩體倦。六脈浮數。邪在表。宜散之。發熱無寒。惡心嘔吐。口乾作渴。胸膈不利者。宜清之。憂鬱傷肝。思慮傷脾。結腫堅硬微痛者。宜疎肝行氣。已成掀腫發熱。疼痛有時。已欲作腫者。宜托裏消毒。膿已成而脹痛者。宜急開之。脾胃虛弱。宜更兼補托。潰而不斂。膿水清稀。腫不消。疼不止。宜大補氣血。結核不知疼痛。久而漸大。破後惟流污水。宜養血清肝。

徐曰。此亦是乳癰治法。乳岩無治法。不過使之遷延歲月。不致痛苦惡具而已。

乳癰乳岩治驗

一婦人因怒。左乳腫痛。寒熱交作。服人參敗毒散一劑。人參敗毒散徐勒批曰不切表症已退。又用牛蒡子湯二服。腫消漸安。

一婦人憂思過度。久鬱成癆。左乳結核如桃。徐曰此乳核半年似痛非痛。咳嗽生痰。身發潮熱。診之脈微數而無力。此真氣雖弱。而邪火尙未有餘。如用藥合理。尙堪調治。先用逍遙散加香附。貝母十餘服。而咳嗽漸止。寒熱間作。又用八珍湯加香附。牡丹皮。柴胡。遠志。十餘服。身熱去其八九。又服益氣養榮湯加青皮。木香。

兩月餘。胸膈得利。噯氣得舒。飲食漸進。肌膚漸澤。外腫以阿魏化瘡膏貼之。半年餘而消。

一婦人右乳疼痛。腫如覆碗。診之。脈數有力。此有餘症。欲作膿也。用托裏消毒散。數服而脹痛針之。出膿碗許。又用十全大補湯加香附。十餘服而安。

徐曰。此是乳癰實症。如乳子之時有此。乃是外吹也。

一婦人暴怒。左乳結腫疼痛。自服仙方活命飲二劑。疼痛稍止。結腫不消。仍服清涼敗毒之劑。清涼二字徐勒腫痛更作。形體日弱。診之。脈浮數而無力。此真氣虛而邪氣實也。非補不可。用益氣養榮湯四五服。其腫始高。寒熱亦退。又十餘服而膿潰。兼服十全大補湯。兩月而痊。此症非純補。豈能得愈。純補二字徐勒批

一男子年過五旬。因妻喪子不成立。憂鬱傷肝。左乳結腫。半年痛甚。作腐。肝脈弦數。先用小柴胡湯加青皮、山梔、遠志、貝母數服。而肝脈稍平。又用八珍湯。仍加前藥。十餘服。其腫漸腐爲膿。更服益氣養榮湯。庶保收斂。彼爲內醫所惑。謂鬱怒傷肝。肝經有火。不必用補。更服降火流氣寬中等劑。致食少便秘。發熱作渴。復請余治。肝脈復弦。口乾作渴。邪火內淫。飲食減少。脾土受傷。便秘發熱。陰血

竭而爲燥爲熱。已上俱內損症也。辭不治。後月餘果死。

徐曰。此卽男子乳岩。本屬難治。

一婦人左乳結核。三年方覺腫痛。診之。脈緊數而有力。此陽有餘而陰不足也。況結腫如石。皮肉紫色不澤。乃真乳岩症。辭不治。又一婦左乳結腫。或小或大。或軟或硬。俱不作痛。至半年餘。腫如覆碗。堅硬木痛。近乳頭纍纍徧生。疙瘡時痛時癢。診之。脈弦而數。腫色慘黑不澤。此氣血已死。亦辭不治。又一婦已潰。腫如泛蓮。流血不禁。亦辭之。後果俱死。

徐曰。此段所述。皆真乳岩。無愈理。

楣案余所製消核膏。凡乳核初起。無內症。貼之無不消者。但除根甚難耳。因循不治。變爲乳岩。則難治。乳岩潰後。宜貼陽和解凝膏。近見刻本經驗良方。載以鴉片灰作藥。亦有得愈者。附記于此。

又案全生集乳岩治法。初起用犀黃丸。每服三錢。酒送十服全愈。或以陽和湯加土貝五錢煎服。數日可消。倘誤以膏貼藥敷。楣案貼余消核膏無定主日漸腫大。內作一抽之痛。已覺遲治。倘皮色變異。難以挽回。勉以陽和膏日

服。或以犀黃丸日服。或二藥每日早晚輪服。服至自潰而痛者。外用大蟾六隻。分作三日。每日早晚。取蟾破腹連雜。蟾身刺孔。貼於患口。內服千金托裏散。方見癰癰門註中三日後。接服犀黃丸。可救十中三四。潰後不痛而癢極者。無一毫挽同。大忌開刀。開則翻花最慘。萬無一活。男女皆有此症。

乳癰主治方

牛蒡子湯

牛蒡子湯。瓜蒌仁。銀花。山梔。甘草。陳。黃芩。連翹。柴花粉。青皮。牛蒡。皂角針。
治乳癰結腫疼痛。毋論新久。但未成膿者。

陳皮

牛蒡子

山梔

金銀花

甘草

瓜蒌仁

黃芩

天花粉

連翹

角針各二錢

柴胡

青皮各五錢

水二茶鍾。煎八分。入酒一杯和勻。食遠服。

徐曰。此乳症通治方。

梔案瓜萇仁、青皮。徐圜。

橘葉散

橘葉散內用柴陳。川芎。山梔。青皮。芩。石膏。連翹。一錢等。橘葉。廿片。草五分。治婦人有孕。胎熱爲內吹。有兒喫乳。名外吹。致乳結成腫痛。寒熱交作。甚者惡心嘔吐。

柴胡

陳皮

川芎

山梔

青皮

石膏

黃芩

連翹
錢各一

甘草五分

橘葉
二十片

水二茶鍾煎八分。食遠服。

徐曰。亦通治方。

梔案橘葉。徐圜。

清肝解鬱湯

清肝解鬱湯。白芍。桔半。芎歸。貝志。陳。青皮。生地。併蘇葉。通草。香附。梔。茯神。治一切憂鬱氣滯。乳結腫硬。不疼不癢。久漸作疼。或胸膈不利。肢體倦怠。面色

萎黃。飲食減少。

陳皮

白芍

川芎

當歸

生地

半夏

香附各八分

青皮

遠志

茯神

貝母

蘇葉

桔梗各六分

甘草

山梔

木通各四分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

徐曰。與前法重。

鹿角散

鹿角散用角三寸。炭火燉之令微紅。研服三錢酒調下。乳癰新起散無蹤。治乳癰新起。結腫疼痛。憎寒發熱。但未成者俱效。鹿角尖三寸。用炭火燉稍紅。存性碾末。每服三錢。食後熱酒一茶鍾調服。甚者再用一服必消。

徐曰。此單方。

回乳四物湯

回乳四物湯四物。芎歸地芍不可缺。加上麥芽能散乳。自然腫脹消無跡。

治產婦無兒喫乳。致乳汁腫脹堅硬。疼痛難忍。

川芎

當歸

白芍

熟地各二錢

麥

芽二兩炒
爲粗末

水二茶鍾。煎八分。食遠服。用脚布束緊兩乳。以手按揉。其腫自然消散。甚者再用一服。

徐曰。此治乳脹消乳之法。宜再加豬苓、澤瀉、茯苓等以利其水。

楣案熟地徐改生地。麥芽一味徐圈。

灸乳腫妙方

灸乳腫痛方法。高惱怒勞傷氣不調。將碗覆於患上灸。諸般腫痛寂然消。治氣惱勞傷。或寒熱不調。乳內忽生腫痛。用碗一隻。內用粗燈草四根。十字排勻。碗內燈草頭各露寸許。再用平山粗紙裁成一寸五分闊紙條。用水溼紙貼蓋碗內燈草上。紙與碗口相齊。將碗覆於腫乳上。留燈草頭在外。將艾大圓於碗足底內點火灸之。艾盡再添。灸至碗口流出水氣。內痛覺止方住。甚者次日再灸一次。必消。

保安萬靈丹

見腫瘍門

治乳癰初起。發熱惡寒。頭眩肢體作痛者。

益氣養榮湯

見瘰癧門

治鬱怒傷肝。七情內結。以致乳中生核。不疼不癢。日久方痛。甚者胸膈不利。吞酸嘔吐。頭目昏眩。四肢倦怠。或已破潰。膿水清稀。不能收斂。飲食減少。口淡無味。自汗盜汗。肢體羸瘦者。

治乳便用方

治乳蒲公英最良。酒煎熱服。即眠牀。葱湯一盞催微汗。腫痛全消。身便康。

治乳癰初起。腫痛未成膿者。用蒲公英。春秋間開黃花似菊者。取連根帶葉二兩。搗爛。用好酒半斤。同煎數沸。存渣敷腫上。其酒熱服。被蓋睡一時許。再用連鬚葱白湯一茶鍾催之。得微汗而散。此方鄉村偏僻無藥之所。用之極妙。亦且簡便。

徐曰。此單方。

下乳天漿散

下乳天漿四物同。茯苓花粉麥門冬。王不留行併山甲。漏蘆甘草與木通。治乳母元氣虛弱。乳汁微少。或生兒日久乳少。

川芎

當歸

白芍

熟地

茯苓

天花粉

甘草

王不留行炒

麥門冬

漏蘆

穿山甲炒

通草各一錢

用健豬前蹄一隻煮爛。取汁二碗。同藥煎至碗半。二次頓熱。食遠服之。以熱木梳梳其乳房。其汁如泉湧而來。

徐曰。此催乳法。

楣案王不留行。漏蘆。穿山甲。通草。及健豬前蹄。徐俱圈。

木香餅

木香餅用生地黄。二物和勻。患上裝。氣滯腫疼。併閃胸。用之一熨。自無殃。治一切氣滯。結腫成核。或痛或閃胸。風寒所傷。

木香五錢

生地黄一兩

右木香爲末。同地黄和勻。量患處大小。作餅貼上。以熱熨斗熨之。堅硬木痛者。

間日熨之。

徐曰。外治良法。

乳癰應用方

十全大補湯

八珍湯見續門

逍遙散

冰蠟散

小柴胡湯見瘰癧門

托裏消毒散見腫門

阿魏化痞膏見痞疾門

附骨疽論附風

夫附骨疽者。乃陰寒入骨之病也。人之氣血壯實。雖遇寒冷而邪不入骨。凡人者。皆由體虛之人。夏秋露臥。寒溼內襲。或房慾之後。蓋覆單薄。寒氣乘虛入裏。遂成斯疾。初起則寒熱交作。稍似風邪。隨後臀腿筋骨作痛。不熱不紅。疼至徹骨。甚者曲伸不能轉側。日久陰變爲陽。寒化爲熱。熱甚而腐肉爲膿。此疽已成也。凡治此症。初起寒熱作痛時。便用五積散加牛膝、紅花。發汗散寒。通行經絡。或萬靈丹發汗亦可。次以大方風湯行經活血。滲溼補虛。又有生於尻臀部位。漫腫作疼者。曰徐

此非真。宜內托羌活湯。腿內近膝股漫腫木痛者。內托耆柴湯。腿外側者。內托酒煎湯。初起通用人參敗毒散。人參加木瓜牛膝蘇木紅花。虛者十全大補湯。加羌活防己牛膝。已成欲作膿者。附子八珍湯。膿成脹痛者。卽針之。膿稠而黃。體實者。十全大補湯。膿清色白。體虛者。保元大成湯。食少體倦者。香砂六君子湯。脾虛寒熱者。補中益氣湯。以此調理可也。又有風溼相乘之症。初起寒熱交作。次傳腿腫作痛。其形光亮微紅發熱。按之如泥。不卽起者。宜當歸拈痛湯。或茯苓佐經湯。間服萬靈丹和之。以上之症。皆由元氣不足中來。不可誤用損脾泄氣敗毒等藥。外禁寒涼等法。如誤用之。必致氣血冰凝。內肉瘀腐。日久化爲污水。敗膿流而不禁。終死。又有房慾勞傷。寒熱互變。氣血乖違。經脈橫解。受病日深。以成斯疾者。徐涇膿之其患大。腿漸漸腫如冬瓜。上過胯腹。下至足底。牽連漫腫。皮色不紅。日久潰膿。色白腥穢。腫仍不消。痛仍不減。元氣日衰。身體縮小。脣舌乾焦。二便枯秘。諸藥不效。飲食不進。終爲不治。又有鶴膝風。乃足三陰虧損之症。徐日一病初起寒熱交作時。亦宜五積散加牛膝紅花。或萬靈丹發汗。俱可。如汗後腫痛仍不消減。此陰寒深伏。以大大風湯溫暖經絡。重者兼灸膝眼二穴。敷以琥珀膏。亦可漸漸取效。

如以上之法俱不效者。終成痼疾。不必強藥消之。只宜先天大造丸。史國公藥酒。終年常服。亦可轉重就輕。徐圖步履也。

附骨疽看法

初起身微寒熱。飲食如常。結腫微紅。疼不附骨者順。已成舉動自便。結腫成囊。疼痛有時。膿易成者吉。已潰膿稠。腫消痛減。身體輕便。睡穩不熱者吉。潰後元氣易復。飲食易進。內肉易實。膿水易乾者吉。初起身發寒熱。漫腫色白。肢體牽強。疼痛附骨者險。已成舉動不便。通腿漫腫。不熱不紅。不作膿者險。已潰膿水清稀。氣穢腥臭。腫痛不消。形體日削者死。潰後脾胃虛弱。飲食無味。口渴不止。脣白皮枯者死。

徐曰。看法亦與諸症同。

附骨疽治法

初起發熱惡寒。身體拘急。腿脚腫痛。脈浮緊者。散之。已成腿脚腫痛。皮色不變。上

下通腫者。散寒溫經絡。寒熱作腫。色白光亮。按之如泥不起者。宜健脾滲溼。身體無熱惡寒。脈遲而濇。腿腫不熱者。養血溫經絡。暑中三陰。脈洪而數。腿脚掀腫。口乾便燥者。宜下之。已潰膿水清稀。飲食減少。形體消瘦者。補中健脾胃。潰後腫痛不減。膿水不止。虛熱不退者。溫中養氣血。愈後筋骨牽強。屈伸不便者。宜滋養氣血。通利關節。

徐曰。亦與諸症同法。

附骨疽治驗

一男子中寒。發散未盡。大腿腫痛。脈浮數而無力。此風寒未盡。內虛故也。用五積散去麻黃加牛膝二服。疼痛稍減。又用內托黃耆酒煎湯四服。全腫俱消。惟腿外側結腫一塊不退。此瘀血凝滯。欲作膿也。用托裏藥。候膿熟針之。更服十全大補湯而斂。

徐曰。此腿癰也。非骨疽。

一男子勞碌。遇寒每發腿痛。發則寒熱嘔吐。胸痞不食。此因氣惱飲食不節。脾胃

受傷。故不能運化。痰滯中脘。溼熱動而下注爲脚氣。投以開結導引丸二服。行去停痰。又用半夏佐經湯數服。嘔止膈利。更服附子六物湯數劑。消而不發。

徐曰。此寒溼也。

一老人年六旬。過慾腎虛。致筋攣痺縮。脚膝無力。不能步履。外貼追風逐溼膏。內服三因勝駿丸而愈。

一男子右腿腫痛兩月餘。余曰。膿成已久。何不開之。彼曰。二老醫同治。俱稱內消無膿。再請二老決之。俱曰無膿。但病者昏沈不醒。命在危篤。余強開之。出膿盆許。以獨參湯連進二服而甦。後以十全大補湯調理。百日外而安。

徐曰。此亦腿癰。

一男子房事後受陰寒。大腿無形作痛。至夜尤甚。不能步履。醫以散寒除溼消痰止痛藥治之。其疼益增。余診其脈。細澀而無力。此氣血不足。寒氣所乘之故。投以大防風湯二劑。疼痛頓減。又四劑而痊。

徐曰。此亦寒溼。

一男子暑月慾後當風睡臥。寒氣襲於左腿。遂致腫痛。寒熱交作。胸痞不食。以保

安萬靈丹。葱湯化服。洗浴發汗。以散骨髓寒毒。後以大防風湯去羌活。加紅花。破故紙。溫暖腎經。通行經絡。腫痛漸消。血脈漸和。又以三因勝駿丸間服。調理兩月而愈。

徐曰。此外感風寒也。

一監生慾後受寒。致成腿痛。余以暖腎氣。溫經絡。散寒邪藥治之。彼以爲緩。請內醫投表散之劑。外邪散而內虛。又以小柴胡湯等藥調理。小柴胡湯徐勒致虛熱發作。口燥咽乾。煩渴不已。又以知母石膏湯清其上。防風木瓜威靈仙等劑攻其下。此三字徐勒致病愈劇。仍請余治。其時患腿愈腫。其形縮小。云縮小必愈。又余斷以必死。此症原屬腎經受寒。非附子破故紙不能通達關節。非羌活防風牛膝不能通行閉滯。非人參白朮炙甘草不能使脾氣行達四肢。非川芎當歸白芍熟地紅花不能養血活血。凡病從虛而入者。先補其虛。後攻其病。以批上八字徐從邪何。今此症不加溫補而發散解肌。以正風寒有餘之法治之。不死何待。後果死。

徐曰。以上說症。皆非附骨疽。名實相背。

附骨疽主治方

五積散

五積芎歸朴桂心。蒼半麻陳芍茯苓。枳殼乾薑併桔梗。白芷甘草共薑行。
治風寒溼毒客於經絡。致筋攣骨痛。或腰脚酸疼。或偏身拘急。或發熱惡寒頭
痛者。

蒼 朮 二錢

陳 皮

桔 梗

川 芎

當 歸

白 芍 錢各一

麻 黃

枳 殼

桂 心

乾 薑

厚 朴 錢各六

白 芷

半 夏

甘 草

茯 苓 錢各四

水二茶鍾。薑三片。煎八分。不拘時服。頭痛惡寒者。加連鬚葱頭三根。蓋汗爲效。

下部加木瓜牛膝。

徐曰。此方雜亂不切。

內托羌活湯

內托羌活黃柏蒼。桂翹藁朮陳耆防。紅花甘草當歸尾。通治下體用此方。治尻臀患癰。堅硬腫痛。兩尺脈緊數。按之無力。

羌活

黃柏

防風

歸尾

藁本

肉桂各一錢

黃耆五錢

連翹

甘草

蒼朮

陳皮各六分

紅花五分

水酒各一茶鍾。煎八分。食前服。

徐曰。此下體通治之方。

當歸拈痛湯

當歸拈痛湯二朮。羌活防芩澤瀉芩。升麻茵陳草柏葛。二參知母各調勻。

治溼熱下注。腿脚生瘡赤腫作痛。或腰脚酸痛。或下肢偏身重痛。或下部頑麻作癢。或成血風。

羌活

當歸

防風

茵陳

蒼朮各一錢

苦參

升麻

白朮各七分

葛根

甘草

黃芩

知母

澤瀉

猪苓

人參各五分

黃柏三分

水二茶鍾。煎八分。食前服。

徐曰。此治溼毒之方。可擇而用之。

內托黃耆湯

內托黃耆湯。黃柏。當歸。生地。兼羌活。柴胡。肉桂。木瓜。同。連翹一味。還煎入。治溼熱。腿內近膝股患癰。或附骨癰。初起腫痛。此太陽厥陰之分也。脈細而弦。按之洪緩有力。

黃耆鹽水拌炒

當歸

柴胡

木瓜

連翹各一錢

羌活

肉桂

生地

黃柏各五分

水酒各一茶鍾。煎一半。空心服。

徐曰。與前法相近。

楣案。木瓜。羌活。肉桂。三味。徐圈。

內托酒煎湯

內托酒煎湯。桂耆。柴胡。連翹。黃柏。歸。甘草。升麻。牛蒡子。水酒同煎。治溼宜。治寒溼發於腿外側。少陽經分患癰。或附骨癰。堅硬漫腫作痛。或流至足陽明經作腫。

黃耆

當歸各二錢

柴胡五錢

連翹

肉桂

升麻

牛蒡子各一錢

黃柏

甘草各五分

水酒各一茶鍾。煎一半。食前服。

徐曰。意重前。

茯苓佐經湯

茯苓佐經湯。半夏。二朮。陳皮。草葛根。藿香。澤瀉。柴胡等。木瓜。厚朴。共薑行。治足少陽經爲四氣所乘。以致腰腿發熱疼痛。頭目昏眩。嘔吐不食。胸膈不利。心煩熱悶等症。

茯苓

陳皮

半夏

白朮

蒼朮各一錢

藿香

澤瀉

甘草

葛根

柴胡

厚朴

木瓜各五分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

徐曰。義重前方。

附子六物湯

附子六物湯。甘草。桂枝。白朮。防己。苓。加薑三片。水煎服。何慮太陰足腫疼。治四氣流注於足。太陰經骨節煩痛。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。手足或時浮腫。

附子

甘草各一錢

防己

白朮

茯苓各八分

桂枝五分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

徐曰。此治寒溼之方。

麻黃佐經湯

麻黃佐經湯。葛根。羌活。二防。蒼朮。苓。桂。辛。甘草。各減半。更加薑棗。效如神。治風寒暑溼流注。足太陽經。腰足攣痺。關節重痛。憎寒發熱。無汗惡寒。或自汗。

惡風頭痛等症。

麻黃

葛根

羌活

防風

蒼朮

茯苓

防己

桂心

細辛

甘草

防己

桂心

水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食前服。

徐曰。此亦治寒溼之方。義重前。

楣案蒼朮。桂心。細辛。徐圈。

小續命湯

小續命湯。芎白朮。防風。防己。人參。附子。麻黃。桂枝。芍。薑汁。甘草。兼黃芩。

治寒溼之氣。中於三陽。致身不熱。所患煩疼。或脚轉筋。或腫或不腫。或膝腿頑痺。或時緩縱不隨。或偏身百節攣痛。或小腸疝氣攻衝。

川芎

白朮

防風

人參

防己

附子

麻黃

桂心

黃芩

白芍

甘草

桂心

水二茶鍾。煎八分。入薑汁一匙和勻。食前服。又暑中三陰。所患必熱。去附子。減桂枝一半。

徐曰。此散風寒溼之總方。諸方之祖也。

大防風湯

大防風湯。朮附歸。參芍川芎杜仲耆。羌活牛膝併甘草。熟地還加薑引宜。治三陰之氣不足。風邪乘之。兩膝作痛。久則膝愈大而腿愈細。因名曰鶴膝風。乃敗症也。非此方不能治。又治附骨疽皮色不變。大腿通腫。疼痛無奈。及痢後脚痛。緩弱不能行。或腿膝腫痛。

人參二錢

防風

白朮

附子

當歸

白芍

川芎

杜仲

黃耆

羌活

牛膝

甘草

熟地錢各一

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

徐曰。與前方亦相近。

檳蘇散

檳蘇散內用木瓜。香附陳皮大腹加。羌活木香薑作引。何愁風溼脚酸麻。

檳榔

紫蘇

木瓜

香附

陳皮

大腹皮各一錢

木香三分

羌活五分

水二茶鍾。薑三片。葱白三莖。煎一鍾。空心服。

徐曰。此方專治脚氣。

楣案檳榔。紫蘇。木瓜。大腹皮。木香。徐圈。

獨活寄生湯

獨活寄生湯。茯苓。芎歸。防芍。細辛。參。秦。朮。杜仲。兼牛膝。熟地。甘草。并桂心。治肝腎虛弱。風溼內攻。足脛緩縱。或膝痺攣重。

獨活二錢

茯苓

川芎

當歸

防風

白芍

細辛

人參

桂心

杜仲

秦朮

牛膝

熟地

桑寄生真者各一錢

甘草五分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

徐曰。此亦公共之方。

又曰。此治下焦風寒。溼痰雜犯之方。雖藥味不純。而於義無害。楣案熟地徐改生地。

神應養真丹

神應養真丹。木瓜。當歸。羌芍。共天麻。川芎。熟地。菟絲子。蜜丸。酒服。效堪誇。治厥陰經爲四氣所襲。脚膝無力。左癱右瘓。半身不遂。手足頑麻。言語蹇澀。氣血凝滯。徧身疼痛者。

當歸

川芎

白芍

天麻

羌活

熟地搗膏

木瓜

菟絲子各等分

右爲細末。入地黃膏。加蜜丸。如桐子大。每服百丸。空心溫酒鹽湯任下。徐曰。此緩治之方。亦無甚妙義。

三因勝駿丸

三因勝駿乳麝香。歸麻二木。棗羌防。戟甘沒。薜櫚蒼蠍。故紙菴蓉熟地黃。治元氣不足。真氣虛弱。及諸虛被寒溼氣侵襲。手足拳攣。脚指連脚面拘急。走注疼痛。筋脈不伸。行步不隨。常服益真氣壯筋骨。黑髭鬚。滑皮膚。一切足弱鶴膝風症並治。

附子一枚要一兩以外者製

當歸

明天麻

牛膝

酸棗仁

熟地搗膏

防風各三兩

木瓜四兩

全蠍淨身一兩

麝香一錢

乳香

沒藥

木香

羌活

甘草炙各五錢

檳榔

萆薢

肉苁蓉

破故紙

巴戟去心

蒼朮各一兩

右爲細末。煉蜜丸。桐子大。每服七十九。空心淡鹽湯溫酒任下。病近者七日。年

深者半月見效。

徐曰。此緩治之法。作丸方不外此。

健步丸

健步丸中用川烏。苦參羌活澤柴胡。生甘滑石兼花粉。防己防風桂酒糊。治生平好飲燒酒。傷於脾肺。膝中無力。伸不能屈。屈不能伸。膝脊腿脚沈重。行步艱難者。

苦參酒洗

防己酒浸

羌活

柴胡

滑石炒

花粉

甘草各五分

防風

肉桂各三錢

澤瀉一兩五錢

川烏二錢

右爲細末。酒糊爲丸。如桐子大。每服三十丸。空心溫酒送下。

徐曰。義重前。

大腹子散

大腹子散。蘇木瓜。羌荊赤芍木通加。獨活桑皮併枳殼。甘草青皮效可誇。治風毒脚氣上攻。寒熱交作。肢節煩疼。心神壅悶。

大腹子

紫蘇

木瓜

羌活

荊芥

赤芍

木通

獨活

桑白皮

青皮各五

枳殼一錢

甘草二分

水一茶鍾。薑五片。葱白三莖。煎八分。空心服。

徐曰。此亦治脚氣之方。重前義。

楣案煎藥加薑。方書皆言幾片。而不言銖兩。蓋以此物非取諸藥肆。窮僻小戶。不皆有戩也。然薑有大小。片有厚薄。味又極辛。能掩諸藥。三片已覺其多。此方各藥銖兩甚輕。而薑至五片。是薑爲政矣。余願後之著方書者。酌改銖兩爲妥。不獨此方然也。

加味敗毒散

加味敗毒散。人參。羌獨前柴芎。茯苓。木瓜。枳桔。甘蒼朮。風溼方中此最靈。治足三陽經溼熱毒氣流注脚踝。掀赤腫痛。寒熱如瘧。自汗惡風。或無汗惡寒。或惡聞飲食者。

人參

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

桔梗

茯苓

枳殼

甘草

木瓜

蒼朮

各八分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。便秘加炒大黃。

徐曰。此治風溼之方。

千里健步散

千里健步散有功。細辛白芷共防風。草烏加上研爲末。瞬息長安路可通。

治遠行兩脚腫痛。若用之。輕便可行千里。甚妙。

細辛

防風

白芷

草烏

右等分爲末。糝在鞋底內。如底乾。卽以水微溼過。糝藥著脚。行走自不費力。再不作腫。

徐曰。此風溼外治之方。

雷火神鍼

雷火神鍼功最奇。風寒溼毒總相宜。紙筒丁麝和蘄艾。急用鍼之不可遲。

治風寒溼毒襲於經絡爲患。漫腫無頭。皮色不變。筋骨疼痛。起坐艱難。不得安臥者。

蘄艾三錢

丁香五分

麝香二分

丁麝研末。與蘄艾揉和。先將夾紙作筒。如指粗大。以艾藥灌入筒內。疊實。臨用

以蕭山紙七層平放患上。將筒點著一頭。隔紙捺實針之。待不痛。方起針。病甚者再針一次。七日後火瘡大發。自取功效矣。

徐曰。外治用處甚多。然藥味亦尙多。此未全。

追風逐溼膏

逐溼膏中羌獨活。川草二烏。辛芷朮。稀桂麻藤星夏歸。大黃甘草同熬入。治風寒暑溼所傷。致骨節疼痛。筋攣不能步履。或麻木溼痺等症。

稀荅草

麻黃

川烏

草烏

海風藤

半夏

南星

羌活

草麻子切碎

桂枝各三兩

獨活

細辛

當歸

白芷

蒼朮

大黃各一兩

以上藥各切片。用葱汁薑汁各二碗拌藥。先浸一宿。次日用香油半觔。藥湄案諸藥共有止半觔。半字必誤。先將藥入鍋內。慢火煎至葱薑二汁將乾不爆時。方下油與藥相煎。渣枯爲度。細絹濾清。每油一觔。配飛過炒丹十兩爲準。將前油入鍋內煎滾。至滴水成珠不散。方下黃丹。徐徐攪入。其膏已成。再下碾淨松香淨末一

觔四兩。同熬化。取下鍋來。將盆頓穩。再下乳香、木香、胡椒、輕粉各末二兩。白芥子細末四兩。漸入攪勻。傾入鉢內盛貯。用時熱湯頓化。綾緞攤貼。七日後。諸病可痊。百發百中。

徐曰。膏藥方勝此者甚多。不足取。

楣案油已煎至滴水成珠。而每油一觔。下炒丹十兩。則不待再熬。而已堅。不可攤。再下松香一觔四兩。及各藥末十二兩。其堅如石矣。此蓋著書者忘卻熬膏時分兩。隨筆填註也。

附骨疽應用方

保安萬靈丹

見腫瘍門

十全大補湯

見續傷門

小柴胡湯

見癰癤門

徐評
外科正宗

明 崇川 陳實功 著

清 海寧 許辛木 訂

清 吳江 徐靈胎 評

鄞縣 曹炳章 校

卷八

腸癰論

夫腸癰者。皆溼熱瘀血流入小腸而成也。又由來有三。男子暴急奔走。以致腸胃傳送不能舒利。敗血濁氣壅遏而成者。一也。婦人產後體虛多臥。未經起坐。又或坐草艱難。用力太過。育後失逐。敗瘀以致停積腸胃而成者。二也。飢飽勞傷。擔負重物。致傷脾胃。又或醉飽房勞。過傷精力。或生冷並進。以致氣血乖違。溼動痰生。腸胃痞塞。運化不通。氣血凝滯而成者。三也。總之初起外症發熱惡寒。脈芤而數。

皮毛錯縱。腹急漸腫。按之急痛。大便墜重。小便澀滯若淋。甚者臍突腹脹。轉側水聲。此等並見。則內癰已成也。初起未成時。小腹殷殷作痛。儼似奔豚。小便淋瀝者。當大黃湯下之。瘀血去盡自安。體虛脈細。不敢下者。活血散瘀湯和利之。已成腹中疼痛。脹滿不食。便淋刺痛者。薏苡仁湯主之。腹濡而痛。小便急脹。時時下膿者。毒未解也。用牡丹皮湯治之。如膿從臍出。腹脹不除。飲食減少。面白神勞。此皆氣血俱虛。宜入珍湯加牡丹皮、肉桂、黃耆、五味子。斂而補之。五味子徐勣如日久因循不識此症。誤作脹病治之。徐日庸醫以致毒攻內臟。腸胃受傷。或致陰器攻爛。腐齏黑斑。色敗無膿。每流污水。腹連陰痛。煩躁不止。身熱口乾。衾幃多臭。臥房難進者。俱爲不治。宜斟酌之。

腸癰看法

初起小腹疼痛。小便不利。六脈微緩。不作寒熱者。輕。已成小腹腫而堅硬。小便數而不利。六脈洪數者。險。已潰時時下膿。裏急後重。日夜無度。疼痛不減者。重。潰後膿腥臭穢。或流敗水濁瘀。虛熱更增。不食者死。

腸癰治法

初起小腹疼痛。或軟或硬。脈芤數者。瘀血也。宜下之。小腹作痛有塊。大便秘澀。小便如淋者。宜和而利之。已潰時時下膿。腹痛不止。飲食無味者。宜托而補之。產婦惡露不盡。流注小腸作痛。脈數者。宜和而導之。腹脹日久。臍高突出。轉側響如水聲。膿內蓄急。針之。徐曰實見如此可用針

腸癰治驗

一男子小腹脹痛。裏急後重。時時下膿。醫作痢疾治之愈重。醫字余診其脈芤而數。此小腸癰也。投以薏苡仁湯一服。下膿升許。即不後重。更用牡丹皮散六服而安。

一幼婦產後月餘。腹中漸痛。腫脹如蠱。內醫紛紛認爲蠱病。又月餘。沈重昏憤。已棄不治。適其家童稚患瘡。請余往視。偶言及此。余自請診之。人雖昏憤不甦。而脈細數有力。余曰。此內癰也。尙可治。其家不信。余曰。請視其腹。一決生死。何如。

視之則腫皮緊急光亮。臍下大熱。以上十字徐密點批曰確係內癰。治之

萬無一失。其家乃善。因命先備淨桶。用滾湯半桶。蓋之聽用。先以薏苡仁湯薏苡仁湯徐密點

氣薰蒸。此四字其膿下如湧泉。連湯與膿約共滿桶。病者即甦。更服八珍湯加

牡丹皮、五味子。調理月餘而安。

一婦人小腹腫痛。小便如淋。診之脈緩而芤。此得之行經時誤食生冷。又兼惱怒。

肝火急迫。瘀血而成內癰。膿尚未成也。以大黃湯下之。瘀血出盡而安。

一婦人小產。瘀血未盡。勞動太早。小腹內外腫痛。月餘大便祕燥。小便澀滯。口燥

咽乾。煩悶不睡。內醫調理。其病日重。余偶往診之。脈數實而有力。謂曰。此腸癰

已成也。用薏苡仁湯加大黃一服。下膿數碗。脹痛頓退。外腫堅硬不散。仍作掀

痛。此餘膿尙欲外泄也。投以十全大補湯三服。十全大補湯徐密點批曰膿脹痛而針之。

更服八珍湯加牡丹皮、五味子。五味子徐密點月餘而斂。

一婦人腹脹如鼓。臍突寸許。小水澀滯。轉側腹有水聲。此內膿已成。用針刺臍上

突頂。出膿盆許。服牡丹皮散五六劑。其膿漸少。朝以八味丸。暮以八珍湯加澤

瀉散。其膿漸少。朝以八味丸。暮以八珍湯加澤

瀉牡丹皮黃耆破故紙徐時服之月餘而愈

腸癰主治方

大黃湯

大黃湯中用朴硝。丹皮白芥共和調。加上桃仁水煎服。腸癰腹痛自然消。治腸癰小腹堅硬如掌而熱。按之則痛。肉色如故。或掀赤微腫。小便頻數。汗出憎寒。脈緊實而有力。日淺未成膿者。

大黃炒

朴硝各一錢

牡丹皮

白芥子

桃仁去皮尖各二錢

水二茶鍾。煎八分。食前或空心溫服。

徐曰。此實症主方。

活血散瘀湯

活血散瘀湯。赤芍。檳榔。蘇木。與芎歸。瓜蒌。枳殼。桃仁等。大黃加上粉丹皮。治產後惡露不盡。或經後瘀血作痛。或暴急奔走。或男子杖後瘀血流注。腸胃

作痛。漸成內癰。及腹痛大便燥者。

川芎

歸尾

赤芍

蘇木

牡丹皮

枳殼

瓜蒌仁去殼

桃仁去皮尖各一錢

檳榔六分

大黃酒炒二錢

水二茶鍾。煎八分。空心服。渣再煎服。

徐曰。即前方義。

牡丹皮散

丹皮散內用參歸。薏苡茯苓共黃耆。甘草白芷川芎芍。桃仁官桂木香宜。

人參

牡丹皮

白芍

茯苓

黃耆

薏苡仁

桃仁

白芷

當歸

川芎錢各一

甘草

官桂錢各五

木香三分

水二茶鍾。煎八分。食前服。

徐曰。卽前方義。

又曰。王不留行、冬瓜子、全瓜蒌、枳殼、穿山甲、廣膠、槐米、番木鱉、阜莢、蠟子。俱可參用。

七賢散

七賢散內淮山藥、黃肉、丹皮、熟地黃、茯苓、參耆合成七。薑棗同煎理內傷。治腸癰潰後疼痛。淋瀝不已。或精神減少。飲食無味。面色萎黃。四肢無力。自汗盜汗。睡臥不寧。

茯苓

山藥

牡丹皮

山茱萸

熟地

人參

錢各一

黃耆二錢

水二茶鍾。煨薑三片。大棗二枚。煎八分。食前服。

徐曰。不切病。

失笑散

失笑散用五靈脂。加上蒲黃一味。宜醋調末服。或丸服。瘀血諸痛。均堪醫。治產後心腹絞痛欲死。或血迷心竅。不省人事。及尋常腹內瘀血。或積血作痛。

又婦人血氣爲病作痛之聖藥也。及治男子諸疝疼痛不已者。

五靈脂

蒲黃俱妙分

右爲細末。每服三錢。醋一合。調稠熬數滾。入水一茶鍾。煎七分。食前連藥服。如用醋爲丸。每服二錢。淡醋湯下。治前症亦妙。

徐曰。此非治腸癰之方。乃治婦人瘀血作痛之方也。

又曰。此消瘀血之要方。

榴案此二味徐俱圈。

排膿散

排膿散內用黃耆。川芎。山甲與當歸。銀花。白芷。瓜蒌等。防風加上效神奇。

治腸癰小腹脹痛。脈滑數。裏急後重。時時下膿。

黃耆

當歸

金銀花

白芷

穿山甲

防風

川芎

瓜蒌仁

錢各一

水二茶鍾。煎八分。食前服。或爲末。每服二三錢。食遠蜜湯調下。亦可。

徐曰。此通利膿水之法。

瓜蒌子湯

瓜蒌子湯。薏苡仁。桃仁。丹皮。相共行。產後惡露併瘀血。腸胃停滯。用此清。治產後惡露不盡。或經後瘀血停滯。腸胃作痛。縱非是癰。服之亦效。

薏苡仁 四錢

桃 仁

牡丹皮

瓜蒌仁 各一錢

水二鍾。煎八分。食前併空心服。

徐曰。後有薏苡仁湯。不必存此。

薏苡仁湯

薏苡仁湯。功力奇。腸癰腹痛。總堪醫。桃仁。加上瓜蒌子。更兼白芍。與丹皮。治腸癰腹中疼痛。或脹滿不食。小便澀滯。婦人產後多有此病。縱非癰。服之尤效。

薏苡仁

瓜蒌仁 各三錢

牡丹皮

桃 仁 各二錢
去皮尖

白 芍 一錢

水二茶鍾。煎八分。空心服。

徐曰。此腸癰主方。與前方相同。

腸癰應用方

八珍湯

十全大補湯

八味丸

俱見續傷門

臟毒論

夫臟毒者。醇酒厚味。勤勞辛苦。蘊毒流注肛門。結成腫塊。其病有內外之別。虛實之殊。發於外者。多實多熱。脈數有力。肛門突腫。大便秘結。肚腹不寬。小水不利。甚者肛門肉泛如箍。孔頭緊閉。此爲外發。屬陽易治。宜四順清涼飲。內消沃雪湯。通利大小二便。痛甚者。珍珠散。人中白散。搽之。膿脹痛者。針之。發於內者。屬陰。虛。溼。熱。滲入肛門。內臟結腫。刺痛如錐。小便淋瀝。大便虛秘。咳嗽生痰。脈數虛細。寒熱往來。遇夜尤甚。此爲內發。屬陰難治。宜四物湯加黃柏。知母。天花粉。甘草。兼以六味地黃丸。調治。候內臟膿出則安。又有生平情性暴急。縱食膏粱。或兼補術。蘊毒結於臟腑。火熱流注肛門。結而爲腫。其患痛連小腹。肛門墜腫。二便乖違。或瀉或秘。肛門內蝕。串爛經絡。汙水流通大孔。飲食不食。作渴之甚。犯此未有見其生者。又有虛勞久嗽。痰火結腫。肛門如粟者。破必成漏。瀝盡氣血必亡。徐曰亦非不治之症調養氣血

無此二症乃內傷之故。非藥可療。不必強治也。

臟毒看法

初起腫痛。紅色光亮。疼痛有時。肛門不墜。便和者順。已成掀赤腫痛。發熱不渴。小便不數。展轉自便者順。已潰膿稠。色鮮不臭。掀腫漸消。疼痛漸減。能食者順。潰後膿水漸止。新肉易生。不疼多癢。瘡口易乾者順。初起堅硬漫腫。內臟閉痛。小便頻數。大便秘結者險。已成疼痛日甚。腫連小腹。肛門閉緊。下氣不通者重。已潰臭水淋漓。疼痛不減。腫仍不消。身熱昏焦者逆。

徐曰。看法同別症。

臟毒治法

初起寒熱交作。大便墜痛。脈浮數者。宜用輕劑解散。已成內熱口乾。大便秘結。脈沈實而有力者。當下之。肛門腫痛。常欲便而下墜作痛者。導溼熱。兼瀉邪火。肛門掀腫疼痛。小便澀滯。小腹急脹者。清肝利小水。出膿腥臭。疼痛不減。身熱者。養血

健脾胃。更兼滲溼。膿水清稀。脾胃虛弱。不能收斂者。滋腎氣。急補脾胃。

徐曰。亦同別症。

臟毒治驗

一男子肛門腫突紅紫。痛甚。投以內消沃雪湯二服。大便數次。疼痛稍減。腫突處以珍珠散清蜜調搽。早晚二次。其腫漸消。更以涼血地黃湯服之全愈。

徐曰。此大腸偶成熱火之輕症。

一婦人產後用力太過。肛門墜腫。疼痛之甚。先以枳殼、紫蘇煎湯熏洗。後以珍珠散加冰片、猪脊髓調搽。內以四物湯加升麻、蒼朮、丹皮、枳殼服之而消。

徐曰。產後脫肛與肛癰不同治。

一男子夏月好飲火酒。熱毒流入肛門。結腫堅硬。形色紫黑。墜痛便秘。用黃連解毒湯加大黃、枳殼二劑。便通。疼痛稍止。又用四物湯合前湯數劑。其腫漸消。惟存粟大堅腫不散。以臟連丸服至月餘而愈。

一婦人肛門腫突堅硬痛極。用攻利解毒藥。俱不應。以神燈照法照之。早晚二次。

其疼方減。以蟾酥錠磨濃塗之。堅硬漸腐爲膿。仍服內消沃雪湯二劑。便通。疼苦減其大半。內服四物湯加黃柏、知母、厚朴、蒼朮。外以珍珠散加冰片、豬髓調搽。月餘而平。

一男子素有內痔。便血常欲脫肛。一朝肛門墜重不收。腫痛突起。光亮紫色。此溼熱流注結腫。故難收入。內服黃連除溼湯一劑。外用珍珠散加冰片、清蜜調塗。腫痛漸減。後以補中益氣湯加生地、黃連、蒼朮、花粉、丹皮。服至數劑。漸平。

徐曰。果係內痔。愈則復發。不除根也。

一監生素性急暴。每縱膏粱。積毒流於大腸。內如針刺。外肛不腫。常欲後重。便則祕結。診之。脈空數而無力。此真氣不足。邪火有餘。內臟虧損症也。辭以不治。請他醫用藥。月餘。肛門內腐。敗水無禁。復請余視。余曰。決不可療。脈來虛數。邪勝正也。手掌不澤。脾氣敗也。至夜發熱。陰虛火旺。敗水無禁。幽門已壞。面若塗脂。此四字徐勣批。元氣走散。鼻如煙煤。肺氣將絕。口乾舌燥。腎水已竭。豈有不死之理。他醫仍強用解毒滋陰藥。不效而死。

徐曰。此症從元氣虛竭而生。乃外科之內症。治法變化無窮。果能得法。尚可

得生。尋常醫者非所能也。

臟毒主治方

黃連除溼湯

黃連除溼湯。芩朴。蒼朮。芎歸。枳殼。翹。防風。甘草。硝黃等。臟毒懸癰。此可消。治臟毒初起。溼熱流注。肛門結腫疼痛。小水不利。大便秘結。身熱口乾。脈數有力。或裏急後重。

黃連

黃芩

川芎

當歸

防風

蒼朮

厚朴

枳殼

連翹

各一錢

甘草

大黃

朴硝

各二錢

水二茶鍾。煎八分。空心服。

徐曰。此臟毒之主方。惟大黃。朴硝。不宜輕用。

涼血地黃湯

涼血地黃湯。連芎。生地。芎歸。朮。地榆。茯苓。花粉。山梔草。加上人參。可治虛。

治臟毒已成未成。或腫或不腫。肛門疼痛。大便墜重。或泄或秘。常時便血。頭暈眼花。腰膝無力者。

川芎

當歸

白芍

生地

白朮

茯苓各一錢

黃連

地榆

人參

山梔

天花粉

甘草各五分

水二茶鍾。煎八分。食前服。

徐曰。此方頗穩。

又曰。此治虛症爲宜。然不甚切。

楣案徐於此方後另疏枳殼、槐米、大黃、槐角、土貝、秦艽、桃仁、白芷、瓜子九味。蓋如前牡丹皮散例。以備參用者。

內托黃耆散

內托黃耆散。芍歸。川芎。山甲。共陳皮。角針。白朮。檳榔等。臟毒將成。此藥醫。治臟毒已成。紅色光亮。已欲作膿。不必內消。宜服此藥潰膿。

川芎

當歸

陳皮

白朮

黃耆

白芍

穿山甲

皂角針各一

檳榔三分

水二茶鍾。煎八分。食前服。

徐曰。此托膿之方。

楣案穿山甲。皂角針。檳榔。徐圈。

黃連解毒湯見腫瘍門

治平生好飲。縱食膏粱。積熱流入大腸。致肛門結成腫痛。疼刺如鑽。堅硬如石。

金液戊土膏見脫疽門

治口腹習於奢侈。情性慣於急暴。烈火猖狂。思不如願。水已枯竭。火不發泄。旺而又鬱。鬱而又旺。以致肛門結腫。毒攻內臟。痛如芒刺。熾如火炕。臭水淋漓。生命難望。宜服此藥。

珍珠散見下疳門

治肛門腫。泛如箍。紅紫急脹。堅硬痛極。本方加冰片。研極細。豬脊髓調塗。早晚日用二吹。

臟毒應用方

六味地黃丸見肺癰門

四順清涼飲見湯火燒門

內消沃雪湯

神燈照法

蟾酥錠俱見腫瘍門

四物湯

補中益氣湯俱見瘡瘍門

人中白散

珍珠散俱見下疳門

臟連丸見痔瘡門

痔瘡論

夫痔者。乃素積溼熱。過食炙博。或因久坐而血脈下行。又因七情而過傷生冷。以及擔輕負重。竭力遠行。氣血縱橫。經絡交錯。又或酒色過度。腸胃受傷。以致濁氣瘀血。流注肛門。俱能發痔。不論老幼男婦皆然。有生於肛門之內。有突於肛外之旁。大者若蓮花。蜂巢。翻花。鷄冠。菱角。珊瑚等狀。小者如櫻珠。鼠尾。牛奶。鷄心。核桃。蜆肉之形。毒深者。其形異而頑惡。毒淺者。其形正而平常。久則崩潰成漏。新則墜重刺疼。甚者糞從孔出。血從竅流。氣血日有所傷。形容漸有所削。若不早治。終至傷人。尋常多用針刀砭礪線壘等治法。此句徐勒批曰誤治患者受之苦楚。聞此

因循都不醫治。予療此症。藥味數品。從火煅煉。性卽純和。百試百驗。凡療內痔者。先用通利藥。蕩滌臟腑。然後用喚痔散。塗入肛門。徐曰此亦良法但亦須善用非親傳恐無大效片時內痔自然泛出。卽用葱湯洗淨。搽枯痔散。早午晚每日三次。每次溫湯洗淨。搽藥。輕者七日。重者十一日。其痔自然枯黑乾硬。痔邊裂縫流膿。停止枯藥。換用起痔湯。日洗一次。待痔落之後。換搽生肌散。或鳳雛膏等藥。生肌斂口。虛者兼服補藥。其口半月可完。外痔用消毒散煎洗。隨用枯痔散照內痔搽法用之。完口百日入房乃吉。至於穿腸久漏者。此則另有二方。亦具於後。患者服之。不用針刀挂線。效如拾芥。

痔瘡看法

初起形如牛奶。不腫不紅。無掀無痛。行走不覺者輕。已成腫痛有時。遇勞而發。或軟或硬。頭出黃水者輕。久如鷄冠、蜂窠、蓮花、翻花等狀。流膿出血不止者重。久漏竅通臀腿。膿水淋漓。疼痛不已。糞從孔出者逆。

痔瘡治法

初起及已成。漸漸大。而便澀作痛者。宜潤燥及滋陰。肛門下墜。大便出血。時或疼痛。堅硬者。宜清火滲溼。紫色疼痛。大便虛秘。兼作癢者。涼血祛風。疎利溼熱。腫痛堅硬。後重墜刺。便出難者。外宜熏洗。內當宣利。內痔出血。登廁脫肛。而難上收者。當健脾升舉中氣。便前便後下血。面色萎黃。心忪耳鳴者。宜養血健脾。諸痔欲斷其根。必須枯藥。四字徐圖欲完其竅。必杜房勞。乃愈。

痔瘡治驗

一男子患痔六年。每遇酒色勞役。痔則發腫。堅硬疼痛。十餘日方得稍可。彼欲斷其根。以枯痔散敷上。至七日外。其痔漸黑。裂縫。至十六日。痔枯脫落。孔若雞心。以生肌散逐日用之。內服養血健脾藥而愈。

一男子患痔。掀腫作痛。大便結燥。脈數有力。投以內疏黃連湯二服。便行痛止。又服四物湯加芩連枳殼花粉。數劑而腫消。更服臟連丸一料。而不復發。

徐曰。比輕病也。

一男子患痔。遇勞則發。腫作痛。外以枳殼湯熏洗。內服防風秦艽湯數劑。腫痛俱

減。令彼煎湯常洗。每日五六次。又與六味地黃丸加黃柏、知母。服之不發。

一男子好飲多慾。內痔虛墜下血。服四物湯加芩、連、升、麻、葛根。數服虛墜乃止。又服當歸郁李仁湯二劑。痔腫亦消。更服臟連丸月餘。便血亦止。兼節酒色。遂不發。大抵醉飽入房。經脈橫解。精氣一泄。脈絡必虛。酒食之毒。乘虛流結。或淫極強固精氣。以致敗精濁血。遂傳大腸。又或飲食厚味。燥溼流注。俱成斯疾。所受病者。燥氣也。爲病者。溼氣也。初宜瀉火和血。潤燥疏風。久宜養血滋陰。健脾滲溼。自愈。若不節酒色。不慎起居。不戒口味。破必成漏。久則穿腸串臀。穢從孔出。臭水淋漓。雖不傷生。每苦瘀汗。可爲歎息。

一男子患痔十餘年。頭已穿潰。未至通腸。每發疼苦。以三品一條槍插至七日。此字徐勣批曰此法不如杜痔爲妥。痔變黑色。瘡邊漸漸裂縫。至十五日脫落。以鳳雛膏擦至半月口斂而平。

一男子怯弱。內痔便血。面色萎黃。自服涼血止血藥不應。診之脾脈虛而無力。此中氣不足。不能統血。服補中益氣湯十餘劑。精神頓倍。便血亦止。又以加味四君子湯。兼前湯間服月餘。不發。大抵此症所致之由不同。當究其因治之。如元

氣有餘。形黑氣盛。先糞而後紫血。更兼脈實有力者。此屬有餘。用涼血止血藥。自效。至若形體瘦弱。面色萎黃。先鮮血而後糞。更兼脈虛無力者。此屬不足。豈可反用涼藥止之。致傷脾胃。此人脈症。若不溫中健脾。升舉中氣。則其血不得歸原。安能取效。

痔瘡主治方

防風秦芄湯

防風秦芄湯。芍歸榆芎赤苓兼山梔。地黃槐角檳翹枳。白芷甘草蒼朮宜。治痔瘡不論新久。肛門便血。墜重作疼者。

防風

秦芄

當歸

川芎

生地

白芍

赤茯苓

連翹

各一錢

檳榔

甘草

梔子

地榆

枳殼

槐角

白芷

蒼朮

各六分

水二茶鍾。煎八分。食前服。便秘者。加大黃二錢。

徐曰。服藥不外此方。但久痔非煎藥所能治。
榴案地榆、枳殼、槐角、徐園。

提肛散

提肛散內用芎歸。人參白朮生黃耆。升柴芩連併白芷。還有甘草和陳皮。
治氣虛肛門下墜。及脫肛便血。脾胃虛弱等症。

川芎

歸身

白朮

人參

黃耆

陳皮

甘草各一錢

升麻

柴胡

黃芩

黃連

白芷各五錢

水二茶鍾。煎八分。食遠服。

徐曰。亦有用處。

加味四君子湯

加味四君子湯。參苓甘草黃耆炙。薏豆還同薑棗煎。痔漏脾虛均可啜。

治痔瘡痔漏。下血不止。面色萎黃。心忪耳鳴。脚弱氣乏。及一切脾虛口淡。食不知味。又治中氣虛不能攝血。致便血不禁者。

人參

白朮

茯苓

白朮豆

黃耆炙

甘草炙各一錢

水二茶鍾。薑一片。棗二枚。煎八分。食前服。

徐曰。不切病。

當歸郁李湯

當歸郁李湯。生地。大黃。澤瀉。共秦芄。麻仁。枳實。併蒼朮。阜角。相兼功最饒。

治痔。大便結燥。大腸下墜出血。苦痛不能忍者。

當歸

郁李仁

澤瀉

生地

大黃

枳實

蒼朮

秦芄各一錢

火麻仁

研一錢五分

阜角一錢

水二茶鍾。煎八分。空心服。

芎歸湯

芎歸湯。內川芎。歸。失血虛羸服最宜。婦人產後虛煩熱。眩暈盜汗。並堪施。

治便血。或失血過多。兼婦人產後血虛煩熱。頭眩昏暈盜汗等症。

川芎三錢

當歸

酒拌五錢

水二茶鍾煎八分。食前服。自汗手足冷者。加人參二錢。

徐曰。不切病。

三黃二地湯

三黃二地湯。蒼朮。厚朴。陳皮。白朮。歸人參。防風。兼甘草。地榆。澤瀉。共烏梅。

生地

熟地

各二錢半

蒼朮

厚朴

陳皮

黃連

黃柏

黃芩

歸身

白朮

人參各一錢

甘草

防風

澤瀉

地榆各六分

烏梅二錢

水二茶鍾煎八分。食前服。

徐曰。此方乃痔血通治之藥。荷葉蒂。粟殼亦可採入。

楣案黃連。地榆。烏梅。徐園。

粟殼散

粟殼散內用歸耆。二地升蒼黃柏宜。參苓厚朴陳皮草。荷蒂秦艽地骨皮。治諸痔作疼。及腸風下血。諸藥不止者。

粟殼

溫湯泡去內穢去蒂切絲蜜水拌炒二錢

當歸

陳皮

秦艽

黃耆

生地

熟地各一錢

黃柏

黃芩

人參

蒼朮

厚朴

升麻各六分

荷葉蒂七箇

甘草五分

地骨皮二錢

水二茶鍾。煎八分。食前服。或為細末。每服二錢。空心溫酒調服。

徐曰。與前相同。

洗痔枳殼湯

洗痔枳殼湯。枳殼。癩蝦蟆草二味足。用此煎湯洗痔瘡。無論新久俱消縮。

治痔瘡腫痛。肛門下墜。無論新久。洗之腫自消。

枳殼二兩

癩蝦蟆草一名荔枝草。四季常有。面青背白。麻紋纍纍者是。二兩。

河水三大碗。同上二味煎數滾。先熏後洗。良久再將湯煎熱熏洗。甚者三次即

消。洗淨當搽後藥。

徐曰外治之法。

五倍子散

五倍子散。蝦蟆草。加上輕粉。冰片好。痔瘡腫痛及墜疼。用之糝上。跡如掃。治諸痔舉發堅硬。疼痛難忍。或臟毒肛門泛出。腫硬不收。五倍子大者。敲一小孔。用陰乾。蝦蟆草揉碎。填塞五倍子內。用紙塞孔。濕紙包煨。片時許取出。待冷去紙。碾爲細末。每一錢。加輕粉三錢。冰片五釐。共研極細。待前湯洗後。用此乾搽痔上。卽睡勿動。其腫痛卽除。凡外痔用二方搽洗。亦可除根。永不再發。極效極效。

徐曰亦外治之法。

田螺水

田螺水用田螺一。冰片加之水自生。脫肛諸痔久難愈。將來一掃效如神。治痔瘡堅硬作痛。及脫肛腫泛不收者。以大田螺一枚。用大冰片五釐研末。用尖刀挑起螺蓋。將冰片入內。平放片時。待螺滲出漿水。用雞翎蘸搽患上。勤勤

掃之。其腫痛自然消散。

徐曰。熱痔用此外治。

喚痔散

喚痔散。煨刺蝟皮。草烏鹽麝搗如泥。枯礬冰片同研末。津唾調搽痔出齊。

凡醫內痔不得出。用此藥填入肛門。其痔即出。

草烏生用一錢

刺蝟皮一錢燒存性

枯礬五錢

食鹽炒三錢

麝香五分

冰片二分

右碾細末。先用溫湯洗淨肛門。隨用津唾調藥三錢。填入肛門。片時痔即當出。去藥上護痔膏。

徐曰。以後四方逆用。

護痔膏

護痔膏中用白芨。黃連石膏共研末。冰麝還須加一分。雞蛋清調功最烈。用喚痔散痔出之後。先用此藥圍護四邊好肉。此六字徐圖

白芨

石膏

黃連各二錢

冰片

麝香各一分

共研細末。雞蛋清調成膏。護在四邊好肉。方上枯痔散。

枯痔散

枯痔散內用白礬。蟾酥輕粉白砒參。再加童子天靈蓋。枯痔方中效不凡。凡痔瘡泛出。即用此藥塗之。年淺者五七日。年深者八九日。待痔乾黑後。不用此藥。每日用落痔湯洗之。

白礬二兩

蟾酥二錢

輕粉四錢

砒

霜一兩徐曰金頂砒爲妙

天靈蓋

此物徐批曰此藥傷天和不可用去之換他藥

共研極細末。入小新鐵鍋內。上用粗瓷碗密蓋。鹽泥封固。炭火煨至二炷京香。待冷取開。將藥研末。搽痔上。每日辰午申三時。用溫湯洗淨。上藥三次。上至七八日。其痔枯黑堅硬。住藥裂縫。待其自落。換洗起痔湯。

起痔湯

徐曰。天靈蓋斷不可用。其方甚多。選用可也。

起痔湯中。芩柏連。大黃。荆芥。苦參。兼防風。甘草。山梔等。朴硝。槐角共相煎。

治諸痔上枯藥之後。黑色堅硬裂縫。宜此藥洗。

黃連

黃柏

黃芩

大黃

防風

荊芥

梔子

槐角

苦參

甘草各一兩

朴硝五錢

已上藥分作三次。用水煎洗。待痔落之後。換搽生肌散。

生肌散

生肌散乳香沒藥。海螵蛸龍骨黃丹。赤石脂輕粉熊膽。珍珠麝香冰片須參。

治痔上枯藥之後脫落。孔竅不收者。宜用此藥。

乳香

沒藥各一兩

海螵蛸水煑五錢

黃丹飛炒四錢

赤石脂煨七錢

龍骨煨四錢

血竭三錢

熊膽四錢

輕粉五錢

冰片一錢

麝香八錢

珍珠煨二錢

共研極細末。瓷罐收貯。早晚日搽二次。蓋膏。漸斂而平。

徐曰。此生肌法。更有佳者。

洗痔腫痛方

洗痔腫痛方法高。苦楝魚腥草朴硝。還有瓦花馬齒莧。煎湯熏洗痔疼消。

魚腥草

苦楝根

朴硝

馬齒莧

瓦松花

各一兩

水五大碗。煎三碗。先熏後洗。諸痔腫痛可消。

徐曰。此外治法。

楣案魚腥草徐圈。

人中白散

見牙疳門

治諸痔腫痛堅硬墜重脫肛等症。先用溫湯洗淨。隨後搽藥。卽臥勿動。其腫痛漸減。

三品一條槍

見瘰癧門此方徐X

治十八種痔漏。用藥線插入痔孔內。早晚二次。初時每次插藥三條。四日後。每次插藥五六條。至七八日。藥力滿足。痔變紫黑。方住插藥。候痔四邊裂縫流膿。至十四日期滿痔落。用甘草湯洗淨。換搽鳳雛膏。或玉紅膏。俱可生肌收斂。虛弱者。兼服養血健脾之藥。

徐曰。此不可用。近世惡醫殺人無數。

又曰。用以枯痔。已令人大痛無聲。況治他癰。無不哀號求死。毒入攻心。

生肌鳳雛膏

生肌雞卵鳳雛膏。輕粉乳香龍骨調。血竭同熬傾入盞。雞毛塗上效堪操。
用雞蛋煮熟去白。用黃十餘個。銅杓內熬油。傾入盞內。約油三錢。加輕粉細末一錢。乳香、血竭、龍骨末各五分。共入油內和勻。每日早午晚雞翎蘸塗孔內。膏蓋避風。深者半月可以完口。

徐曰。此膏用處極多。

煮線方

煮線方中用壁錢。芫花二味共相煎。白絲扣線投湯內。諸痔癰瘤用此痊。
治諸痔反五癰六瘤。凡蒂小而頭面大者。此入字用此線纏繫其根。

芫花五錢 壁錢二錢

用白色細扣線三錢。同上二味。用水一碗。盛貯小瓷罐內。慢火煮至湯乾爲度。取線陰乾。凡遇前患。用線一根。患大者二根。雙扣繫於根蒂。兩頭留線。日漸緊。

之。自然紫黑冰冷不熱。輕者七日。重者十五日。後必枯落。後用珍珠散收口。至妙。

徐曰。凡氣血不到惡症可用。否則恐有害。

臟連丸

臟連丸內用黃連。灌入公猪大臟煎。同搗爲丸。溫酒服。自然諸痔不纏綿。治痔無論新久。但舉發便血作痛。肛門墜重者。黃連淨末八兩。用公猪大臟盡頭一段。長一尺二寸。溫湯洗淨。將黃連末灌入臟內。兩頭以線紮緊。用生酒二斤半。砂鍋內煮酒將乾爲度。取起臟藥。共搗如泥。如藥爛。再晒一時許。復搗丸如桐子大。每服七十丸。空心溫酒送下。久服除根。

徐曰。寶火可用。

胡連追毒丸

胡連追毒丸。其奇。痔漏通腸。此可醫。麝香刺蝟皮丸服。排盡瘀膿。換好肌。治痔漏不拘遠年近日。有漏通腸。污從孔出者。先用此丸。追盡膿毒。此四字服後丸藥。自然取效。最穩。

胡黃連

一兩切片麝香二份

刺蝟皮再炒黃為末

刺蝟皮再炒黃為末

軟飯為丸。

麻子大。每服一錢。食前酒下。服藥後膿水反多。是藥力到也。勿懼。

徐曰。一方有山甲、槐米。

梔案胡黃連、刺蝟皮二味。徐圈。

黃連閉管丸

胡連閉管藥四般。不用針刀不苦難。決明山甲槐花等。併入胡連煉蜜丸。

胡黃連

一兩

穿山甲

麻油內

石決明

煨

槐花

微炒各末五錢

煉蜜丸如麻子大。每服一錢。空心清米湯送下。早晚日進二服。至重者四十日。

而愈。此方不用針刀挂線。不受苦楚。誠起痼疾之良方也。如漏之四邊有硬肉。

突起者。加蠶繭二十個炒末。和入藥中。凡偏身諸漏亦效。

梔案石決明徐圈。

痔瘡應用方

內疎黃連湯

見腫門

補中益氣湯

四物湯

俱見續傷門

六味地黃丸

見肺癰門

下疳論

下疳者。邪淫慾火鬱滯而成。其來有三。一由男子慾念萌動。陽物興舉。淫火猖狂。而未經發泄。以致敗精濁血。流滯中途。結而爲腫。初起必小便澀淋作痛。次流黃濁敗精。陽物漸損。甚則腫痛腐爛。法當疎利肝腎邪火。如入正散。清肝導滯湯之類是也。二由婦人陰器瘀精濁氣未淨。便與交媾。以致淫精傳襲而生。初起皮腫光亮。甚如水晶。皮破流水。腫痛日生。癢麻時發。治當解毒消風。龍膽瀉肝湯兼平胃散合而用之。三由房術熱藥塗抹玉莖。洗擦陰器。興助陽火。煽動陰精。僥倖不衰。久頓不泄。以致火鬱未發而成。初起陽物癢痛。堅硬紫色。疣瘡漸生。腐爛漸作。血水淋漓。不時興舉。治當瀉火解毒。如黃連解毒湯。蘆薈丸之類是也。外治之法。皆以銀粉散。珍珠散。人中白散選用。又有先發時瘡。誤用熏條擦藥。結毒於此者。詳註結毒門。

下疳看法

初起不紅不腫。睡不舉。湯王莖微損。小水自利者輕。已成微熱微腫。皮色光亮。小便赤色。更兼白濁者平。已損肉色紅活。掀無堅腫。小便不疼。大便不秘者順。初起小便淋漓。次損陽物。堅硬作疼。腐爛漸開者險。已成腐潰內攻。傷損王莖。色紫無膿。疼如針刺者重。

下疳治法

初起腫痛發熱。小水澀滯。肝經濕熱也。宜瀉肝滲濕。腫痛堅硬。掀發寒熱。口燥咽乾。大便秘者。通利二便。王莖腫痛。小便如淋。自汗盜汗。時或尿血者。清心滋腎。莖竅作癢。時出白濁。發熱口乾。津液少者。益腎清心。潰後腫痛。小便赤澀。日則安靜。夜則疼甚者。滋陰瀉火。潰爛不已。腫硬又作。疼痛日深。穢氣不同者。清肝解毒。徐曰。與諸症同。

下疳治驗

一童子十五歲。王莖腫痛。外皮浮腫。粗大一倍。他醫治之以解毒清肝等藥。愈腫

愈痛。予用瀉火清熱滲濕等劑。亦不見效。診其脈細數而無力。知爲中氣不足。脾經濕水乘虛流注。停聚不散。當行從治法也。用四物湯合平胃散加木香、熟附子、人參各五分。一服腫痛頓退。四五服而全消。

徐曰。二方合一。不通已極。其有效者。藥未嘗與病相反。亦能奏功。但無法度。爲可笑耳。譬如烹炮食物。魚肉菜飯并作一碗。豈成庖人乎。然食之亦能飽也。惟不可食之物。雖烹炮得法。亦能害人。

一男子腫痛發寒熱。用荆防敗毒散二服而退。又服龍膽瀉肝湯。腫痛亦減。更服四物湯加黃柏。知母而消。

徐曰。此小疾不足立案。此類甚多。俱可刪。

一男子年四十。色慾過度。小便澀痛。出如白漿。結煉成塊。此腎傷濕熱爲患。朝以

八味丸。

徐入味丸

午用八珍湯加山萸、牡丹皮、黃柏。知母服之。

徐曰。入珍湯內。月

餘而澀腫退。小便漸清。但竅中常有滑精。不時滲出。久致腰彎脚膝無力。偶用

三因勝駿丸。服至月餘。前症悉愈。

一男子莖頭腐爛。小水澀痛。外糝珍珠散。內服木通湯四劑。澀痛漸止。更服四物

湯加黃柏、花粉而痊。

徐曰。此似下疳初起。

一男子初婚。玉莖傷損。出血疼甚。先以葱湯浸洗良久。隨用珍珠散加冰片糝之。腐皮漸乾。痛亦漸止。內服四物湯加木通、山梔。四劑而愈。

一男子皮腫光亮。發熱疼甚。外敷如意金黃散。內服龍膽瀉肝湯加大黃。便痛稍愈。去大黃再服而消。

徐曰。以上諸條。並非真下疳症。真下疳當用靈妙糝藥。

下疳主治方

清肝導滯湯

清肝導滯湯。瞿麥。滑石。甘草。併扁蓄。大便若祕加大黃。燈心爲引。空心服。

治肝經濕熱。玉莖腫痛。小水澀滯作疼者。

扁蓄四錢

瞿麥一錢

滑石二錢

甘草一錢

大黃

黃二錢
祕加

水二茶鍾。燈心二十根。煎八分。空心服。

徐曰。此利水之方。卽入正散少三味。可刪。

又曰。凡大黃同滑石共服。則專走小便。而不作瀉。

龍膽瀉肝湯

龍膽瀉肝湯。木通。地黃。澤瀉。車前子。濕用黃連。祕大黃。芩。梔。翹。草。當歸。尾。治肝經濕熱。玉莖患瘡。或便毒懸癰。小便赤澀。或久潰爛不愈。又治陰囊腫痛。紅熱甚者。

龍膽草

連翹

生地黃

澤瀉 各一錢

車前子

木通

歸尾

山梔

甘草

黃連

黃芩 各五分

大黃 一錢 祕加

水二茶鍾。煎八分。食前服。

徐曰。凡瀉下焦濕火之藥。不外諸味。但與下疳不甚切。

梔。案。龍膽草。澤瀉。山梔。黃連。大黃。徐。園。

清肝滲濕湯

清肝滲濕二朮功。苓朴昆陳粉木通。山梔澤瀉川芎等。木香甘草當歸同。治陰囊玉莖濕腫如猪肚。小水不利。墜重作痛。

蒼朮

白朮

茯苓

山梔

厚朴

澤瀉

陳皮

木通

天花粉

昆布

甘草五分

木香三分

川芎

當歸各六分

作熱紅色。加黃連龍膽草。各七分

水二茶鍾。煎八分。空心服。

徐曰。此泛治方。

清心蓮子飲

清心蓮子飲。黃耆。赤茯苓。人參。地骨皮。黃芩。甘草。併澤瀉。麥冬。加上水煎宜。

治心經蘊熱。小便赤澀。玉莖腫痛。或莖竅作疼。及上盛下虛。心火炎上。口苦咽乾。煩躁作渴。或虛陽口乾。小便白濁。夜則安靜。晝則發熱者。

石蓮肉

黃耆

黃芩

赤茯苓

人參各一錢

炙甘草

澤瀉

麥門冬

地骨皮各五分

水二茶鍾。煎八分。空心併食前服。

徐曰。此通治清心火之方。亦與下疳不切。

入正散

入正散中用木通。車前瞿麥大黃同。扁蓄山梔併滑石。加之甘草有殊功。

治肝經積熱。小便淋閉不通。及一切淋病。

大黃

車前子

瞿麥

扁蓄

山梔

木通

甘草各一錢

滑石二錢

水二茶鍾。煎八分。食前服。

徐曰。此利水主方。亦非治下疳藥。

解毒木通湯

解毒木通湯。柏連。膽草。山梔。蘆薈。全。瞿麥。滑石。知母。草。還用燈心作引。煎。

治男婦房術熱藥所傷。致玉莖陰戶癢痛。小水澀滯。白濁滑精。至夜陽物興舉。

不得眠者。

木通

黃連

龍膽草

瞿麥

滑石

山梔

黃柏

知母各一錢

蘆薈

甘草各五分

水二茶鍾。燈心二十根。煎八分。食前服。

徐曰。同前意。

蘆薈丸

蘆薈丸中用二連。蕪荑鶴虱共雷丸。青皮麝木香同等。餅糊丸服病安痊。

治下疳潰爛作痛。又治婦人陰蝕瘡作癢。及小兒肝積發熱。口鼻生瘡。牙齦蝕

爛等症。

胡黃連

黃連

蘆薈

白蕪荑

青皮

白雷丸

鶴虱草各一兩

麝香一錢

木香三錢

右爲末。蒸餅糊丸如麻子大。每服一錢。空心清米湯送下。

徐曰。此殺蟲之方也。內有濕熱生蟲者宜服。

梔案胡黃連、蘆薈、白蕪荑、白雷丸、鶴虱草。徐圜。

銀粉散

銀粉散用錫化開。硃砂研末攪成堆。去砂留錫更投汞。杭粉輕粉隨後攪。

治下疳毋論新久。但腐爛作痛。及楊梅瘡熏後結毒。玉莖腐爛。或陽物半傷。半全者。好錫六錢。化開。下硃砂末二錢。攪炒砂枯。去砂留錫。再化開。投水銀一兩。和勻傾出聽用。杭粉一兩。研細。鋪夾紙上捲成一條。一頭點火煨至紙盡爲度。吹去灰用粉與汞錫同煎。加真輕粉一兩。共成一家。研細。凡遇前患。先用甘草湯淋洗。浥乾。隨用此藥。上止痛生肌收斂。極妙。

徐曰。此殺蟲收濕。糝藥。或加寒水石。礪砂。

珍珠散

珍珠散效實堪誇。輕粉還兼釭子花。諸腫諸瘡諸痛腐。用之一糝自然瘥。

治下疳皮損腐爛。痛極難忍。及諸瘡新肉已滿。不能生皮。又湯潑火燒。皮損肉爛。疼痛不止者。

青缸花五分如無用頭刀錠花輕虛色

上入豆腐內煮數滾研至極細無聲方用

真輕粉一兩

珍珠一錢不論大以新白爲

右三味共研千轉細如飛麵方入罐收。凡下疳初起皮損。搽之即愈。腐爛疼痛者。甘草湯洗淨。猪脊髓調搽。如諸瘡不生皮者。用此乾糝。即可生皮。又婦人陰蝕痛。或新嫁內傷痛甚者。亦可搽此。極效。湯潑火燒痛甚者。用玉紅膏調搽之。徐曰。輕淡之品。

疳瘡簡便方

用油透羅緞舊帽沿燒灰。杭粉瓦上煨黃色。各等分。共研極細。瓷罐收貯。先用紅棗十五枚。甘草三錢。煎湯溫洗患上。浥乾搽藥。即效。

太乙膏

見腫瘍門

治玉莖皮損。疼痛不止者。用此貼之。其疼即止。

下疳應用方

四物湯

八味丸此方徐勒

八珍湯俱見傷門

三因勝駿丸見附骨

魚口便毒論

夫魚便者。左爲魚口。右爲便毒。總皆精血交錯。兩胯合縫之間結腫是也。小腹之下。陰毛之傍結腫。名曰橫痃。又名外疳是也。得之入房忍精。強固不洩。或慾念已萌。停而不遂。以致精血走動凝滯。結而爲腫。治當散滯行瘀。通利大小二便。九龍丹。山甲內消散是也。七日已後服之。根本堅固。恐其作膿。宜用火針法刺之。亦妙。已出膿者。服十全大補湯。庶易收斂。遲則恐生別症難愈。

魚口便毒看法

初起結腫不紅微熱。行走利便。無寒熱交作者輕。已成紅赤腫痛。發熱掀疼。舉動艱辛。至夜尤甚者順。已潰膿稠。肉色紅活。腫消痛止。新肉易生。作癢者順。初起結腫堅硬如石。牽強刺疼。起坐不便。寒熱者重。已潰腐爛。腫痛不減。膿水清稀。孔深口大不斂者險。

魚口便毒治法

初起漫漫結腫疼痛。兩胯牽強。身發寒熱。宜散表邪。已成堅硬。發熱疼痛。內熱口

乾。大小便秘。宜通利之。發散疎利之後。腫痛仍作。欲作膿。宜用托裏消毒散。掀腫發熱。疼痛日久。急脹若甚。內膿已成。宜急開之。已潰之後。膿水不乾。新肉生遲。不斂。宜健脾胃。補氣血。

徐曰。看法治法。與諸症同。

魚口便毒治驗

一男子左胯腫痛。身發寒熱。脈弦而數。用人參敗毒散一劑。表症悉退。次用山甲內消散二劑而痊。

徐曰。此初起輕症。

一男子橫痃腫痛堅硬。二便澀滯。以九龍丹一服。通利大便。腫痛稍減。間日又用一服。二便通利而消。

一男子患此十餘日。形勢已成。腫痛日甚。因公事急欲出而不能行。以火針法針之。出紫血鍾許。外用膏貼。拔出微膿。服托裏消毒散而可行。且速愈。

徐曰。此是實症。

一男子潰而口大不斂。此先時泄藥之過也。用十全大補湯加澤瀉、丹皮。十餘劑。外搽玉紅膏。月餘而斂。

一男子先出疳瘡。久而不愈。後發橫痃。十餘日始覺腫痛。余欲托裏潰膿以泄毒氣。彼欲內消。自服槐花酒、蜈蚣、全蠍等藥。蜈蚣全蠍徐勣腫未得消。元氣已損。轉致筋骨疼痛。舉動艱辛。仍請余治。形體瘦弱。脈虛而數。此真氣受傷。邪氣隨入。雖宜補養。必發時瘡。乃愈。彼不之信。仍服敗毒消風等藥。元氣愈虛。飲食不進。筋骨疼甚。徹夜不睡。又復請治。先用補中益氣湯。補中益氣湯徐勣倍參、耆。六服。元氣稍醒。惟疼不大減。此內虛瘡毒下陷之故。朝服六味丸。午用十全大補湯。十餘服。偏身方發紅點。此瘡毒欲出。仍服前藥。紅點漸高。始成瘡形。瘡毒一出。疼痛頓減。元氣漸復。更服八珍湯。八珍湯徐勣加米仁、銀花、土茯苓。服至半年。方得漸愈。彼悔執方治病之誤。始信因病用方之妙。

徐曰。一味蠻補。自然難愈。

又曰。凡外症用補中益氣八味六味十全大補諸內科之方。其藥味全與外科無涉者。皆薛立齋之惡習也。此老全不知醫。而竊當時之盛名。死有餘辜。

魚口便毒主治方

山甲內消散

山甲內消散。大黃。當歸。用梢蠶。用僵。黑牽牛。與甘草節。土鼈。太寒。須熟商。治魚口便毒。騎馬癰橫。疔等症。初起未成膿者。

當歸梢

甘草節

大黃錢各三

穿山甲炒三片

僵蠶

黑牽牛錢各一

土木鼈三箇。徐曰。此味太寒。不可輕用。

水酒各一碗。煎八分。空心服。渣再煎服。大便秘行三四次。方喫稀粥。淡味飲食妙。

徐曰。此便毒之主方。但藥味太烈。宜酌用。

又曰。此症堅硬難消。故用藥宜重。

梔子。大黃。穿山甲。黑牽牛。土木鼈。徐圈。

九龍丹

九龍丹。用茶血竭。巴豆。木香。兼乳沒。生蜜爲丸。酒下之。便毒橫疔。滅無跡。

治魚口便毒。騎馬癰橫。疔。初起未成膿者。

兒茶

血竭

乳香

沒藥

木香

巴豆油不去

右各等分。爲末。生蜜調成一塊。瓷盒盛之。旋丸寒豆大。每服九丸。空心熱酒一杯送下。行四五次。方喫稀粥。腫甚者。間日再用一服自消。

徐曰。巴豆必當去油。亦不宜輕用。

紅花散瘀湯

紅花散瘀湯。蘇木。翹貝。蠶乳。決明。歸尾。大黃角針等。牽牛山甲酒煎行。治入房忍精強固不泄。以致瘀精濁血凝結兩胯。或小腹之旁。結成腫痛。小水澀滯者。

當歸尾

阜角針

紅花

蘇木

蠶乳

連翹

石決明

穿山甲

乳香

土貝各一錢

大黃三錢

牽牛二錢

水酒各一碗。煎八分。空心服。行五六次。方喫稀粥補之。

徐曰。義同前。

楣案阜角針、蘇木、石決明、乳香、土貝、徐園。

黃耆內托散

黃耆內托散芎歸。白朮銀花澤瀉隨。花粉角針與甘草。魚口便毒此能醫。

川芎

當歸

黃耆各二錢

白朮

金銀花

天花粉

阜角針錢各一

甘草

澤瀉

瀉各五分

水二茶鍾煎八分。食前服。

徐曰。法重出。

楣案全生集載橫痃生於小腹兩旁大腿界中。形如腰子。皮色不異。硬如結核。按之微痛。五月初旬。取新鮮角刺數斤搗爛。入鍋煮湯。湯濃瀝出。易水再煮二三度。出渣。將汁共歸一鍋。慢火煎至成膏。日取二錢。同糯米煮粥。日食可消。如無新鮮角刺。取乾者六錢爲末。布袋同糯米煮粥。食亦可。或以控涎丹三分。淡薑湯日送三次。全愈乃止。大忌開刀。開則刀口無膿。唯出白膩漿。

三百日內死。自潰者亦然。

玉紅膏

見潰瘍門

治魚口便毒橫痃。腐潰口不合者。用此搽之。

火針法

火針之法。勝服藥。針蘸桐油火上灼。刺入瘡根膿血行。腫消痛止。成歡樂。治魚口便毒橫痃等症。用行藥不得內消者。用粗線針二條。將竹筴一頭劈開。將針離分半許。夾在筋頭內。以線紮緊。用桐油燈盞內貯之。燈草五根。排入油內點著。將針蘸油燒紅。向患項重手刺入五六分。隨出或血或膿。以膏蓋貼。即得輕便。以後漸愈。虛者兼服十全大補湯完口。

徐曰。血寒氣壯人方可用。膏梁虛弱人不宜。

楣案血寒疑是血實之誤。然所見鈔本皆作寒。今仍之。

魚口便毒應用方

托裏消毒散

見腫瘍門

十全大補湯

補中益氣湯

八珍湯

俱見潰瘍門

六味地黃丸

見肺癰門

