

慈幼新書

一

中國醫學大成第十集

兒科類甲
兒科叢刊之一

慈 幼 新 書 一

上海大東書局印行

慈幼新書提要

明程鳳雛撰。鳳雛字雲鵬。湖北江夏人。張希良序云。鳳雛受知蔣慎齋先生。稱吾楚文章巨子。醫事其一端而已。先之以慈幼書者。憫赤子之呼號而莫告也。昔寧都魏丈冰叔謂鳳雛之醫。神明變化。大似武侯用兵。鳳雛聞之曰。武侯吾豈敢。吾師鄧禹耳。鄧禹有言。吾將百萬兵。攻城陷陣。未嘗妄殺一人。皆能達造化之機者。其卷首列保產。先明未產保養。以植基礎。其卷一列稟賦。臟能。脈候。胎症。變蒸。其卷二列雜症。其卷三、四、五列痘瘡。其卷六列痘瘡備用方。其卷七列麻疹。丹毒。風毒。驚丹。急驚。慢驚。風癇。發熱。卷八列傷寒。卷九列感冒。咳嗽。痰喘。瘧疾。痢疾。吐瀉。卷十列食積。疳積。腹痛。小便諸血。卷十一列瘡疽雜症。卷十二列痘家應用藥性等類。綜觀慈幼一書。大而胎產痘疹驚癇寒熱。細而耳目喉齒。以及瘡癰疥癬。廣博精微。無一不備。誠保嬰之慈航也。考先生又著慈幼筏一書。署名程雲鵬鳳雛輯。後附醫案。題章亦在徵求中。謀刊於續集。是書書賈爲謀推廣銷路計。因僞托介賓名。其一二卷上。雖添加張介賓著。以眩惑讀者。其次行仍有程雲鵬鳳雛輯。

嗣閱張希良原序。云與雲鵬友善。詳述其著書緣起。並未涉及介賓一字。且查介賓著書事略。亦無是書之輯。其立方用藥。更與景岳派不同。又陸定圃冷廬醫話。亦稱程鳳雛作慈幼筏。可知實非介賓之著。今書名雖是慈幼新書。而著作人遵原文改正爲程雲鵬鳳雛輯。所以昭翔實也。

張序

士君子立身。爲天下之望。雖窮而在下。凡百有作。無一不與天下相維繫。故能爲天地立心者。斯能爲生人立命。如吾友程子鳳雛是已。鳳雛受知蔣慎齋先生。稱吾楚文章巨子。自余司鐸江夏時。固心識之矣。後稍稍接見。乃知鳳雛非特能文章。其胸中浩蕩之氣。實將空當世一切之所有。醫事其一端已。醫亦不一家。而先之以慈幼書者。憫赤子之呼號而莫告也。今天下醫學之弊。非庸則妄。庸者卑陋自窒。守一師說而不能變通。妄者私心穿鑿。攻補一偏而不能察于微渺。其術不同。而殺人則一也。昔寧都魏丈冰叔。謂鳳雛之醫。神動變化。大似武侯用兵。鳳雛聞之曰。武侯吾豈敢。吾師鄧禹耳。鄧禹有言。吾將百萬兵。攻城陷陣。未嘗妄殺一人。夫鄧禹、武侯。皆能達造化之機者。余觀慈幼一書。大而胎產痘疹驚癇寒熱。細而耳目喉齒。以及瘡癰疥癬。廣博精微。無一不具。蓋隆中之抱膝。車上之指揮。非異事也。冰叔之言。豈欺我哉。余又聞鳳雛從趙照庵吏部。與延陵二五山人。華山半輪道士。講論大丹。駕鵲橋而交水火。固又嘗飲天姥之醍醐矣。今此肘後所傳。

豈更猶夫人之醫籍也哉。鳳雛以有爲之才。不得有爲之地。將以此書鞠育天下之人。其用心良苦。以視一命之士。惠愛不過一隅。則爲功倍多。嗟乎。余曩以木天清冷之官。視學全浙。雖夙夜殫心。於端士習厚風俗。而環視車下創痍之顛蹶。而曾無可挽。不若鳳雛心力所及。遂可登斯民於仁壽之域。余滋愧矣。黃安張希良撰

慈幼新書目錄

卷首

保產

一一二二

卷一

稟賦

一

臟能

三

脈候

四

胎病

五

胎熱

五

胎寒

七

胎肥

八

慈幼新書目錄

卷二

胎怯

八

胎黃

八

胎驚

九

鎖肚

〇

不啼

一

不乳

一

臍風

一

撮口

二

噤口

二

變蒸

三

雜症

.....一

咽喉

.....一

齒

.....五

舌

.....七

口

.....九

耳

.....〇

目

.....二

鼻

.....九

顙

.....一

頤

.....二

臍

.....三

語遲

.....四

夜啼

.....四

龜胸

.....五

卷二

龜背

.....二五

鶴節

.....二六

行遲

.....二六

五軟

.....二七

五硬

.....二八

痘瘡

.....一

總訣

孕婦痘瘡附見

.....一六

卷四

痘瘡

.....一

發熱三日訣

.....一

見點三日訣

.....八

卷五

痘瘡

起脹三日訣

灌膿三日訣

結靨三日訣

落痂餘毒訣

卷六

痘瘡

備用方

清地散花飲

玉液春膏飲

三豆湯

辟穢香

九味神功散

參麥清補湯

木香散

異功散

內托散

參歸鹿茸湯

清毒活血湯

快癍越婢湯

回漿散

象牙散

人參清神湯

荆防敗毒散

白芷升麻湯

大連翹飲

一二

起頂散

一二

清肺湯

一二

菊花飲

一三

犀角地黄湯

一三

甘露飲

一三

地黃湯

一四

罩胎散

一四

救苦丹

一四

賽春雷

一五

滿天秋

一五

熱見愁

一六

千里馬

一六

一丸春

一六

蟾酥丸

一七

紅爐雪

一七

銀鎖匙

一七

豆蔻丸

一八

流氣飲

一八

風捲雲

一八

碧雲散

一九

四聖丹

一九

立馬回疔丹

一九

加減鼠粘子湯

二〇

玉紅膏

二〇

清肌湯

二一

胭脂塗方

二一

生肌散

二二

綿繭散	二二
百花膏	二二
金華散	二二
拔毒膏	二三
人牙散	二三
獨聖散	二三
吹口丹	二四
三仙散	二四
麝礬散	二四
麥湯散	二四
稀痘方	二五
玄免散	二五
仙砂散	二六
龍鳳膏	二六

卷七

痧疹	一
孕婦見	
丹毒	〇
風毒	一
驚丹	二
驚	三
癰	一
發熱	三
傷寒	一
大人方	
麻黃湯	五
桂枝湯	五

小青龍湯	六
大青龍湯	六
惺惺散	七
葛根湯	七
升麻葛根湯	七
小柴胡湯	七
大柴胡湯	八
白虎湯	八
調胃承氣湯	九
大承氣湯	九
小承氣湯	九
桃仁承氣湯	九
小建中湯	一〇
黃耆建中湯	一〇

理中湯	一〇
真武湯	一〇
白通湯	一一
麻黃附子細辛湯	一一
四逆湯	一二
四逆散	一二
甘草瀉心湯	一二
玄參升麻湯	一三
陽毒升麻湯	一三
桃仁湯	一三
黃連犀角湯	一四
雄黃銳散	一四
牛蒡根湯	一四
牡蠣澤瀉湯	一四

黃龍湯.....一五

卷九

感冒.....一

咳嗽.....三

痰.....五

瘧疾大人方論附見.....七

痢疾大人方論附見.....二

吐瀉.....一七

卷十

食積.....一

疳積.....八

腹痛.....一二

小便.....一三

血.....一六

汗.....一八

痘.....一九

卷十一

瘡疽雜症.....一

五福化毒丹.....一

加味解毒散.....二

九味解毒散.....二

復元活血湯.....二

惡瘡毒腫神方.....三

大黃活命丹.....三

神效散.....四

三七化毒丹	四
洪寶丹	五
沒藥散	五
白蔹藥散	五
接骨散	六
勝金丹	七
本事內消散	七
乳香定痛散	七
班蝥奪命丹	八
玉珍散	八
絳袍散	九
冰黃散	九
豆豉餅	一〇
神效當歸膏	一〇

鐵箍散	〇
猪蹄湯	〇
敷睡毒方	一
內消散	一
犀角丸	一
軟癰方	二
蟾酥丸	二
生肌散	三
玉蟾生肌散	三
漏蘆湯	四
偷刀散	四
太乙膏	四
神效千槌膏	六
療癰丸方	七

金瘡膏藥	一九
天蛇頭方	二〇
血風瘡方	二〇
肺風瘡方	二一
疥瘡方	二一
疳瘡方	二二
龍膽瀉肝湯	二三
湯泡瘡方	二三
賺瘡方	二四
疥瘡一掃光方	二五
膿窠瘡方	二六
肥瘡黃水瘡方	二七
坐板瘡方	二七
癬瘡方	二七

卷十一

耳凍瘡方	二八
凍瘡方	二八
頭上肥瘡方	二九
室女陰戶外瘡方	三〇
陰戶內蟲方	三〇
足指內瘡方	三一
濕瘡方	三一
足縫爛濕方	三一
通利濕氣丸方	三二
濕氣神應膏	三二
大癰瘋方	三三
鶴膝風方	三六
綉球風方	三六

慈幼新書 目錄

痘家應用藥性雜症附見……一——二五

慈幼新書

明 江夏 程雲鵬鳳雛輯

鄞縣 曹赤電炳章校

卷首

保產

生產一道。天地自然妙理。不假修爲。然詩人以不坼不副。無災無害。美后稷。則自后稷以外。固實有坼副災害其母者。保產之術。可不講乎。世風不古。胎教久廢。爲母者。旣不能保于平時。身安逸。則氣血凝滯。奉養厚。則脂膜肥滿。嗜慾多。則胎衣厚而難破。不幸值此。急以回生丹治之。

鄭蘭皋曰。嗜慾一端。爲害最重。三月前犯。能動胎小產。三月後犯。使子不壽。慎之慎之。

又曰。出胎時。身多白點。或兩足粉白如枯骨。或痘標乾涸焦紫。皆此之故。

又曰。飲食最忌炙煇椒辣。及驢馬犬兔。蟹鼈鯨魚。河豚菌子。野雀薏苡茨菰之類。昔人有食兔缺唇。食鼈短項。食蟹橫生。食魚生瘡等論。驗之良然。

史摺臣曰。俗信師巫邪說。轉女爲男。妄用鍼灸。或吞符水。或以麝香膏藥貼臍。爲害匪淺。

少婦初產。神氣怯弱。子戶未舒。中年婦人。生育既多。血氣虧損。二者須大金丹。至寶丸。常服調理。

懷孕六七月。或入九月。偶略曲身。胎忽亂動。三兩日間。或痛或止。或有水下。惟腰不甚痛。胎未離經。名曰弄產。又有臨產一月前。忽然腰痛。却又不產。此是轉胎。名曰試月。胎水有無俱不妨。但直身坐臥行立。卽無事。又有伸手高處取物。忽子鳴腹中。但令鞠躬片時。卽愈。

臨產陣痛。有二三日者。有五七日者。氣候未至。須聽其坐臥如意。不得便令扶坐努力。憂疑氣餒。或九或散。諒虛實消息之。

大金丹同生丹達生散便產神方

臨產有七候。臍腹急痛。腰間重墮。眼中火出。糞門迸急。產戶腫滿。手中指筋脈跳動。胞水或血俱下。方是子出胎時。產母始可用力。如數症未備。卽一日二日。切不可

可強使掙努。又有胞水已下。兒頭已到產門。三四日仍不出者。亦唯有調其飲食待之。服大金丹壯之。

臨產時飲食減少。即須常服獨參湯調理。不可使精力衰乏。若交骨不開。是氣血不能運達。須補中益氣。加味芎歸湯服之。

臨產時驚覺太早。血先下而胎元乾涸。殭死腹中。唯看產母面舌。面青母傷。舌青子傷。面舌俱青。子母難保。下死胎。亦不必倉皇用力。服回生丹至三丸立下。若一時未備。以平胃散一兩。投朴硝五錢。煎三五沸溫服。其胎即化水而出。切忌用刀。駭傷產母。

產時子有出戶之勢。轉側差緩。母力一逼。或手或足。橫生倒生。又有生路未正。兒頭偏挂左右腿畔。名曰偏產。又有偏挂穀道。名曰棖後。凡此宜急扶產婦上床。正身仰臥。厚被覆之。服便產湯。臨產預煎須臾提上。重新轉身。兒頭正對產門矣。急扶即生。

程克庵曰。俗謂手先出爲覓鹽。以手得鹽而蜚縮也。吳子通云。不論手足先出。急以針尖微刺手足心內。大約深半米許。用鹽醋泥三味調勻塗之。輕輕送入。

產時門戶俱正。兒已露頂而不下。此轉身時。臍帶絆其肩也。扶母仰臥。輕輕推兒向上。以手指輕按兒肩。去其臍帶。然後用力送下。

胎衣來遲。氣虛弱也。大金丹服之。若血流入衣。脹悶疼痛。宜速服回生丹二三丸。或牛膝湯下之。捷法用滾水磨好陳墨。沖服卽下。或令能事穩婆。以手循臍帶而上。輕覆衣血。從容俟之。亦下。有用草麻子貼足心。及令產婦含頭髮作嘔者。甚非良法。切須戒之。

產時用力太早。水衣先破。以魚膠燒過存性。搗細沖酒服之。又有水衣破時。被風所吹。產戶腫脹。乾澁狹小者。亦從容俟之。又有穩婆蓄意害人。私以指搯破水衣。須要防護。

產時腸先盤出。用淨盆盛溫水。少入香油養潤。待兒并胞衣下時。母略仰臥。自己吸氣上升。穩婆香油塗手。徐徐送入。或以陰陽家用過磁石煎湯服之。亦能收上。或濃煎黃耆湯浸之。補中益氣湯服之。尤爲妙法。又有兒并胞衣下後。膀胱墜出。產戶者。同前法送入。若穩婆不謹。膀胱扯破者。八珍湯加猪胞三錢。服之可復。

汪寧齋曰。盤腸爲中氣不足。若初胎見此。下次孕時五六月上。多服補中升提。

之劑。分娩自無此患。

產畢。產門不閉。氣血虛也。加味芎歸湯。十全大補湯。俱可服。若因胎大。而擦傷產門者。斬艾。益母草煎湯洗之。

產後血暈。不省人事。用韭菜細切。裝入有嘴瓶內。煎滾醋沃之。封紮瓶口。刺二小竅。扶產婦坐定。以瓶竅對鼻孔熏之。令醋氣透入。須臾自甦。或進大金丹。清魂散。亦無不效。曩有燒舊漆器法。不宜用之。蓋血氣未回。穢觸必生他病。豈可妄施。乃爾。

方公度曰。敗血逆上攻心。滿急垂絕者。用生薑二十片。鹽半斤。炒熱布包熨之。血下而愈。或韭菜同炒亦妙。又有敗血入肺作喘者。人參。蘇木等分。煎服自瘥。產後百脈空虛。洗拭太早。令中風口噤。手足搖擲。角弓反張。或因怒氣發熱迷悶。用荊芥穗微焙。當歸酒洗各二錢。水鍾半。童便。黃酒各半鍾。煎七分。灌之。牙關緊。以簪挾開。或口對口灌。仍捻其鼻。以手摩其喉。使得下咽。卽甦。產後有舌出不能收者。亦妄力所致。以硃砂末傅之。仍令作產子狀。片刻自愈。舊法。窗戶外潛堆盆盜。擲地使驚。而舌入此。與燒漆器咬頭髮之意。皆未盡善也。

孕時觸損臟氣。胞繫裂斷。忽然胎墮。名曰小產。虧敗子宮。較大產爲甚。宜倍加調攝。大金丹至寶丸服之。或芎歸補中湯亦可。

大金丹

當

歸肥白大枝者酒洗淨晒乾切厚片

白茯苓乳拌晒

白

朮黃土裏飯上蒸七次去土切片烘

延胡索酒煮透晒乾

蘄艾去梗淘淨灰麴醋煮

川芎

川藁本去土洗淨晒乾

丹皮水洗淨晒

赤石脂煨

茵陳童便煮

鼈甲醋炙酥

黃芩酒炒

白芷各二兩

人參切片飯上蒸

地黃酒煮爛

益母草取上半截熬膏

香附醋乳酒童便鹽水六製各四兩

桂心大粉草酒洗炒

沒藥透明者去油各一兩二錢

北五味子去梗淨炒一兩沉香六錢

阿膠蛤粉炒成珠三兩

紫河車一具。盛竹籃內。放長流水中。浸半日。去其穢惡。用黃柏四兩。入煨罐內。

將河車放黃柏上。酒浸沒。炭火煮熟。取起。合各藥同搗晒乾。磨極細。如飛麵。復合益母草膏。爛地黃。阿膠和勻。搗二千杵。如乾。漸加煉蜜。丸如彈子大。每重三

錢五分。日色中略晒片時收起。

阿膠難得佳者。用龜膠神妙。吳子通傳此方。以硃砂爲衣。合時勿經婦人手。臨產米湯服一九。助精神壯氣血。分娩順利。

產下童便好酒服一九。神清體健。無崩暈之患。每日服一九。五日後氣血完固。不生他病。

產後血崩。童便好酒服一九卽止。

產後血暈。當歸川芎湯服一九卽醒。

產後風痙。防風湯服一九卽解。

產後兒枕作痛。山查砂糖湯服卽止。

產後胞衣不下。黑薑煎湯服卽下。

婦人經水不調。艱於子者。每行經後。川芎當歸湯日服一九。過百日卽能受孕。婦人氣血不調。情志鬱結。受胎後偶有所觸。胎動欲落。白湯服一九。睡半日。其胎卽安。每日服一九。保全足月。分娩無患。

凡婦人諸虛百損。用川芎當歸湯。每日服一九。亦多可復。產後不論何症。俱用

童便好酒服之。能保命護身。同生起死。其功不能盡述。

至寶丸

真金華香附一觔四兩擇無毛大而淨者童便浸三日搗碎晒乾為末用馬
十二兩 熟地黃三兩 當歸 杜仲鹽水炒

川芎

人參

白茯苓

牡丹皮

延胡索

滴乳香

沒

藥

焙去油瓦上

赤石脂

細膩粘唇者火煨醋淬各一兩

白朮

白

芍

各一兩五錢

鹿角膠

牡蠣粉炒成珠去粉四兩

方內餘藥俱照大金丹製法。蜜丸彈子大。每早空心白湯服一丸。能調經止帶。安胎補虛。凡治胎前一切症。從無神妙過此者。

同生丹

錦紋大黃

一觔為末

蘇

木

三兩打碎河水煎汁三碗

大黑豆

三升水浸去殼用絹袋盛乾好同煮熟去豆留汁將殼晒乾

紅花

三兩炒黃色入好酒四碗煎五七碗去渣

米

醋

陳者九觔

右件先將大黃末。入淨鍋。下米醋三觔。文火熬之。以長木筯。不住手攪之。成膏。再加醋三觔。熬之。如前攪透。又加醋三觔。熬之。如前攪透。徐下黑豆汁。再熬。次下蘇木汁。次下紅花汁。如前攪熬成膏。取起盛瓦盆內。將鍋粃鏟下。同後藥磨。

人參二兩減半亦可

當歸

川芎俱酒洗

香附

延胡素俱醋炒

蒼朮米泔炒

蒲黃隔紙炒

茯苓

桃仁去皮尖

酒蒸熟地黃各一兩

牛膝

地榆

白芍俱酒洗

甘草炙

三稜醋浸透紙裏煨

川羌活

廣橘紅

馬鞭草

五靈脂醋煮化焙乾研細

山萸肉酒浸蒸搗爛入藥晒各五錢

木瓜

青皮炒

白朮米泔炒

秋葵子各二錢

烏藥去皮二兩五錢

良薑

木香各四錢

乳香

沒藥各二錢瓦上焙去油研

益母草二兩

右三十味。并前黑豆殼爲末。入石臼內。下大黃膏拌勻。再下熟蜜一觔。共搗千杵爲丸。每重二錢七八分。靜室陰乾。須二十餘日。不可日晒。不可火烘。不可塵。

染。乾後止重二錢有零。鎔蠟護之待用。

臨產。淡鹽湯下一丸。無橫生逆產之苦。氣血怯弱者。獨參湯下之。

產母素患熱病。子死腹中。用車前子一錢煎湯服。未下再服二三丸。若因血下太早。致子死者。人參、車前子各一錢煎服。如無參。以陳酒少許煎車前子湯。胎衣不下。用炒鹽少許。泡湯服。一丸至二丸三丸。

產畢血暈。用薄荷湯服。

產後三日。血氣未定。還走五藏。奔衝於肝。血暈。起止不得。眼見黑花。用滾水服。

產後七日。因食物與血結聚胸中。心悶煩渴。用滾水服。

產後虛羸。血入於心肺。熱入於脾胃。寒熱往來。似瘧非瘧。用滾水服。

產後敗血走注五臟。轉滿四肢停留。化爲浮腫。渴而四肢覺寒。乃血腫。非水腫也。用滾水服。

也。用滾水服。

產後敗血爲熱。中心煩躁。言語顛狂。非風邪也。用滾水服。

產後敗血流入心孔。閉塞失音。用甘菊花三分。桔梗二分。煎湯服。

產未滿月。誤食酸寒堅硬之物。與血相搏。流入大腸。不得尅化。泄痢膿血。用山

查煎湯服。

產後百節開張。血入經絡。停留日久。虛脹酸疼。非濕症也。用蘇梗三分煎湯服。產後月中。飲食不得應時。兼致怒氣。餘血流入小腸。閉塞水道。溺血似鷄肝。用木通四分煎湯服。又或流入大腸。閉塞肛門。有瘀血成塊如鷄肝者。用廣陳皮三分煎湯服。

產後瘀露未淨。飲食寒熱不得調和。以致崩漏。形如肝色。潮熱煩悶。背膊拘急。用白朮三分。廣皮二分煎湯服。

產後血停於脾胃。脹滿嘔吐。非翻胃也。用陳皮煎湯服。

產後敗血入五臟六腑。并走肌膚四肢。面黃口乾。鼻中流血。遍身癰點。危症也。陳酒服。

產後小便澀。大便秘。乍寒乍熱。如醉如癡。滾水服。

產後敗血爲害。一切異症。人所未經。醫亦難識。但服此丹一九至二三九。無不奇應。胎前以獨參湯常服一九。壯氣養胎。滋陰順產。調和五臟。平理陰陽。最爲神妙。

室女經閉。月水不調。白湯服妙。

此丹疏利臟氣。較大金丹爲速。然尋常服餌。必以至寶爲先。此丹殿後。大金間進。又以濟二藥之奇。自有產科以來。未見如此十全法寶也。吾願天下有力人。速爲誠敬修合。廣濟羣生。皇天決不相負。

兔腦丸

十二月兔腦髓一具去皮膜研如泥

母丁香二錢五分

乳香

麝

香各另研五分

三香碾細拌勻。兔腦爲丸。如芡實大。陰乾。油紙裹好。每用時溫水下。一丸。凡生理不順。或橫或逆。皆效。產時男左女右手。中握出。

趙照庵曰。鼠腎用銀針挑破。滴乳香一錢。爲末和丸。如桐子大。硃砂爲衣。俟惡露至。好酒送下二丸。同此治效。

備用煎方。丸藥一時未備者。按候用之。

安胎飲

白朮

當歸

紫蘇

條

芩

錢各一

川芎 八分

白芍 七分

砂仁 炒

香附 各六分

人參

陳皮 各五分

炙甘草 三分

苧根 二錢

翁曙公曰。婦人經水三月不來。疑似之際。用川芎二錢爲細末。空心煎艾湯調下方寸七。覺腹中動。則有胎也。臍之下動。則血痕也。不動者。瘀血凝滯也。程未能曰。女子胞繫於腎。腎氣虛。胎不能固。用杜仲一斤。鹽水炒斷絲爲末。黑棗一斤。去皮核搗肉。共爲丸。每服三錢。其胎自固。

人參橘皮湯 姙時嘔酸惡阻。脾胃虛也。

人參

白朮

茯苓

陳皮

厚朴

麥冬

炙甘草

煨薑

麥門冬湯 姙時心常驚悸。是子煩也。

麥冬

黃芩

茯苓

淡竹葉

天仙籐散 姙時面目四肢浮腫。是子氣也。

香附

陳皮

烏藥

甘草

天仙籐

羚羊角散 姪時喉中喘急。搐掣露睛。是子癰也。

羚羊角

五加皮

川獨活

川芎

苡仁

當歸身

酸棗仁

炙甘草

茯神

木香

防風

杏仁

達生散

大腹皮炒

白芍酒炒

紫蘇

人參各一錢

甘草炙

陳皮各五

當歸身二錢

葱五葉

胎肥加黃楊樹梢七個。

春加川芎。夏加黃芩。秋冬加砂仁、枳殼。

程坡士曰。達者。暢茂條達之意。或曰。達音闢。小羊也。詩。誕彌厥月。先生如闢。美

后稷之易生。夫馬牛羊豕。未有分娩而致厄者。豈天之於人獨薄乎。不知皆平

時調攝無道。臨產着意驚惶。遂致人不如物耳。爲丈夫者。幸體此而講明之。

便產神方

當歸五錢

川芎

白芍各一錢二分

貝母一錢

兔絲子酒洗二錢

荆芥入分

厚朴薑汁炒

黃耆蜜炙七分

枳殼炒六分

艾葉

甘草炙

川羌活各五分

胎至九個月一服。產時再服。易於分娩。并可杜血暈、陰脫、無乳、血塊痛等症。又方。產時有橫逆、脹柱諸症。服此神良。

當歸

枳殼

赤芍

貝母

益母草各一錢

車前子入分

好酒、童便同煎。如遇遍身拘攣。加

麻黃入分

升麻五分

吳綺園曰。產母平素血少者。臨時以當歸三錢。川芎二錢。日服一次。名佛手散。甚效。若鄉村不能備藥。忽遇橫生逆產。速以柘樹葉煎汁連飲二鍾。少頃不動。更進一鍾。至四五鍾。必能提上轉身矣。

催生如神散

百草霜取釜底心者

白芷不見火各

每服三錢。以童便、米醋調和如膏。加沸湯下。或童便、酒煎進二服。薛立齋云。此

藥大能固血。可免血乾。治逆產橫生。其功甚大。

黑神散

官桂

當歸

芍藥

甘草

炮薑

生地各一兩

黑豆炒焦去皮三兩

爲末。每服三錢。溫酒下。治熱疾胎死腹中自出。朱丹溪云。胎得煖則下。故用薑桂。冬月更宜。

催生滑胎湯

當歸一錢

川芎

枳殼

紫蘇

滑石各六分

甘草三分

木通五分

白茯苓七分

大腹皮八分

益母草三錢

無參不能服達生散者。此方亦妙。

平胃散加朴硝方

厚朴

蒼朮

陳皮各二錢

甘草五分

朴硝五錢

俱用生者。下死胎神妙。

朱紫含曰。有雙胎。一死一生者。取蟹爪煎湯服。能令生者安而死者出。

牛膝湯 治胎衣不下。

牛膝

木通各三錢

當歸二錢

滑石四錢

瞿麥一錢

黃葵子五分

張心齋曰。五六個月墮胎。亦有胞衣不下者。牛膝、官桂、川芎、當歸、蒲黃、朴硝、生

薑服之。

加味芎歸湯 治交骨不開。產門不閉。

川芎一錢

當歸二錢五分

自死龜板酥炙一錢

婦人頭髮燒存性一錢

補中益氣湯 治交骨不開。盤腸不收。膀胱墜出。

黃耆一錢五分

人參

白朮各一錢

當歸八分

陳皮

炙甘草各五分

升麻

柴胡各三分

十全大補湯 治產門不閉。

人參

白朮

茯苓

甘草

川芎

當歸

熟地

白芍

黃耆

肉桂

除耆桂爲八珍湯。治膀胱破損。

玉龍湯 治產後陰挺下墜。產戶腫痛。

當歸

芎藭

地黃

芍藥

龍骨

當歸川芎湯 治產後瘀血心疼。

當歸

川芎

香附

青皮

生地

赤芍

延胡

桃仁

紅花

丹皮

澤瀉

煎好。用童便半杯。酒半杯。沖服。

江子眉曰。益母草一兩。入童便一碗。水一碗煎服。能去污穢。不致留滯作疼。

王介庭曰。近人於產後多服紅糖。爲逐瘀煖腸之用。不知產後脾胃虛弱。甘甜

作嘔。血隨上泛。豈不誤人。且紅糖間有摻入石膏者。誤服立見危殆。產後忌食生冷。惟梨尤甚。雖食少許。卽桂附亦不能救。平素喜食生冷者。只藕不妨。

清魂散 治產後血暈。

當歸二錢

川芎一錢

荆芥七分

澤蘭八分

甘草三分

益母草三錢

身熱。加麥冬七分。

脈細。加人參一錢。童便一鍾。

小調經湯 治產後敗血流入四肢浮腫。名曰產後流注。

沒藥

琥珀

桂心

赤芍

當歸

細辛

麝香

爲末。每服二錢。薑汁溫酒調下。

車前子湯 治產後尿血。

蒲黃

芍藥

黃芩

生地

當歸

牡蠣

車前子

黃絹湯

治產傷膀胱。不能小便。滲濕苦楚。

生絲黃絹

剪一尺碎

白丹皮

白

茯苓各一錢

同煎至絹爛如錫。空心頓服。不得作聲。神效。

玉露飲

治產後無乳。

人參

茯苓

甘草

芍藥

川芎

當歸

枳殼

桔梗

又方

當歸

川芎

瞿麥

王不留行

穿山甲

麥冬

陳皮

煎熟。沖酒一杯。飲之。徐以木梳梳乳數下。乳路自通。

又酒方。治乳少。

生地

熟地

當歸

木通

牡蠣各一錢

川芎

白芍各五錢

酒十五斤

芎歸補中湯 治小產血崩腹痛暈厥。

人參

黃耆

白朮

川芎

當歸

白芍

艾葉

阿膠

杜仲

炙甘草

五味子

人參黃耆湯

治氣虛小產血下不止。

阿膠

艾葉

白芍

當歸

人參

白朮

黃耆

煨薑

大棗

調經種子奇效方 附見

大金丹至寶丸。調經妙藥也。然修合不易。此方煎劑。竟

有奇功。雖未能十有九效。乃余所見。則效者比比矣。敬爲述之。

當歸身

肥白者一錢二分

熟大黃二錢

香

附童便浸三日醋炒

白

芍

酒炒各

艾

去梗淨醋炒

真廣陳皮各七分

甘

草炙

乾

薑

炮黑各

白茯苓

丹皮酒洗

延胡索炒

川

芎

酒洗各

官桂四分

山萸肉一錢二分

右十四味。依法炮製。加煨薑二片。大棗一枚。水二碗。煎八分。空心服。渣再煎。臨臥時服。

每月經至淨後。卽服此方。一日一劑。服四五劑後。不必再服。旬日內卽能成孕。如經期不調者。每月服五劑。三月後必調經受孕也。

慈幼新書

明 江夏 程雲鵬 鳳雛輯

鄞縣 曹赤電 炳章校

卷一

稟賦

兒在母腹中。感受精氣。一月胚。二月胎。三月血脈見。四月形體成。五月能動。六月筋骨成。七月毛髮生。八月臟腑具。九月谷神入胃。十月百骸備而生。生後六十日。瞳子成。能笑語。始識人。百日任脈生。能反覆。一百八十日。尻骨生。能獨立。二百一十日。掌骨成。能匍匐。三百日。髕骨成。能獨倚。三百六十日。爲一週。膝骨成。乃能移步。落地時。身破裂者死。陰囊白者死。陰不起者死。無糞門者死。股間無生肉者死。開口如鵝聲者死。

凡週歲之間。顙顙開解。齒髮不生。手足攣縮。膝如鶴脰。身羸無肉。或四五歲不能行立。皆胎氣不足致之。若夫筋實則多力。骨實則早行。血實則形瘦多髮。肉實則少病。精實則伶利多笑語。不畏寒暑。氣實則少髮而體肥。此皆受胎氣之充足。得稟賦之隆厚者也。

呂晚邨曰。凡小兒齒遲。語遲。行遲。顙門開大。腎疳等症。皆先天不足。自睽周時。即有虛病。腎病。從幼填補。亦多可復。

初生芽兒。藉乳爲命。善爲乳母者。夏不欲熱。熱則致吐逆。冬不欲寒。寒則致咳痢。乳時不欲怒。怒則上氣顙狂。不欲醉。醉則身熱腹痛。母方吐下而乳。則致虛羸。母方積熱而乳。則變黃不能食。新房而乳。則瘦瘠交脛不能行。新浴而乳。則發吐傷神。冷熱不調。停積胸膈。結爲痰飲。遂成壯熱。壯熱不已。乃作驚癇。兒啼未定。遽以乳哺。氣逆不消。因成乳癖。懷孕而乳。致令黃瘦。腹大脚弱。名曰魘病。大抵芽兒或瘡或熱。或困倦。或口生白糜。或夜啼。或糞色變常。必非無因。病之初來。其溺必甚少。便須根究緣由。隨症調治。庶無後患。

胎症列後。

人每於初生時。多向頭額前髮際穴灸之。取其可以截風路也。此但可行之北方地寒之處。東南脆薄。似乎不宜。

臟能

心所伏者腎。所敵者肺。所喜者苦。所傷者鹹。鹵。應三變八蒸之臟。和則性情悅樂。疾主驚癇。恐悸。譫語。狂煩。涎流口角。痘主紅癍。肝所伏者肺。所敵者脾。所喜者酸。所傷者辛。辣。應初變六蒸之臟。和則魂魄壯。意智生。疾主風。攣。搐。搦。眼目赤腫疼痛。痘主水疱。肺所伏者心。所敵者肝。所喜者辣。所傷者苦。應二變七蒸之臟。和則氣爽神清。魂強。疾主喘滿咳嗽。虛痰壅盛。痘主膿疱。脾所伏者肝。所敵者腎。所喜者甜。所傷者酸。醢。應四變九蒸之臟。和則消穀食。美滋味。疾主嘔噦痞積。瀉痢潮熱。不思乳食。痘主結痂。腎所伏者脾。所敵者心。所喜者鹹。所傷者甘。甜。應五變十蒸之臟。和則嬉戲笑語精神。疾主黑齒崩沙。聾耳膿汁。痘主黑陷。

脈候

左頰者肝之部。應左手關位風木之分。額爲心之部。應左手寸口君火之分。鼻爲脾之部。應右手關位濕土之分。右頰爲肺之部。應右手寸口燥金之分。頤爲腎之部。應左手尺部寒水之分。向有初氣二氣之說。頗不應。詳見余別著脈覆中。小兒五歲以下。未可診寸關尺。惟看男左女右虎口。食指一節寅位爲風關。脈見易治。第二節卯位爲氣關。脈見爲病深。第三節辰位爲命關。脈見爲病危。色紫爲熱。色紅傷寒。色青驚風。色白疳疾。惟黃色隱隱爲常候也。色黑者多危。脈紋入掌爲內釣。紋彎裏爲風寒。彎外爲食積。病重時紋勢彎入。猶可挽回。彎外者萬不救一。五歲以上。以一指取寸關尺三部。六至爲和平。七八至爲熱。四五至爲寒。浮弦爲風癰。沉緩爲傷食。促爲驚。細爲冷。單細爲疳勞。洪爲蟲積。浮而遲。潮熱者爲胃寒。半歲以下。於眉端髮際之間。以名中食三指候之。兒頭在左。舉右手候。兒頭在右。

舉左手候。食指近髮爲上。名指近眉爲下。中指爲中。三指俱熱。外感於風。鼻塞咳嗽。三指俱冷。外感於寒。內傷飲食。發熱吐瀉。食中二指熱。主上熱下冷。名中二指熱。主夾驚。食指熱。主食滯。

胎病

小兒胎病。凡二端。在胎時。母失愛護。或勞動氣血相干。或坐臥飢飽相役。飲酒食肉。冷熱相制。恐怖驚悸。血脈相亂。蘊毒於內。損傷胎氣。此胎熱胎寒。胎肥胎怯。胎驚胎黃諸症。所由作也。又有落地時。浴體拭口。斷臍炙顙之不得法。綳絕驚恐。寒溫乳哺之乖其宜。此嘔口。臍風。鎖肚。不乳等症。所由生也。黃帝云。吾不能察其幼小。亦唯小兒臟腑嬌嫩。血氣懦弱。肌體不密。精神未充。而用藥消息之難耳。

胎熱

胎熱者。生後氣急喘滿。眼閉或目赤。眼胞浮腫。精困呵欠。呢呢作聲。遍體壯熱。小便赤。大便濇。時復驚煩。宜至寶丹研服之。木通散與乳母服之。目不開。以二妙散

溫洗之。不治。則生鵝口、木舌、重舌、紫赤丹瘤。

至寶丹

滑石六兩

甘草

木香

陳皮

莪朮

三稜各一兩

茯神

白朮

山藥

遠志

青皮各一兩五錢

甘松五錢

益智仁五錢

麝香五錢

一方。加人參一兩。

蜜丸。芡實大。硃砂爲衣。燈心湯調化服。

此卽時下所常用秘方也。不論內傷外感。變蒸寒熱。一切治之。予謂此藥。唯蒸症相宜。次則鬱熱伏暑神劑。小兒夏月。宜多服之。補而不滯。瀉而不偏。殊有妙用。

木通散 兼治小兒臍熱。小府閉。諸瘡丹毒。母子同飲。

木通

篇蓄

大黃

甘草

瞿麥

赤茯苓

滑石

黃芩

薄荷

炒梔子

車前子

補中益氣用升、柴。天道之方也。此方車、茯、瞿、薦。地道之方也。小兒稚陽氣純。天道完全。故唯此法出入調理。

二妙散

大人翳膜血絲俱治。

文蛤一兩

黃柏二錢

煎水熏洗。

胎寒

胎寒者。百日內口冷腹痛瀉白。時發戰慄。曲足握拳。晝夜啼哭不已。或口噤不開。昏昏沉睡。治以指迷七氣湯。失治則成慢驚。指迷七氣湯。一切腹痛寒熱。多啼不乳等症。皆爲陰陽不升降。氣道壅塞而作。並宜服之。

陳皮

青皮

藿香

桔梗

莪朮

香附

半夏

甘草

肉桂

益智仁

生薑

大棗

凡人身內之氣。呼吸出入。無刻不與天道陰陽之氣相通。故六淫外襲。則感而致病。翕受之理也。內氣閉塞。天道不通。升者不升。降者不降。寒熱之原也。是方疏利臟氣。神應無方。最宜領會。

學者能識陰陽消息。即不用方內藥味。吾知其必有合也。愚昧者未可與語。

胎肥

胎肥者。生下肌肉厚者。遍體血紅。滿月後漸漸羸瘦。目白。五心煩熱。大便難。時時涎溢。浴體法治之。

胎怯

胎怯者。生下目無精光。肌肉薄。大便白水。身無血色。亦浴體法治之。

浴體法

天麻五分錢

蠍梢

硃砂各五分

麝香少許

白礬

青黛各二錢

烏蛇肉三錢酒浸焙

爲末。每用三錢。連葉桃枝一握同煎十沸。溫熱浴之。勿浴背。

胎黃

胎黃者。生下遍體面目皆黃如金色。或面赤眼閉。身上壯熱。大便不通。小便如梔汁。皮膚生瘡。不思乳食。啼哭不止。母子同服地黃湯。

地黃湯

生地

赤芍

川芎

當歸

花粉

甘草

赤茯苓

猪苓

茵陳

澤瀉

胎驚

胎驚者。月內溫壯。翻眼握拳。噤口咬牙。身腰強直。涎潮嘔吐。搐掣驚啼。腮縮顙開。或頰赤。或面青眼合。凡胎風眼合。不可誤作慢驚。而用溫藥。只宜解散風邪。利驚化痰。調氣貼顙。甚則以朱銀丸治之。如初生不能服藥。以猪乳汁調牛黃麝香少許。入嚥即愈。如眉角引搐不已。用大蝦蟆一隻。活取膽。將人乳調服之。立效。

朱銀丸

此方能取胎中蘊受之毒。亦治驚積。須量與之。

水

銀一錢
研如泥
蒸棗

南星

全蠍

硃砂

亦各一錢

白附子
五錢

天漿子

蘆薈
各五錢

鉛霜

和水研

牛黃分五

白蜜七枚

片腦一字

麝香少許

蜜丸桐子大。薄荷湯食前下。

古方有當用者。不必妄爲加減。認症既真。投之立效。不敢用者。不明之罪。用而不明於症。雖用奚爲。

鎖肚

鎖肚者。胎中熱毒壅盛。結於肛門。急令婦人以溫水漱口。吸咽兒前後心臍下手足心。共七處。凡四五次。外以輕粉五分。蜜少許。溫水化服。以通爲度。如更不通。以物透而通之。金簪爲上。玉簪次之。須刺入二寸許。納入蘇合香丸。糞出爲快。若至一七不通者死。不能通而又不乳者死。

蘇合香丸

白朮

青木香

烏犀屑

香附

訶梨勒皮煨去

硃砂

白檀香

安息香別爲末無灰酒一升熬膏

沉香

麝香

丁香

草撥各二兩

龍腦

薰陸香

蘇合香油內各一兩入安息香膏

古方有三。各不同。
煉蜜和劑。旋丸桐子大。

不啼

落草不啼。有因難產。項被母夾。有因絞臍。項被臍纏。有因天寒。瘴氣所逼。有因糞門生膜。閉住兒氣。病項者。溫手摩之。口吸咂之。寒氣者。溫水浴之。以潔淨婦人舌。吸咂其舌而通之。生膜者。手拍之使破。不破以銀簪挑之。

不乳

出胎三日。不知吮乳。此惡穢入腹。腹滿氣短。亦由胎中受寒。兒腹疼痛嘔吐故也。指迷七氣。見胎寒調之。

臍風

臍風者。斷臍後。爲水濕風冷所乘。入於臍而流於心脾。令肚腹脹滿。臍腫多啼。不能吮乳。甚則風搖。指迷湯。見胎寒消息之。臍邊青黑。撮口不開。爲內搖。不治。爪甲黑不治。若因熱在胸腔。伸縮努勢。亦令臍腫。木通散。見胎熱消息之。曰消息者。未可全用本方也。落地貧富不同治。氣稟厚薄不同體。天時寒熱不

同功。醫不諳此。豈堪司命。

撮口

撮口者。氣息喘急。啼聲不出。或肚上青筋。弔疝內氣引痛。此胎氣兼風邪入臍。治宜疏利鬱結。指迷湯寒見胎去桂。加大黃、鈎藤、僵去土。或參以荊芥穗湯。

荊芥穗湯

川黃連

荊芥穗

生地黃

生甘草

大便秘。加大黃。小便少。加木通。

噤口

噤口者。眼閉口噤。啼聲漸小。舌上聚肉。如粟米狀。吮乳不得。口吐白沫。大小便不通。遇此先看其上齦有點子。即以指甲輕輕刮破。次服四順清涼飲。加木香、白蔻仁、利動臟腑。徐以指迷湯寒見胎加減調之。如口噤不能開。用生南星去皮臍爲末。加龍腦少許。合和。將指蘸生薑汁調之。擦大牙根上立開。大人中風口噤俱效

四順清涼飲

當歸

白芍

甘草

大黃

三症雖異。其源則一。大抵裏氣鬱結。閉塞不通。並宜淡豆豉汁與食。取下胎毒。甚者朱銀丸。見胎驚亦可用之。初生時。用淡豆豉汁與三五口。不特能下胎毒。復可助養脾氣。臍風撮口。不語不乳。灸男左女右湧泉穴。立愈。又法。炙蜈蚣末。入麝少許。猪乳和之。飲口噤立開。或蜘蛛去足及口。炙焦研細。和猪乳飲。亦效。更入麝少許。能治牙疳。窮鄉僻壤。藥餌難得。故備經驗治法。爲襁褓中乞命。幸毋忽之。後卷倣此。

變蒸

變蒸者。小兒生三十二日爲一變。再變爲一蒸。總五百七十六日。變蒸方足。凡變蒸身熱而脈亂。汗不出。不欲食。甚則煩啼躁渴。輕者五日解。重者八日解。其候與傷寒相似。但變蒸則耳冷。上唇發泡。狀如濁珠。若寒邪則腹中痛。啼叫不絕。爲異。大都此乃長養氣血。滋榮五臟。不可妄加施治。唯宜祕方至寶丹。見胎熱常服。若不乳多啼。或寒熱間作。陰陽不升降。指迷湯。見胎寒消息調之。

錢氏云。一變腎。二變膀胱。三變心。四變小腸。五變肝。六變膽。七變肺。八變大腸。九變脾。十變胃。寶鑑云。初變肝。二變肺。三變心。四變脾。五變腎。二說不同。其膠滯則一。夫人當長養氣血之時。陰陽變換。五行顛倒。斯理至微。一用後天推測分配。不足見造化之神妙矣。

慈幼新書

明 江夏 程雲鵬 鳳雛輯

鄞縣 曹赤電 炳章校

卷二

雜症

咽喉

咽喉與肺胃相接。爲出入樞要。種種之症。與大人不同。大抵由熱毒蘊積。致生風痰。壅滯不散。爲瘡爲腫。甚至吐嚔不通。治宜桔梗湯。或牛蒡子湯。先去風痰。然後解其熱毒。次則以上清丸。時時噙化。服之亦佳。

肉鵝者。太陽少陰之火。爲風寒壅遏。關隘不通。留連發腫。痰涎稠濁。疼痛難堪。用大烏梅一個。去核。納入蝸牛一條。灰火煨透。碾末。刺破鵝腫點之。或服清道湯。山

豆根湯。先天虛弱火泛者。巴戟湯俱效。

喉癰者。風火鬱滯喉間。蒸溼生蟲。或疼或癢。乾燥枯涸。甚至面紅耳熱而不可忍。

百部湯治之。苡仁湯調之。

牛蒡子湯 治風熱上壅。咽喉腫痛。或生乳鵝。

元參

升麻

黃芩

桔梗

木通

甘草

犀角簪

大力子

桔梗湯 咽喉微覺腫痛。聲破難語神效。

桔梗

甘草

黃芩

當歸

麻黃

桂枝

白殭蠶

馬勃

上清丸 咽喉腫痛。痰涎壅塞妙方。

薄荷

川芎

防風各二兩

桔梗

砂仁

錢各五

甘草四兩

蜜丸彈子大。不拘時嚙服。臥時更佳。

清道湯

花粉

元參

柴胡

芍藥

甘草

麻黃

桔梗

山豆根

陳達公破隘湯卽此。

山豆根湯

射干

麥冬

花粉

甘草

元參

山豆根

巴戟湯

熟地

茯苓

巴戟

麥冬

五味子

程漢章曰。少陰之火。直如奔馬。非借降泄。何以引而歸元。此方加入牛膝、澤瀉、

山萸尤妙。

百部湯

白微

紫苑

百部

元參

麥冬

甘草

五味子

大力子

白芥子

苡仁湯

熟地

麥冬

苡仁

山萸

桑皮

貝母

生地

甘草

遠公曰。服百部湯蟲死。服苡仁湯火息。更入肉桂數分。服二劑。不再發。

玉露湯 治初生喉腫。

陳茶葉

川黃連

荊芥穗

薄荷

甘草

吹藥方

膽礬

牛黃

冰片

皂角灰各一

麝五釐

玉鎖匙 治風熱喉閉。并纏喉風。

硼砂

僵蠶各一

焰硝五錢

冰片三釐

碾細盛固。臨用取出。吹喉中甚效。

京師中一醫持秘方丸藥治喉閉。獲利其廣。惟用拭面肥皂。金箔爲衣。偶爲翁曙公識破。遇江湖無藥處。以此灌之。稠痰盡吐。危症立甦。

咽喉以下十六門。名曰襟症。指孩抱中言也。然余治法。則自初生至少壯。廣爲設立焉。若夫虛勞相火熾甚。致喉齒耳目等症者。載余醫貫別裁中。姑不及。

齒

齒者骨之餘。骨者腎之絡。初生兒有重齕重齬者。骨不斂髓。故頰裏生物。與蘆薹相似。用綿裹針微刺之。令瀉血汁。先以淡鹽湯洗。次以細辛散頻擦之。齒斷上屬足陽明胃。下屬手陽明大腸。而其爲病也。責胃居多。但所傷有胃血胃氣之異。胃血傷者。喜寒而惡熱。清胃湯。胃氣傷者。喜熱而惡寒。益胃湯。

葉錫侯曰。胃病者。口極臭。腎病則否。

小兒臥時。開口當風。吸入風邪。留連不解。令齒縫酸痛。治以胡桐淚湯。胃虛濕熱壅盛。不得下行。牙斷腫痛。清胃合五苓見治之。又有牙疳出血。口臭肉爛。蘆薹丸見治之。

小兒稟賦虛怯。數歲後牙齒時疼。蟲疳風吼。九味地黃丸主之。腎氣不足。髓脈不充。七八月齒仍不出。或難出而無力嚼物。芎藭散治之。

細辛散 治一切風蛀牙疼。頤頰浮腫。

細辛

荊芥穗各一兩

砂仁

華撥

鶴虱

皂角各五錢

白芷

細椒

草烏各二錢

爲末。擦患處。有涎吐之。仍用水灌漱。

清胃湯

當歸

生地

丹皮

升麻

甘草

連翹

黃連

益胃湯

當歸

茯苓

白朮

陳皮

黃耆

甘草

防風

升麻

九味地黃丸

生地

山萸

山藥

丹皮

茯苓

當歸

川芎

史君子

川練肉

高鼓峰曰。此方直瀉厥陰風木。乃腎肝同治之法。緣蟲疳爲風木之化。有可伐之理。然伐其子則傷其母。故用五者補之。去澤瀉者。腎不宜再洩也。

胡桐淚湯

白芷

麥冬

當歸

生地

花粉

石膏

細辛

升麻

乾葛

胡桐淚

芎藭散

川芎

生地

山藥

芍藥

當歸

甘草

爲末。每服二錢。白湯下。

舌

舌者心之竅。脾之脈絡所繫。心脾壅熱上衝。故令舌腫。漸漸脹大。塞滿口中。名曰木舌。宜木通散見胎服之。烏魚散塗之。又有重舌者。亦心脾蘊熱所致。由血氣俱盛。附舌根而重生一物。形如舌而略短小。以真蒲黃和黃柏末傅之。或牙硝亦可。脾臟有熱。令舌絡微緊。時時舒出。名曰弄舌。切勿用寒藥及下之。唯宜瀉黃散。甚有飲水者。脾胃虛。津液少也。生時舌下有膜。如石榴子。或口上腭有疱。不能出聲。速用指甲搯破。或葦草割之。血出即活。若血出不止。猪脂調髮灰傅之。

烏魚散

烏魚骨 五錢

蜣螂

蒲黃 各二錢

白礬 五分

雞子黃調塗舌上。嚥津無妨。

青液散 治重舌并口瘡。

青黛

朴硝 各一

龍腦 一字

蜜調鵝羽蘸傅。

瀉黃散 治弄舌兼治木舌。

藿香葉

炒山梔

石膏

甘草

防風

口

小兒生後。宜勤看口。有口糜者。膀胱移熱於小腸。腸膈不便。上爲口糜。導赤合五苓治之。

鵝口者。初生白屑滿舌。如鵝之口。乃胎熱所致。用髮纏指上。蘸薄荷自然汁拭之。如不已。更以粟米煎濃汁拭之。外用煨過黃丹滲患處。

初生一復時。滿口上下牙斷。忽變白色。恍如齒牙。名曰馬牙驚。不治。若因將養過溫。積熱熏蒸於上。發爲口瘡。宜炒焦乾薑。同黃連爲末傅之。以木通散見胎熱與乳母服。如不愈。更以禁湯浸脚。上半日。以蜜炙黃柏炒殭蠶末傅之。立效。如只口角爛瘡。髮灰以猪脂調傅卽愈。

導赤散

生地

木通

赤茯苓

麥冬

甘草

燈心

五苓散

猪苓

赤茯苓

赤芍

白朮

肉桂

口糜散

口瘡糜爛神效。

黃柏

黃連各一兩

雄黃

沒藥各二錢

片腦五分

爲末乾滲瘡上。

耳

小兒腎氣實。其熱上衝於耳。使津液壅滯。化爲稠膿。或爲清汁。亦有沐浴水入耳中。血氣凝滯。漸生瘡臭。久乃成聾。湯氏有五耳之名。其本則一。宜龍骨散吹之。外服化毒退熱之劑。膽氣不舒。風邪乘襲。少火被鬱。兩耳腫痛。內流清水。久則變爲膿血。身發寒熱。耳

內如沸湯之響。此風火燥乾膽汁之候。治宜舒膽湯。耳中乾聒。無膿無水。痛如針刺。久則焚槁成聾矣。速宜平火湯重劑服之。或以柴胡聰耳湯消息調之。

龍骨散

龍

骨 研

明

礬 服各三錢

黃

丹 服二錢

脂

一錢

麝

香 少許同為末

先撚去膿汁。次用鵝管吹入。

吳遇齋曰。瘡在耳外。用雄黃一錢。紅棗一枚去核。包黃在內。火煨存性。取黃研細。搽上即愈。瘡在耳內。用魚首石煉存性。碾細。加硃。麝各少許同碾。吹入自愈。方鹿村曰。耳後膿瘡。用柿餅蒂七八個。燒灰。將熄時。以碗覆之。冷定為末。入輕粉一錢。香油調塗即愈。

舒膽湯

當 歸

白 芍

元 參

花 粉

炒 梔

柴 胡

石 菖蒲

平火湯

熟地

生地

麥冬

玄參

菖蒲

柴胡聰耳湯

柴胡三錢

連翹四錢

當歸

甘草

人參各一錢

蟲翅三個去足

水蛭五分

麝香少許三件另研

生薑一片

各藥煎好。去渣入三末。再煎一二沸。食少遠。熱服。

程慶其曰。有蟲入耳中。痛不可忍。極似乾聾症。用生薑擦猫鼻。取尿滴耳中。即出。

仇芭軒曰。有聾燥暴聾者。用全蠍去毒爲末。酒調滴耳中。聞水聲即愈。

目

目黑睛屬肝。白睛屬肺。瞳人屬腎。上下胞屬脾。大小角屬三焦。心者。往來機發之

輪。故目內赤者。心家積熱上攻。導赤散見主之。青者肝熱。瀉青丸主之。黃者脾熱。瀉黃散見主之。有視物不明。不腫。不痛。不赤。無翳膜。或見黑花。無眼光者。是肝腎陰虛。不可服涼藥。宜滋陰腎氣丸主之。有初生眼閉者。由產母食熱物毒物所成。以熊膽少許。蒸水洗之。日七次。如三日不開。與地黃湯服之。乳母與木通散見胎服之。乳母食熱物毒物。令兒眼赤者。消風散加減調之。時氣風熱。眼昏紅腫者。開明湯。沖和湯主之。鬪睛。牛黃膏主之。疳眼流膿生眵。龍膽飲子治之。痘毒及無辜疳入眼。羊肝散治之。初生洗拭不淨。穢汁浸漬眼眥中。兩角赤爛。至長不瘡。又有難產。轉側差遲。血壓兒首。灌注入眼。生下不見瞳人。外胞赤腫。上下弦爛。亦宜生地湯服之。四神散洗之。不可服重劑寒涼。致傷臟腑。若因肝氣上衝。腦汁大墜。翳膜捲簾。非服補腦還睛丸不可。

諸不治症。白珠如多。腦髓。翳如梅花蕊。瞳人散亂。青光瞎。白珠膿出。內翳裏睛。血脈脹出。瞳人打破。白翳貫心。烏珠突起。

瀉青丸

龍膽草

梔子仁

大黃

羌活

防

風錢各一

當歸

川芎

各一錢五分

蜜丸。竹葉薄荷湯下。

滋陰腎氣丸

熟地三兩

山藥

歸尾

丹皮

北味

柴胡錢各五

茯苓

澤瀉各二錢五分

生地酒炒四兩

蜜丸。辰砂爲衣。每十丸。空心白湯下。

張迂庵曰。人至中年。腎水衰耗。兩目昏花。極宜六味地黃丸。加枸杞、甘菊、沙苑、蒺藜常服。平素火盛者。入酒炒黃柏一兩。火虧者。入肉桂一兩。眼昏兼虛熱。紅腫澀痛者。此丸減少作湯。加枸杞、甘菊。數服自愈。不得妄用風藥。致損真元。

生地黃湯

生地

赤芍

歸尾

川芎

甘草

花粉

燈心

消風湯

防風

茯苓

蟬蛻

陳皮

厚朴

川芎

羌活

荊芥穗

白僵蠶

藿香葉

甘草

開明湯

羌活

白芷

荊芥

防風

菊花

川芎

生地

黃芩

當歸尾

蔓荊子

草決明

薄荷

燈心

生薑

沖和湯

治四時感冒。赤火之眼。極效。

羌活

蒼朮

防風

白芷

生地

黃芩

川芎

細辛

甘草

生薑

葱白

四神散

銅青

明礬

海螵蛸

煎過用各一錢

礬砂

二錢

燈籠果漿爲丸。芡實大。每用時水浸化。蒸熟取清水洗拭。

將軍冲翳散 洗一切翳障。

文蛤

苦參

升麻

薄荷

防風

荆芥

白芷

川芎

羌活

草決明

十二將軍二聖湯

黑面將軍

十二

綠聖

白

聖 各五分煎洗

程自閑曰。卽五倍子白礬銅綠耳。以其功能得邀品號。

龍膽飲子

青蛤粉 五錢

炒黃芩 二錢

羌活

龍膽草 各二錢

麻黃 三錢五分

蛇蛻

穀精草 各五分

爲末。每服二錢。茶調下。

羊肝散

蜜蒙花 三錢

青箱子

決明子

車前子 各一錢

羊肝一葉薄批。滲上濕紙裹煨。空心食之。

牛黃膏

牛黃

麝香各五

白附子炮

肉桂

全蠍

川芎

石膏各一

白芷

辰砂飛

藿香葉各二

蜜丸。芡實大。薄荷湯研化服。

賽寶萬槌膏

治老障紅絲努肉。風火爛弦重翳。如神。

盧甘石煨一兩打成小塊。放銀罐內。將火硝拌勻。用火

琥珀

珍珠

瑪瑙

珊瑚

石蟹各五

雌黃

雄黃各二分

以上用布包裹。槌碎研細。水飛過。加金銀箔各二百片。同研細。再入人乳。研十

萬下。如塵欲飛。然後用荊芥穗。草決明。防風。羌活。木賊。菊花。麝仁。千里光。各五

錢。細剉。煎水二碗。澄清熬膏。加乳汁。復熬透。調前藥槌之。萬下。如乾以膏濕之。

做成片子藏固。臨用取少許潤軟點之。

立靈散

盧甘石一錢同製

冰片

麝香各一分

熊膽二分

麝仁三分去油淨

研細點翳膜上

粉丹散

輕粉

黃丹

等分爲末。盛小竹筒吹耳內。左翳吹右。右翳吹左。奇效。

辟塵膏

治塵埃入目。揩成腫痛。發熱啼哭。

頂煙陳墨

新汲水濃磨入元明粉和成膏。折筆蘸點目內。日三五次。忌食煎炒。

吳樸公曰。飛絲入眼。亦蘸墨點之。略閉刻許。墨染絲黑。用筆挑去。

補腦還睛丸

雌黃

火煨入醋研三錢

千里光酒拌炒

兔絲子酒浸炒

川木賊去節童便浸一日

杏仁

去皮尖

羌蔚子

荊芥穗

甘菊花

羌活

防風

蛇蛻酒浸焙

石決明煨各一錢

川芎

白蒺藜

蟬蛻

蒼朮

酒蒸地黃各一兩

各自爲末和勻煉蜜丸。如彈子大。每服一九。日三次。薄荷湯或好茶送下。

大腹皮飲 治頭疼眼脹及偏正頭風神妙。

大腹皮

當歸尾

何首烏

麻黃

川芎

北細辛

鼻

鼻爲肺竅。一有風寒停滯。則氣道壅塞。津液不收。流爲濁涕。若冷結不散。久乃不聞香臭。辛夷散治之。有風寒挾熱者。則鼻乾不眠。又有乳母臥時。鼻中出息。吹著兒顙。亦令鼻塞。不能飲乳。開關散治之。

鼻淵有二症。風入膽中。移熱於腦。腦尋竅於鼻而出涕。濃而臭爲實熱症。當歸湯治之。鼻流不臭清涕。經年不瘥。爲肺氣虛寒之候。治宜石首魚腦湯。又有鬱火不宣。門戶閉塞。稠粘濁涕。或硬或黃。不嚏則脹悶難忍。嚏則鼻梁疼痛。須加味逍遙

散治之。

辛夷散

白芷

川芎

細辛

藁本

辛夷

木通

升麻

防風

甘草

開關散

香附

川芎

荊芥穗

細辛葉

白僵蠶

皂角

燒存性
各等分

爲末。用生葱白同搗成膏。紅絹包固。臥時貼顙門上。

當歸湯

當歸 五錢

元參 三錢

辛夷 一錢

炒梔 八分

貝母 五分

柴胡 三分

石首魚腦湯

訶子

甘草 各一錢

荊芥

細辛

人參各五

桔梗二錢

石首魚腦骨五錢煨存性

爲末。將上件煎好。去渣入末。再煎一二沸服。

加味逍遙散

當歸

白芍

白朮

茯苓

甘草

陳皮

柴胡

桔梗

黃芩

白芷

半夏

顛

顛陷者。血氣虛弱。不能上衝腦髓。或因泄利下陷。不得平滿。總以狗頭骨炙黃爲末。入雞子清調傅之。

顛填者。乳哺不調。致傷寒熱。逆氣衝填。突然高起。毛髮短黃。顛惕自汗。寒氣則牢鞭不已。熱氣則柔軟不支。寒者溫之。熱者涼之。兼調其氣。而折其逆。自無不愈。顛解者。小兒年大。頭縫開解不合。由腎氣不足。腦髓空虛。如樹無根。豈堪培養。斯時也。惟以六味地黃加龜板爲丸。空心溫水服之。外用防風柏子仁去油爲末。乳

汁調塗。或以華陰細辛、肉桂、乾薑爲末。乳汁調傅。亦多有效。
六味丸

地黃八兩

山萸肉

山藥各四兩

茯苓

澤瀉

丹皮各三兩

程格思曰。張仲景原方有桂附各一兩。名八味丸。錢氏謂小兒稚陽。無補陽之理。故去桂附治之。近世俗醫并六味亦不敢與小兒服矣。

頤

滯頤者。脾胃虛冷。涎流出而漬於頤間。不能收約。大宜溫脾。薑朮散主之。或入仙糕加木香、白蔻仁亦妙。

薑朮散

半夏

木香各五錢

川白薑

白朮

青皮

陳皮各五分

糕餅丸。麻子大。一歲十丸。米飲下。

八仙糕

人參五錢

苡仁

芡實

山藥

茯苓

蓮肉各四兩

白米粉五升

白洋糖任用

臍

臍爲有生之蒂。內通臟腑。偶或汁出。或赤腫。或生瘡。俱爲風濕相乘。當用白石脂末焙。出火氣。傅之。日三度。或油髮灰傅。或當歸末傅。或蝦蟆灰傅。亦可。安臍散

瓜蒂

南星

白斂

赤小豆

斷臍時。以四藥等分爲末。每三錢。用芭蕉自然汁。調塗四傍。能去濕固氣。王介庭曰。斷臍時。以蘄艾爲撚子。香油浸濕。燒臍帶至焦方斷。斷後用軟帛厚棉裹束。每日看之。勿令兒尿浸潤。可以豫防臍風。楊涵一曰。臍帶落下。放新瓦上。煨存性。碾細。每一分。用飛過硃砂五釐和勻。外以黃連、當歸、生地煎汁。調成稀餵。搽乳上。與兒吮吃。一日令盡。次日撻下黑糞。

可免痘密。且無瘡痕。

語遲

言心聲也。母有驚邪。兒感其氣。心神不守。舌本不通。菖蒲丸主之。

菖蒲丸

人參

麥冬

川芎

當歸

遠志

菖蒲 錢各二

乳香

硃砂 錢各一

蜜丸麻子大。每服十丸。粳米湯下。

夜啼

陰盛於夜。小兒臟冷。遇夜則陰極發躁。寒盛作疼。故夜啼而日歇。鈎藤散主之。

鈎藤散

茯神

茯苓

川芎

當歸

木香

甘草

鈎藤

生薑

大棗

如或心熱煩疼而夜啼者。必面赤舌白。小便赤澀。卽去當歸、木香另爲末。如辰砂一錢同研。少以木香煎湯調服。有觸犯禁忌及驚駭者。服新安金藥。程書焉曰。夜啼一症。有用燈花末塗乳頭者。有用燈心湯研化燈花四五粒而飲之者。有用井邊草。或雞窠中草安臥蓆下。不令母知者。俱有意焉。

龜胸

胸高臍滿。其狀如龜。此肺家熱邪。由乳母多用五辛酒麵無度。或夏月熱乳所致。宜服杏仁煎。

杏仁煎

川大黃

天冬

杏仁

百合

木

通各一錢二分

桑皮

葶藶各五分

石膏八分

臨臥時服。

龜背

小兒生下。不能保護。客風入於骨髓。或坐蚤勞傷氣血。多成痼疾。間有灼艾收功者。肺俞穴第三椎骨下兩傍各一寸五分。膈俞穴第七椎骨下各一寸五分。以小兒中指中節爲一寸。艾炷如小麥大。灸但三五壯爲止。內服松蘿丹。

松蘿丹

花 松

枳 殼

防 風

獨 活
各一兩

川 大 黃

麻 黃

前 胡

桂 心
各五錢

蜜丸黍米大。粥飲服。

鶴節

小兒肌肉瘦薄。骨節呈露。如鶴之膝。此先天稟受精髓不充。亟以六味地黃丸。見加鹿茸、牛膝治之。緩則必成廢疾。

行遲

小兒髓不滿骨。血不榮筋。故軟弱不行。虎骨飲治之。或六味丸。加牛膝、五加皮、酒

炙鹿茸亦可。若稟受肝氣怯弱。致兩足攣縮。兩手伸展無力。須薏苡仁丸治之。
虎骨飲

虎脰骨

乾地黃

當歸身

棗仁

茯苓

川芎

防風

牛膝

肉桂

爲末。每服一錢。粥飲調入酒少許。日二次。

苡仁丸

秦艽

當歸

苡仁

棗仁

防風

羌活

等分蜜丸。芡實大。每一丸。荊芥湯研化。入麝一釐服。

五軟

小兒生後。頭項手足肉口皆軟。乃先天諸陽之氣不足也。頭項症。地黃丸見服之。甚者星附膏貼之。手足肉口症。補中益氣湯主之。覩保有因吐瀉之久。顙目頓陷。

天柱骨倒。補中加附子治之。地黄丸料兼服之。

余子敬曰。肉軟者。肉少皮寬。口軟者。食少舌舒。皆脾胃之症。又有初生。遍身赤肉。全無皮殼。或有皮如魚胞。如水晶。亦產母脾氣不足所致。無皮者。以粳米粉拌黃土傅之。魚胞水晶者。蜜陀僧碾細末傅之。更有炊赤發熱者。石膏碾細傅之。

星附膏

南星

附子

等分爲末。用生薑自然汁調傅。

五硬

薛氏曰。五硬者。仰頭取氣。難以動搖。氣壅作痛。連於胸膈。脚手心冷而硬。此陽氣不營於四末也。又曰。手足冷而硬者。獨陽無陰也。難治。若肚筋青急。爲木乘土位。速宜六君子湯加炮薑肉桂升麻柴胡以復其真氣。如係風邪客於四末。而令硬冷者。須從驚風症中求之。

六君子湯

人參
半夏

白朮
炙甘草

茯苓

陳皮

慈幼新書 卷二 雜症 五硬

