

活  
幼  
心  
書

三

中國醫學大成第十集

兒科類甲  
兒科叢刊之一

活幼心書 下

上海大東書局印行

# 活幼心書

元 衡陽 曾世榮德顯編次  
鄞縣 曹赤電炳章圖校

## 卷下 信效方

### 湯散門

#### 湯類

#### 日生湯

治吐瀉痢後。將傳慢驚慢脾。神昏脈弱。飲食不進。睡露揚睛。晝輕夜重。急宜投解。  
北南星一兩剉破瓦器盛東壁上同醋煮少時漉乾切片焙 人參去蘆 冬瓜子仁  
右件咬咀。每服二錢。水一盞半。薑三片。慢火煎七分。候溫無時少與緩服。投之急必吐。

此後應諸湯散。因劑。所述服藥次序。不過言其大略。然煎煮調化。分數湯使下。

法。尤在臨時量兒大小。以意加減。或多或少。隨病輕重用之。餘皆倣此。再不繁引。

牛蒡湯

主傷風發熱煩躁鼻塞氣喘。痰嗽驚啼。及諸瘡赤紫丹毒。咽喉腫痛。

牛蒡子

三兩略少研碎

大

黃半兩

防

風去蘆

薄

荷去老梗二味各一兩

荆

芥去根老梗四兩

甘

草錢一兩一

右件咬咀。每服二錢。水一盞煎七分。無時溫服。

黃芩四物湯

理諸瘡丹毒。赤瘤燥癢。

黃

芩一兩

當

歸酒洗

生

乾地黃

赤

芍藥

川

芎四味各半兩

何

首烏去粗皮

草

烏炮去皮

玄

參三味各錢半

甘

草六錢

薄

荷葉二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞煎七分。無時溫服。

耆歸湯

治小兒稟賦素弱。豆瘡出不快者。及肝虛目視不明。

黃耆一兩蜜炙

當歸酒洗乾

白芍藥

川芎三味各半兩

甘草三錢炙

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

枳實湯

主傷風傷寒。胸滿氣促。咳嗽不活。食多夾痰吐出。

枳實去瓢剉片麥麩炒微黃

赤茯苓去皮二味各半兩

甘草六錢

半夏七錢湯洗乾

桔梗七錢半剉炒

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

小柴胡湯

治傷寒溫病。身熱惡風。胸滿脇痛。煩渴嘔噦。小便不利。大便秘硬。能解表裏邪毒。

痰嗽氣喘。

柴胡去蘆二兩

半夏如前製

黃芩

人參去蘆

甘草四味各七錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。無時溫服。或去棗。加薄荷同煎。

防己湯

治感冒風溼之氣。失於解表。流注兩足疼痛。至兩膝浮腫。不能屈伸。傳成癱瘓。

防己去黑皮

麻黃去節存根功全表裏剉碎湯泡過焙乾

薄荷桂去粗皮三味各半兩

赤芍藥一兩

赤茯苓去皮一兩

蒼朮米泔水浸一宿去粗皮漚乾剉片用炭炒至微黃色一兩

甘草炙七錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。空心熱服。或入薤白同煎。

防風湯

治急驚後。餘熱未退。時復手足搐掣。心悸不寧。及風邪中入肺經。兩目視人。開眵不常。

防風去蘆

川芎

大黃

白芷

黃芩

甘草六味各半兩

細辛去葉二錢

薄荷葉二錢

右件剉焙爲末。每服一錢。用溫湯無時調服。

知母湯

治齁齁氣喘。痰鳴發熱。咳嗽惡風。

知母

甘草

二味各半兩

貝母

羌活

滑石

大黃

小麥子

五味各三錢

麻

黃如前製

苦葶藶

訶子肉

三味各一錢半

薄荷

去梗二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

白芍藥湯

治冷痢腹痛。及誤汗誤下。卽壞證傷寒是也。並宜先服。次投對證之劑。

白芍藥

半兩

澤瀉

去粗皮七錢半

甘草

三錢炙

薄荷

桂去粗皮一錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。空心溫服。誤汗誤下。加人參。南木香。各二錢。

錢。臍下痛。入生薑及鹽同煎。加鉤藤亦好。

茯苓厚朴湯

主傷寒傷風。夾痰嘔逆。並吐瀉後。喉涎牽響。飲食減少。脾胃氣虛。

白茯苓

去皮

半夏

如前製二味各七錢半

甘草

三錢炙

厚

朴五錢去粗皮剉碎每一斤用生薑一斤薄片切爛杵拌勻釀一宿慢火炒乾用

右件咬咀。每服二錢。水一盞半。薑三片。煎七分。無時溫服。或加棗一枚。去核同煎。

扶神湯

治心氣不足。虛而驚悸。日常煩哭。及嬰孩生下。羸瘦多驚。宜子母同服。自然有效。

茯

神去皮木根一兩人

參去蘆半兩

甘草炙二錢

當歸去尾酒洗半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。有微熱煩躁。入麥門冬。去心同煎。

守中湯

思。理春夏相交。陰溼氣重。中傷脾胃。致腹痛泄痢。經久不止。漸傳手足浮腫。飲食少

桔

梗去蘆剉炒

蒼

朮如前製二兩白

薑四錢炮

甘草六錢炙

右件剉焙爲末。每服一錢。空心沸湯調服。咬咀水煎亦可。或用薑棗

瀉肺湯即瀉白散

主傷風後。五心煩熱。咳嗽喘促。脣紅頰赤。發渴引飲。

桑白皮剉炒

地骨皮淨洗焙乾二味各二兩

甘草炙三錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。粳大米百粒。煎七分。食後臨臥溫服。或不拘時。

五和湯

主宣利藏府積熱。調和榮衛。

當歸

酒洗

赤茯苓去皮二味各半兩

甘草炙

大黃

枳殼

水浸潤去殼剉片麥熟炒微黃三味各七錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

養藏湯

主生津益氣。溫腸止痢。

人參

去蘆

甘草

炙二味各二錢半

白芍藥

白朮

二味各半兩

南木香

肉桂

去粗皮二錢。去蘆皮二錢。麝香殼蜜水炒碎。

肉豆蔻

訶子肉

三味各一錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。空心溫服。或入倉米同煎。

貝母湯

主百日內嬰孩咳嗽有痰。

貝母 一兩

甘草

生

半錢

右件剉焙爲末。每服一字或半錢。用陳大米煎湯。空心調服。痰盛。淡薑湯調下。

固真湯

主吐瀉痢後。胃虛脾慢。四肢口鼻寒冷。沈困不省人事。

人參 去蘆

附子

湯浸

炮

白茯苓 去皮

白朮

二錢

各半

山藥 去黑皮

黃耆

蜜炙

肉桂 去粗皮

甘草

四錢

紙裏煨透

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑三片。棗一枚。煎七分。空心溫服。或無時。

生地黃湯

治胎黃。乳母服。嬰兒亦可少與含嚙。

生乾地黃

赤芍藥

川芎

當歸

酒洗

天花粉

五味各半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

薑橘湯

治脾慢胃冷嘔吐不止。

白

薑二錢

陳橘皮

去白一兩

粉

草

炙三錢

右件剉焙爲末。每服半錢或一錢。用溫棗湯調化。空心少與緩服。

理中湯

主溫脾煖胃。冷吐冷瀉。及治氣虛中寒腹痛。

人

參去蘆

白

朮

二味各一兩

乾

薑

炮

粉

草

炙二錢半

右件剉焙爲末。每服半錢或一錢。用溫白湯空心調服。

桂枝湯

治太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。嗇嗇惡寒。翕翕發熱。鼻

鳴乾嘔者。

桂

枝去粗皮

芍

藥

二味各一兩半

甘

草

一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。不拘時溫服。

麻黃湯

治傷寒頭疼發熱。身痛無汗喘滿。又治太陽病脈浮緊無汗。發熱身痛。八九日表證不解者。

麻黃

去眼節一兩半

桂枝

去粗皮一兩

甘草

半兩

杏仁

三十五粒湯去皮

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

獨活湯

治驚癰鶴膝。及中風溼。日久致腰背手足疼痛。晝輕夜重。及四肢痿痺不仁。

川獨活

黃色如兔眼者佳半兩

當歸

酒洗

白朮

黃耆

蜜炙

薄荷

桂皮去粗

川牛膝

酒洗五錢

甘草

炙三錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。薤白一根。煎七分。空心熱服。或無時。

五黃湯

主解利偏身癰癰惡核發熱。及丁黃腫毒丹瘤。

黃耆

生用一兩

黃連

黃芩

黃檗

大黃

四味各二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。蜜一大匙。煎七分。無時溫服。

化毒湯

解風熱上攻。咽喉腫痛。飲食不便。

桔

梗剉炒  
半兩

薄荷葉

荊芥穗

甘

草

二錢半  
各

山豆根

取淨皮  
一錢半

牙硝

礪砂

朴

硝

雄黃

硃

砂五錢  
各

右前五味焙爲末。後五味入乳鉢細杵。同前藥末一處再杵勻。每用一字至半錢。乾點舌上化下。或以溫湯濃調。少與含嚥亦可。

青木香湯

治小兒陰莖無故而腫。或痛縮。初因陽明經有風熱。溫氣相傳。所以如是。法當寬此一經。其證自瘳。蓋陽明受病。不能養其宗筋故也。宜服之。及咳嗽痰喘氣促。

青木香

去蘆

枳

殼如前製  
二兩

甘草  
二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

排風湯

治中風狂言。失音不語。精神昏困。驚癰鶴膝等證。及腫疾才瘳後。偶感外風。滿面

徧體虛浮。並宜可服。

白蘚皮

白朮

白芍藥

薄

桂去粗皮

防風去蘆

川芎

當歸酒洗

杏仁湯泡去皮尖

甘草炙九味各半兩

川獨活

麻黃去根節

白茯苓去皮三味各七錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

中和湯

此藥大能通和表裏。溫養脾胃。勻調氣血。順正陰陽。發散風寒。辟除腥穢。善使豆瘡易出易收。不致倒靨黑陷。傳變危急。兼治徧身癰癤已潰未潰。排膿止痛。自然消釋。常服清神駐顏。明目健脾。真元益固。邪氣無干。

人參去蘆

厚朴如前製

當歸酒洗

防風去蘆

白芷

肉桂去粗皮

桔梗

川芎

白芍藥

沉香

檀香

乳香

藿香葉

紫蘇葉

黃耆蜜炙

甘草十六味各半兩

右件咬咀。用無灰酒四兩。重拌勻曬乾。天陰略焙。每服一錢。水一盞。煎七分。無

時溫服。

人參甘桔湯

感冒風熱。火氣熏逼。豆瘡蘊毒上攻。咽喉腫痛。痰氣不順。咳嗽失音。飲食減少。並宜治之。

人

參土蘆

桔

梗劉用蜜水

甘

草半生半炙三錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。風熱加荊芥、杏仁煎。豆瘡後目生翳膜。用蟬殼淨洗去嘴足同煎。咽痛入礪砂末煎。去渣無時含嚥。

人參芎歸湯

治九道血妄行。

人

參土蘆

川

芎

當

歸酒洗三味各半兩

荊

芥二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

五拗湯

治感風溼。及形寒飲冷。痰嗽咳逆。連聲不已。

麻

黃根節

杏

仁皮不去

荊

芥梗不去

桔梗四味各五錢用蜜水炒劉用

甘草半二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

六和湯

治心脾不和。氣不升降。霍亂吐瀉。咳嗽胸滿。頭目疼痛。嗜臥倦怠。并陰陽不分。冒暑伏熱煩悶。成痢中酒作渴。心逆畏食。

人參去蘆 縮砂仁

甘草炙

杏仁湯泡去皮尖

半夏如前製五兩 藿香

厚朴如前製二兩

白扁豆炒熟劉去殼一斤用生薑一斤碎切爛黃拌勻釀經一宿焙乾

藿香

赤茯苓去皮 木瓜各一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。無時溫服。或入鹽半字同煎。

黃耆六一湯

治諸虛不足。煩躁驚悸目揚。身體軟弱。不思飲食。

黃耆六兩蜜炙 甘草炙一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。棗二枚。煎七分。無時溫服。

真武湯

治傷寒諸疾後。表裏俱虛。煩渴有熱。徧身汗出。

白茯苓去皮

白芍藥七錢半

白朮

附

子

如前製二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

牡蠣大黃湯

治三五歲小兒。感受溫溼之氣。侵襲膀胱。致陰莖膚囊浮腫作痛。

牡蠣

用熟黃泥包裹夾水煨透出地上候冷用

大黃

紙裹水浸透炮過候冷二味各一兩

右件剉研爲末。每服一錢。用無灰溫酒空心調服。不能飲者。溫湯調。少入酒同服。

坎離湯

治虛喘晝輕夜重。食減神昏。

華澄茄

石菖蒲二錢各

白朮

白茯苓去皮

南木香三錢各

甘草炙

半夏

如前製

紫蘇子

略炒杵碎三錢

右件ㄗ咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

清脾湯

治諸瘧久不瘥者。脾胃虛弱。形容憔悴。

厚朴

如前製

烏梅

打破

半夏

如前製

良薑

剉用東壁土炒

青皮

去白四味各半兩

甘草

炙三錢

草果

炮去殼取仁二錢半

右件ㄗ咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。未發前併三服。仍忌生冷油膩時果毒物。

麥門冬湯

解斑疹熱毒。頭痛煩悶。狂渴妄語。

麥門冬

去心

乾葛

二味各三錢

人參

去蘆

赤芍藥

升麻

赤茯苓

去皮

甘草

五味各二錢

石膏末

五錢

右件ㄗ咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

化丹湯

解利丹毒。徧身燥癢。發熱煩啼。

川獨活

射干音干

麻黃製如前

青木香

甘草

黃芩

薄荷桂皮去粗

石膏末入味各五錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

苗香湯

和脾胃。進飲食。理腹痛。散邪氣。

苗香炒

良薑劉用東壁土炒二味各一兩半

蒼朮如前製二兩

甘草炙一兩

右件劉焙爲末。每服一錢。燒鹽湯空心調服。

大柴胡湯

疏利風熱。痰嗽腹脹。及裏證未解。

柴胡

去蘆四兩

黃芩

芍藥

二兩各一兩半

大黃

半

夏如前製二味各七錢半

枳實

如前製七錢

甘草故加用小方

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑三片。煎七分。無時溫服。

快膈湯

理胸膈不快。飲食少進。亦能順氣和中。消導宿滯。

人參去蘆

青皮去白

縮砂仁

烏藥

良薑如前製

香附子

甘草炙七味各一兩

右件剉碎爲末。每服一錢。溫鹽湯空心調服。

升麻湯

治時行瘟疫。頭痛發熱。肢體煩疼。及瘡疹未見形先。疑貳之間。並宜可服。大能和順血脈。解諸餘毒斑證等疾。

升麻

乾葛

芍藥三味各一兩

甘草半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

小陷胸湯

治六七歲已上之兒。小結胸證。

半夏如前製

淨黃連

栝樓實各半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞半。白蜜一大匙。煎至八分。無時溫服。未效再投。得微下黃涎爲好也。

散類

百解散

主和解百病。虛慢陰證不宜。

乾葛二兩

升麻

赤芍藥二兩各

黃芩一兩

麻黃如前製七錢半

薄桂去粗皮二錢半

甘草一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑三片。葱一根。煎七分。無時溫服。有風熱盛。加薄荷同煎。

五苓散

解傷寒溫溼。暑毒霍亂。分陰陽。理煩渴。

澤瀉去粗皮二兩半

白茯苓去皮

猪苓去皮

白朮三兩各

肉桂去粗皮七錢。不過火。

右前四味剉焙。入桂同研爲末。每服二錢。溫湯調下。不拘時。若作咬咀。用赤茯苓分兩同前。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。其餘活法。明本論中。隨證詳述。

當歸散

調順氣血。和解表裏。爽利心腹。疏理百病。及治溫熱停積。白痢。煩躁不寧。

當

歸去蘆洗

赤芍藥

二兩各

大

黃

半生半炮

川

芎

麻

黃

如前製

甘

草

半生半炙

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

三解散 一名甯心湯

主上焦蘊熱傷風。面紅目赤。狂躁氣急。渴水驚啼煩悶。丹毒口瘡。痰嗽搐掣。

人

參

去蘆

防

風

去蘆

天

麻

茯

神

去皮木根

鬱

金

無以山

白附子

大

黃

七錢半

赤芍藥

黃

芩

僵

蠶

三味各五錢

全

蠍

去尖毒

枳

殼

二錢如前製

粉

草

六錢

右件剉焙爲末。每服半錢至一錢。用溫薄荷湯。無時調下。或燈心湯。

勻氣散

主調補通利後。及冷疝腹痛。氣滯不和。

桔梗二兩

陳皮去白一兩

縮砂仁

茴香二兩各

白薑二錢炮

粉草四錢

右件劉焙爲末。每服半錢。或一錢。空心沸湯調服。冷疝腹痛。燒鹽湯調下。

雄黃散

主暴中急慢驚風。駒胎痰涎滿口。及雨侵閉汗不通。或涼或熱。坐臥生煩。

雄黃紅亮者二錢半

白藥去黑皮

川烏頭炮裂去

草烏炮裂去

天麻明亮

川芎五兩各半兩

右除雄黃外。餘五味劉焙。同雄黃爲末。驚風痰壅。每服半錢。或一錢。用薑汁。茶清調下。發汗。水薑。葱。薄荷同煎。並投三服取效。

惺惺散

主傷風傷寒。痰嗽咳逆。理虛和氣。寧心清肌。止啼去煩。利咽膈。解失音。

人參去蘆半兩

桔梗劉破

白茯苓去皮

白朮

天花粉四兩各一兩

細辛去葉二錢

防風去蘆

川芎

南星生用三味各二錢半

甘草炙七錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。薄荷三葉。慢火煎七分。無時溫服。

木通散

主上膈熱。小府閉。煩躁生嗔。及淋證諸瘡丹毒。

木

通

去皮

地篇蓄

去老梗二味各半兩

黃

甘草

赤茯苓

去皮三錢

瞿

麥

去乾梗

滑石末

山梔仁

車前子

黃

芩

五味各二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。燈心三莖。煎七分。無時溫服。或入薄荷同煎。

烏梅散

治腹疼。及初生嬰孩臍下冷痛疝氣等疾。

烏

梅

和核

玄胡索

粉

草

半生半炙三味各五錢

乳

香

沒

藥

鈎

藤

和鈎三味各二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。空心溫服。

黃金散

解口內舌上瘡毒。及治豆瘡後目生翳膜。

黃

檠

去粗皮用生蜜潤透烈日下曬乾再塗上蜜凡經十數次爲度

粉

草

二味各一兩

右件剉焙。研爲細末。治口瘡。用藥末乾點患處。或用麥門冬熟水調點舌上。令其自化。治豆瘡。後目生翳膜。湯泡澄清。無時頻洗。仍投糖煎散。柿煎散二藥。

平胃散

主脾胃不和。嘔逆噦酸。霍亂腹痛。

厚

朴

如前製

陳

皮

去白二味各二兩半

蒼

朮

如前製四兩

甘

草

一兩

右件剉焙爲末。每服半錢至一錢。薑棗煎湯。空心溫服。燒鹽湯亦好。

七寶散

治時氣傷風傷寒。頭昏體熱咳嗽。及脾胃肺藏不和。口中腥氣異常。或牙縫微有鮮血。兼調理諸病後小證得中。以其品味不僭不燥爲佳。

紫

蘇

去老梗

淨

香

附三兩各二味

陳

皮

去白

甘

草

二味各一兩半

桔

梗

二兩半炒

川

芎

白

芷

二味各一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。咳嗽加製半夏。口腥氣入鹽煎。調理諸疾加棗子煎。

三稜散

主諸般停滯。疳積發熱。瀉痢酸醜。水穀不化。常服和脾胃。進飲食。長肌肉。益神氣。

人參去蘆七錢半

三稜炮裂

淨香附一二兩半

青皮去白

益智仁

陳皮去白

半夏如前製

枳殼如前製

神麴炒

穀芽洗焙

莪朮醋煮透焙

大黃半生

紫蘇去老梗十兩

甘草半生半炙

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。倉米百粒。煎七分。無時溫服。氣虛勞加白

茯苓一兩。

立消散

治膀胱久受熱毒。致陰器膚囊赤腫脹痛。

赤小豆

赤芍藥

枳殼生用

風化朴硝臨入勻

商陸五味各半兩

右件不過火。剉曬為末。柏枝煎湯。候冷調二錢。或三錢塗腫處。仍服咬咀五苓

散。加車前子。薏苡仁。水煎。

天竺黃散

主上焦風熱。口鼻生瘡。兩目赤腫。咽膈不利。痰涎壅滯。氣不通暢。驚搐煩悶。神思昏迷。

天竺黃

鬱

金

無以山  
梔仁代

茯

神去皮

甘

草

四味各  
半兩

硼砂

牙

消

白

芷

川

芎

僵蠶

去絲

枳

殼

如前製六味  
各二錢半

硃

砂

水飛  
二錢

麝香

一字

蟬

殼

十五洗去  
泥土翳足

右除硼砂、牙消、硃砂、麝香四味。乳鉢細杵。餘九味焙乾末。同入乳鉢內再杵勻。每服半錢。或一錢。溫薄荷湯。無時調服。或麥門冬湯。

連牀散

治滿頭如癩瘡毒。及手足身上。陰器膚囊。癢則抓爛。黃汁淋漓燥痛。

淨黃連

一兩

蛇牀子

去埃土  
半兩

五倍子

去內蟲屑  
二錢半

輕

粉

十五  
貼

右前三味。曬乾爲末。再入乳鉢內。同輕粉杵勻。用清油稀調二錢。或三錢。塗搽患處。必先以荊芥和葱煮水。候涼淨洗拭乾。後傅藥。

川草散

治腹痛下痢赤白不拘遠近。

川芎

白芷

甘草

半生半炙三味各七錢

赤芍藥

當歸酒洗

淨黃連

三味各五錢

右件剉焙爲末。每服半錢至一錢。白痢白薑湯調。赤痢甘草湯調。赤白痢溫米清湯調。並空心服。

柿煎散

治豆瘡後目生翳膜。

白菊花

菉豆殼

穀精草

三味各一兩

右爲咬咀。每服二錢。乾柿一枚。粟米泔汁大盞。慢火煎乾去渣。食後臨睡。止喫柿肉。一日三枚。倍加尤好。如嬰孩小。乳母可服。或用煮過柿子去核。薄切焙爲細末。抄半錢。溫米泔水調化。無時與兒服亦可。

拂毒散

治諸風熱陰毒腫核已結成未穿潰。或正發者。

半夏夏一兩

貝母

大黃二兩各

朴消

五倍子

去內蟲屑二味各二錢半

右件剉焙爲末。用醇醋調一錢或二錢塗患處。如乾再塗。仍服疏風化毒之劑。餘藥成末。除朴消臨入杵勻用。

金鈴散

治疝氣腹痛。投諸藥後。瘡而復作宜服。

金鈴子肉六錢

三稜炮剉

莪朮醋煮

青皮去白

陳皮

去白四味各二錢半

赤茯苓去皮

茴香二兩各

南木香二錢

甘草

炙四錢

檳榔

枳殼製如前

鈎藤和鈎三錢

右除檳榔木香不過火。餘十味剉焙。仍同木香。檳榔爲末。每服半錢至一錢。仍用炒茴香煎無灰酒空心調服。不飲酒者煎炒茴香湯調下。

消黃散

治風熱溫氣上攻。舌硬腫大不消。

風化朴消

真蒲黃二兩各

右蒲黃曬乾爲末。同朴消乳鉢內細杵勻。每用一字至半錢。點揩舌上下。

疏風散

主小兒薄劣。跌觸頭腦。或弄刀錐。因而破血感風。致面目傷痕浮腫。

荊芥穗一兩

防

風

去蘆二半

甘

草

半生半炙二錢

右剉焙爲末。每服一錢。用無灰溫酒調服。或葱湯亦好。

陳氏木香散

能和表裏。通行津液。清上實下。扶陰助陽。及治腹脹瀉渴。溫壯豆瘡。

南木香

厚

桂

去粗皮

陳

皮

去白

訶子肉

丁香

人

參

去蘆

赤茯苓

去皮

半

夏

如前製

甘

草半生炙

大腹皮

淨洗

前

胡

去蘆十一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

陳氏異功散

能除風寒溼痺。調和陰陽。滋養血氣。使豆瘡易出易斂。不致癢塌瀉痢。

南木香

當

歸

酒洗

人

參

去蘆

肉豆蔻

陳皮去白

丁香

白茯苓去皮

厚桂去粗皮

白朮

厚朴如前製

半夏如前製

附子如前製二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。空心溫服。或不拘時。

羌活散

治傷風時氣。頭痛發熱。身體煩疼。痰壅咳嗽。失音鼻塞聲重。及解時行下痢赤白。

人參去蘆

羌活

赤茯苓去皮

柴胡去蘆

前胡去蘆

川芎

獨活

桔梗剉炒

枳殼如前製

蒼朮如前製

甘草十一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。薄荷三葉。煎七分。無時溫服。發散風邪入

葱白同煎。痢證薑倉米煎。

香薷散

主夏秋藏府冷熱不調。或飲食起居不節。致吐痢心腹疼痛。發熱煩悶。身體拘急。

或脚轉筋。四肢厥冷。有似陰證。但口氣溫。脈按沈緊爲驗。

陳香薷去老梗

白扁豆如前製

厚朴如前製二味

右三味。六兩。咬咀了。用無灰酒三兩拌勻。仍曬乾。或焙。臨入。咬咀。生甘草一兩。和勻。每服二錢。水一盞。煎七分。去渣。以瓦器盛在水中。沈溫。不拘時服。如熱極。或瀉痢中有鮮血者。加淨黃連一兩。細剉拌勻。名黃連香薷散。下法如前。

瀉黃散

治胃虛脾實。生熱煩渴。頭痛惡心。

藿香葉七錢

梔子仁

防風去蘆二味各一兩

甘草四錢

石膏末八錢

右前四味。剉。同石膏末。用酒蜜微炒香。爲咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。空心溫服。

調元散

主稟受元氣不足。顛顛間解。肌肉消瘦。腹大如腫。致語遲行遲。手足如癰。神色昏慢。齒生遲者。服之有效。

乾山藥去黑皮

人參去蘆

白茯苓去皮

茯神去木根

白朮

白芍藥

熟乾地黄酒洗

當歸酒洗

黃耆 蜜水塗炙入  
味各二錢半

川芎

甘草 炙二味  
各三錢

石菖蒲 二錢

右爲呖咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。無時溫服。如嬰孩幼嫩。與乳母同服。

醒脾散

主醒脾養胃。止吐痢。進飲食。及調理病後神昏目慢。貪睡多困。脈弱氣短。微有痰涎。並宜投服。

人參 去蘆

白茯苓 去皮

藿香葉

白朮

甘草 炙五錢  
各五錢

丁香 香  
四十粒  
不見火

大南星 入錢剉作小塊  
裹水透溼炮過用

縮砂仁 四十

右爲呖咀。每服二錢。水大盞。薑三片。冬瓜子仁五十粒。杵碎慢火煎七分。空心緩投服之。急必吐。

醍醐散

治吐瀉後。調和脾胃。消進飲食。及丁癸哺露。虛熱煩渴。氣逆心惡。

陳皮去白

縮砂仁

厚朴如前製

麥芽洗淨焙乾

烏梅和核五味各五錢

良薑如前製

乾葛

烏藥三味各二錢半

草果仁炮二錢

甘草炙三錢

右爲咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。鹽少許。煎七分。空心溫服。

二聖散

治風痰壅閉。語音不出。氣促喘悶。手足動搖。似搐非搐。

訶子十個大者半生半炮去核

大腹皮洗淨焙乾五錢

右爲咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

補肺散

治久患咳嗽。肺虛氣促。有痰惡心。

阿膠一兩半剉炒

白茯苓

馬兜苓去老梗

糯米三味各半兩

杏仁二十一粒湯泡去皮尖

甘草炙四錢

右爲咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

安神散

治吐瀉諸病後。心虛煩悶。觸物易驚。氣鬱生涎。涎與氣搏。睡不得寧。預防變生他證。

人

參去蘆

白茯苓去皮

半夏製如前

甘草炙

陳

皮去白

枳實如前製六錢

右爲咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。竹茹小團。煎七分。無時溫服。有微熱微渴。入麥門冬去心同煎。

燒鹽散

治走馬疳。牙根肉潰爛黑臭。

橡

斗不拘多少

右件每用大者兩個。入鹽滿殼。蓋作一合。或五六個。或十數個。安在火內。和鹽燒透。取出地上。以瓦盤蓋定。存性候冷。入麝香少許。乳鉢內極細杵勻。每以半錢塗搽患處。常收用小瓦合盛貯。勿使紙裏。蓋鹽能作潤。

綠袍散

治重舌。及滿口內外瘡毒。咽膈不利。

薄荷去老梗

荊芥穗二錢各味

青黛

玄明粉

礬砂三錢各味

百藥煎

甘草二錢各味

右件劉煔爲末。除玄明粉、礬砂二味。在乳鉢內細杵。同前藥末再杵勻。用一字至半錢。乾點舌上。令其自化。或以新汲水入蜜調點舌上亦好。

益黃散

治脾虛受冷。水穀不化。泄瀉注下。盜汗出多。

陳皮去白

肉豆蔻炮二錢各味

丁香二錢

訶子肉炮去核

甘草炙二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。空心溫服。

解表散

主傷風感冷。咳嗽痰喘。嘔吐瀉痢驚悸。有熱證在表裏發。當用氣解藥可投。

麻黃如前製

杏仁湯炮去尖

赤茯苓去皮三兩各一兩

川芎

防風去蘆

枳殼如前製三兩各二兩

甘草半生半炙

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。無時溫服。有熱入薄荷同

煎。

### 參苓白朮散

主脾胃虛弱。飲食不進。多困少氣。中滿痞噎。嘔吐咳逆。此藥不寒不熱。性味溫平。常服調脾悅色。順正去邪。

人

參去蘆

白茯苓去皮

粉草

白朮

白扁豆

如前製

山

藥去黑皮

縮砂仁

薏苡仁

桔

梗剉炒九味各一兩

蓮子肉去心

右件剉焙爲末。每服半錢至一錢。用棗湯空心調服。或溫米湯亦可。

守胃散

治陰陽不和。吐瀉不止。預防風證。常服調脾胃。進飲食。

人

參去蘆

白朮

白茯苓去皮

山

藥去黑皮

乾

葛

扁豆

如前製

南

星如前製

甘

草

藿

香梗去老

防

風去蘆

天

麻各半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。冬瓜子仁五十粒。搗碎煎七分。空心溫服。

如瀉不止。入沉香、白豆蔻同煎。

南星腹皮散

主腫疾欲瘡未瘡之間。脾胃虛慢。氣促痰喘。腹脹胸滿。飲食減。精神困。小便不利。面色痿黃。

南星同前製一兩

大腹皮淨洗焙乾

生薑皮

陳皮去白

青皮去白

桑白皮剉炒

甘草炙

扁豆同前製七味各半兩

右爲呶咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

導赤散

治心經壅熱。煩躁睡語。或時復上竄。齧五巧牙。小便黃澀。久則成驚。觸物易動。

生乾地黄淨洗

木通去皮節二味各一兩黃芩

赤茯苓去皮二味各二錢半

甘草三錢

右爲呶咀。每服二錢。水一盞。竹葉三片。煎七分。無時溫服。或加麥門冬去心同煎。

錢氏白朮散

治脾胃不和。嘔吐瀉痢。惡心發渴。大能補虛損。調榮衛。

南木香

白

朮

二味各半兩

人

參

去蘆

白茯苓

去皮

藿香葉

甘

草

四味各一兩

乾

葛

二兩

右爲呔咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

和中散

主久病方瘡。面黃清瘦。神昏氣弱。脾胃未實。食物過傷。停飲生痰。留滯中脘。耗虛真氣。或成吐瀉。此藥性味甘平。大能調治。常服和胃氣。進飲食。悅顏色。理風痰。

人

參

去蘆

白扁豆

同前

白茯苓

去皮

川

芎

縮砂仁

香附子

半

夏

同前

甘

草

八味各一兩

肉豆蔻

訶

子

去核二味各七錢

右爲呔咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。空心溫服。或不拘時。

糖煎散

治豆瘡餘毒。攻目成翳。澀痛有熱。多淚羞明。

赤芍藥

當歸尾

大

黃

川

芎

荊芥

防風去蘆

漢防己去黑皮

龍膽草

黃耆生用

黃芩十味各半兩

右爲咬咀。每服二錢。水一盞。沙糖小塊。煎七分。食後臨睡溫服。或無時。

六柱散

治吐痢泄瀉。胃虛脾慢。手足俱冷。六脈沉微。

人參去蘆

白茯苓去皮

熟附子

南木香

肉豆蔻

白朮六味各半兩

右爲咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。不拘時溫服。

九仙散

解諸目疾。不拘歲月遠近。並宜先服。

柴胡去蘆

蒼朮同前製二兩

赤芍藥

荊芥

甘草三味各六錢半

麻黃同前

川芎

薄荷和梗三味

旋覆花去老梗

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。不拘時溫服。

草龍膽散

治暴赤火眼。晝夜澀痛。作腫淚多。

草龍膽

木賊去節

荊芥

菊花

防風去蘆

草決明半生炒

甘草七味各

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。痛甚加羌活。乳香同煎。

金波散

治時行赤眼。腫痛成翳。有熱多淚。

淨黃連一兩

硼砂

寒水石

大黃三味各

海螵蛸

銅青二錢各

玄明粉半錢

麝香一字

全蠍七尾去毒

右除玄明粉、麝香。餘七味剉曬爲末。仍入玄明粉、麝香。乳鉢內同前藥末杵勻。每用一字至半錢。溫淨湯或涼水調化。澄清去渣。無時頻洗。有風夾蟲作癢。入輕粉取效。仍忌酒葷三五日。

內金散

治牙根肉臭爛黑色。有蟲作痛。

雞內金

即雞肫內麤皮陰乾一兩

白芷

銅

青三味各半兩

麝香一字

右前三味。剉曬或焙爲末。仍以麝香乳鉢內同杵勻。每用一字或半錢。乾擦患處。先用溫鹽水灌漱。後傳藥。

霹靂散

解急慢驚風。不省人事。

猪牙皂角三錢

細辛

川芎

白

芷三味各二錢

躑躅半錢

右件剉曬爲末。每以少許。用大燈心三寸長。蘸點鼻內。得噴嚏爲驗。前藥不可焙。焙則不應。

順搐散

胖男右女左搐不順者。

枳殼製如前

鈎藤去鈎

荊芥

羌活

防風去蘆

甘草六味各半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。順切薑三片。煎七分。無時溫服。或入薄荷同煎。

外消散

治嬰孩初生。旬日外臍突。或痛或不痛。痛則啼聲不已。及療小兒因感溫熱相搏。致陰器膚囊浮腫。

大黃

牡蠣如前製二錢  
消二錢

右前二味。剉焙爲末。仍入朴消。乳鉢內同杵勻。抄一錢或二錢。取田螺三枚。淨洗。再以水半盃。活過一宿。去螺用水。調塗腫處。卽消。其螺仍放水。中勿害之。昔賢有曰。殺生救生。去生遠矣。物命雖微。亦可戒也。治陰器膚囊腫。車前子煎湯候冷。調傅患處。

活血散

解破血傷風。

當歸酒洗

生乾地黃酒洗

川芎

紅花

赤芍藥

蘇木六味各半兩

甘草三錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

桃花散

治一切破損肢體。血出作痛。

好石灰

用紗淨篩十兩

清

油小半盞

大

黃

五錢剉碎。水浸取汁大半盞

右石灰先用鐵鐺炒令帶熱。次入大黃汁。清油和勻。仍以慢火炒如桃花色。烏盆盛之。傾出在內。浮而不沉。鵝翎拂聚紙上。別著瓦器收藏。凡是破損傷痕。用塗立效。仍服疏風散。活血散。

三白散

解初中腫疾。四肢膚囊浮脹。大小便不利。皆因膀胱蘊熱。風溼相乘。

白牽牛

半生半炒碎

桑白皮剉炒

白朮

木

通去皮節

陳

皮去白

甘

草六味各半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

麝香人齒散

治豆瘡黑陷。因毒氣入腎。而形於外。

麝香少許

活人牙齒不拘多少火煨過得小兒自脫者佳

右二味同研爲末。每用半錢至一錢。無灰溫酒調下。止以一服。然此藥固好。但人齒難得。嘗用一匕金取效。

### 四黃散

治小兒身上一切熱毒瘡疾燥癢。抓破有汁不乾。

淨黃連

黃檗

黃芩

大黃

滑石

五味各半兩

五倍子

去內蟲屑二錢半

右件剉曬爲末。用清油入桐油和調二錢至三錢。塗搽患處。仍服四順飲。消毒飲。

### 薄荷散

治陽證脫肛。

薄荷和梗

骨碎補

去毛二味各半兩

甘草

二錢半

金罌刺根

七錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。入無灰酒大匙。煎七分。空心溫服。或無時。

### 槲皮散

解癰癰作腫疼痛。

櫟

皮仍去粗皮此櫟在處有之即包鹽櫟葉木也

右件不拘多少剉碎煮水候溫頻洗患處。

白芨散

治癰癰膿汁不乾。

白芨

貝母

淨黃連三味各半兩

輕粉三十貼

右前三味剉焙爲末。仍以輕粉乳鉢內同杵勻。抄一錢至二錢。清油調擦患處。必先用櫟皮散煮水候溫淨洗拭乾方塗藥。

二香散

治同前證。

白膠香

降真香用心無土氣者

海螵蛸

五倍子去肉蟲屑四味各半錢

右件爲末。如前先用櫟皮散煮水淨洗患處。後以此藥一錢或二錢乾塗上。外將水紙封掩三五次即效。

萬金散

治水瀉下痢。久不瘥者。

罌粟殼

去蒂二兩一兩對碎醋蜜炒一兩生用

陳皮

去白二兩

甘草

兩不去節二兩一兩炙一兩生用

烏梅

和核一兩

右件咬咀。每服二錢。熱湯一盞。略煎二沸。和渣傾出盃內。上以盞蓋定。候澄清去渣。空心溫服。

神效散

治赤白痢晝夜頻數。食減腹痛。小便不利。

罌粟殼

去梗蒂對碎蜜水炒

白芷

烏梅

和核一兩三味

乳香

撫芎

二味各半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。空心溫服。

赤葛散

治因血熱與風熱相搏。遍身丹毒燥癢。日久不消。

赤葛

二兩

甘草

三錢

右件咬咀。每服二錢。無灰酒一盞。煎七分。無時溫服。不飲酒者。止用水一盞。入

酒大匙同煎。

四聖散

主嬰孩胎受熱毒。生下兩目不開。

燈心

黃連

秦皮

木賊

棗

子和核五味  
各半兩

右爲咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。澄清去渣。無時頻洗。兩目自開。

天花散

治外腎膚囊腫痛。

天花粉二兩

甘草三錢

右件咬咀。每服二錢。無灰酒一盞。煎七分。空心溫投。不能飲者。止用水煎。少入酒同服。

蟠龍散

治陽證脫肛。

乾地龍蟠如錢樣者佳  
略去土一兩

風化朴硝二錢

右劉焙研爲細末。仍和勻朴消。每以二錢至三錢。肛門溼潤乾塗。或乾燥用清油調塗。先以見毒消。荆芥生葱煮水候溫浴洗。輕與拭乾。然後傳藥。

### 伏龍肝散

治陰證脫肛。

伏龍肝一兩

鼈頭骨半兩

百藥煎二錢

右三味焙研爲末。每用二錢至三錢。濃煎紫蘇湯候溫。和清油調塗患處。並如前法浴洗。拭乾方上藥。

### 益元散

解暑毒。利小便。理煩渴。除驚悸。

滑

石六兩

粉

草一兩

右二味。或曬或焙。研爲細末。每服一錢至二錢。溫熱水無時調服。涼水亦可。祛風散。

治卒暴中風。全不能言。口眼喎斜。驚癱搐掣。痰實煩躁。神昏有熱。睡臥不穩。

防

風兩半

南

星生用

甘

草生用

半

夏製前

黃芩四味各一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞半。薑三片。慢火煎七分。不拘時溫服。

全蠍觀音散

治外感風寒。內傷生冷。吐瀉交作。脾胃俱虛。盜汗出多。神昏色慢。常服溫中益氣。進飲食寧心。

蓮子肉去心

人參去蘆

扁

豆如上製三味各一兩

麻

防風去蘆

全蠍去尾尖毒

羌

活

白

芷

南木香

甘草炙

黃

耆鹽蜜水塗炙八味各半兩

神麴炒

白茯苓去皮二味各七錢半

右除木香不過火。餘十二味剉焙。仍同木香碾爲末。每服半錢至一錢。用棗湯無時調服。

備急散

治小兒諸般骨硬。致咽喉腫痛。

五倍子末 一兩

先春茶末 半兩

右二味和勻抄一錢。溫湯半盞調化無時。少與嚥下。依此法服。餌不過三五次。即效。如骨出或刺破處血來多者。研砂末六錢。水煎消毒飲調服。血止痛住。腫消食進。

### 黃土散

治豆瘡餘毒太甚。偏身潰爛。濃汁不乾。

黃

土不拘多少取曠野背陰處深掘為妙

右件安地上。炭火煨透候冷。研為乾末。用絹或紗兜撲患處。仍服解餘毒之藥。併忌動風發熱等物。

### 回陽散

理脾虛感受風寒溼氣。傳作吐瀉。手足逆冷。腹痛有痰。及陰證脫肛。疝疾盜汗。

附

子如前製

甘

草半生半炙二味各二錢半

人

參去蘆七錢半

細

辛去葉一錢半

桔

梗剉炒五錢

厚

桂去粗皮

白茯苓

去皮

川獨活

三錢各半

半

夏同前製三錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。或入棗子同煎。

蜜陀僧散

治走馬疳。齒焦黑爛。

蜜陀僧一兩

輕粉五十

麝香一字

右件爲末。同輕粉、麝香、乳鉢內杵勻。每用半錢擦患處。

圓膏門

圓類

琥珀抱龍圓

抱龍之義。抱者保也。龍者肝也。肝應東方青龍木。木生火。所謂生我者父母也。肝爲母。心爲子。母安則子安。況心藏神。肝藏魂。神魂既定。驚從何生。故曰抱龍圓。理小兒諸驚。四時感冒。風寒溫疫邪熱。致煩躁不寧。痰嗽氣急。及瘡疹欲出發搐。並宜可投。其藥性溫平。不僭不燥。常服祛風化痰。鎮心解熱。和脾胃。益精神。

真琥珀

天竺黃

檀

香細剉

人

參去蘆

白茯苓

去皮五味各一兩半粉

草三兩去節

枳

殼製如前

枳

實製如前製二兩

水飛硃砂五兩先以淨器中澄清去上餘水如此法一般精製見硃砂盡乾用

山藥去黑皮一斤切作小塊南星一兩切碎用鹽黃

金箔百片去殘紙取見成藥一兩同用

右前十二味除硃砂金箔不入研內餘十味檀香不過火外九味或晒或焙同研爲末和勻硃砂金箔每一兩重取新汲井水一兩重入乳鉢內略杵勻隨手圓此樣○大一粒陰乾晴霽略晒日色燥甚則振折宜頓放當風處取其自乾治法並用葱湯無時化服或薄荷湯痰壅嗽甚淡薑湯下豆瘡見形有驚溫淨湯下心悸不安燈心湯下暑天迷悶麥門冬熟水下百日內嬰孩每圓分三次投二歲以上者止一圓或二圓其品劑修合之日但缺一味不依製度必無效矣常用瓦瓶入麝香同時毋使散泄氣味入珍珠末一兩合和名金珠散蓋珍珠能鎮心寧肝墜痰尤效治法湯使同前此藥乃家傳秘方嘗自精製出賣人多信用取者甚衆今推誠利行願與天下共之非敢自矜特以全嬰爲念耳

### 鎮驚圓

主急慢二驚風痰上壅手足抽掣口眼喎斜躁煩生噴精神昏悶常服寧心鎮驚

疏風順氣。

人

參去蘆

粉

草半生

茯

神去根

僵

蠶去絲

枳

殼如前製

白附子

南

星如前

白茯苓去皮

礪砂

牙消

硃

砂水飛六味各二錢半

蠍去尾

麝香一字

右除牙消、礪砂、麝香、硃砂、四味。用乳鉢細研。餘九味焙爲末。入乳鉢內和勻。前四味用糯米粉水煮清糊爲圓。梧桐子大。就帶潤以銀硃爲衣。每服三圓至五圓。或七圓。急驚用溫茶清磨化投服。慢驚以生薑熟附子煎湯研化溫服。薄荷湯化下。或麥門冬湯。

烏犀圓

主諸積滯夾風。溫胃調脾。消進飲食。吐逆有酸醜氣。面黃肌瘦。不拘孩兒生後歲月遠近。並宜可服。

烏犀

皂

莢劉三寸長。安灰火中。見清煙起。爲度。

硫黃

白

薑二錢半

陳

皮去白

川

烏炮去皮。二錢。

巴豆七粒法

右硫黃一味。先入研內研細。除巴豆外。餘四味同焙爲末。仍以巴豆薄切。在乳鉢極細杵。再同前五味藥末杵勻。用粳大米飯包作糗子一大箇。小瓦瓶盛水熟煮。候冷取出。在沙鉢中爛杵。細布兜緊。捻出如稠糊。安在別器內。以藥末亭分同杵細軟。圓粟穀大。取諸積每服十五圓或二十一圓至三十三圓。並用淡薑湯泡冷飯取汁小盞五更初空心送下。通利三五行。以勻氣散止補。治積吐有酸酸氣。每服三圓至五圓。用淡薑湯入米醋少許。候溫空心投下。

### 香芎圓

治諸淋證。若患風閉尤效。

淨香附

鹽水炒

川芎

芎

赤茯苓

去皮三味各半兩

海金沙

滑石

二味各一兩

枳殼

如前製

澤瀉

去粗皮

石葦

去毛梗取薄葉

檳榔

不過火四味各二錢半

右件剉晒爲末。糯米粉煮爲清糊。圓麻仁大。每服三十三圓。至五十五圓。或七十七圓。並用麥門冬熟水空心送下。若小便澀痛。滴三五點者。取長江順流水。

用火微溫。入鹽少許調勻。空心嚥服。

香連圓

治赤白下痢。煩渴作痛。

南木香

半兩不  
過火

淨黃連一兩剉用茱萸  
炒仍去葉梗

烏梅肉

二錢半薄切用  
屋瓦慢火焙乾

右件爲末。用阿膠半兩。剉碎炒脹。水化如糊。候冷入乳鉢內。同前藥末。亭分杵勻。圓作麻仁大。赤痢每服三十三圓。至五十五圓。或七十七圓。甘草湯空心下。白痢圓數同前。白薑湯空心下。赤白交作。溫米清湯。空心嚥服。

化癍圓

主癍結氣塊。在兩脇之間。日久不化。乍寒乍熱。藏府不調。米穀不消。哽氣喘促。胸腹滿悶。及理丁奚。哺露。

南木香

陳皮去白

莪

朮去毛  
炒

三

稜炮剉

青皮

巴豆九粒去  
殼膜心微炒

枳

殼如前  
製

檳

榔七味各  
半兩

白朮

丁香二錢各  
味

細

墨燒存性  
用四錢

右除木香、檳榔、丁香不過火。餘七味焙。同前三味爲末。麵糊圓。作麻仁大。每服十五圓。至二十一圓。清米湯空心下。有寒熱往來。以柴胡飲間服。忌油膩生冷飲食。

### 蘆薈圓

主五疳八痢。蛇蟲藏府虛弱。身體瘦悴。頭髮焦疏。腹脹青筋。小便白濁。渴水無度。洞泄不時。穀食難化。徧身瘡疥。神色乾燥。此藥大能養胃壯氣。止痢除蟲。長肌健力。

南木香

丁

香二錢各

訶

子去核

肉豆蔻

二錢各

使君子肉

蘆

薈二錢各

棗

肉一瓦

或慢火焙乾

右除使君子肉薄切。於乳鉢內極細杵。仍將前南木香等四味。溼麵裹煨。至香熟。取出。地上候冷。去麵剉焙。同棗肉、蘆薈爲細末。再入乳鉢。同使君子肉杵勻。煉蜜圓。作麻仁大。每服三十圓至五十圓。溫米湯空心送下。兒小米湯化服。

### 使君子圓

治腹內諸蟲作痛。口吐清水。

使君子肉

薄切屋瓦焙乾

榔

酸石榴根皮

東向者佳淨洗剉焙

大黃

半生半炮四味各七錢半

右除檳榔剉晒不過火。餘三味再焙。同檳榔爲末。沙糖水煮麵糊。圓麻仁大。每服三十圓至五十圓。淡猪肉汁空心下。或雞肉汁亦好。

補腎地黃圓

治稟賦不足。腎氣虛弱。骨髓枯竭。顙大頭縫不合。體瘦語遲。行步多艱。齒生緩者。

乾山藥

去黑皮

山茱萸

酒浸潤蒸透去核取皮爲用

熟乾地黃

酒洗焙乾三味各五錢

鹿茸

蜜塗炒酒亦好

川牛膝

酒洗焙二味各四錢

牡丹根皮

淨洗

白茯苓

去皮三錢二味各三錢

澤瀉

去粗皮二錢

右件剉焙爲末。煉蜜圓。作麻仁大。每服十五圓或二十五圓至三十五圓。空心

溫鹽湯下。溫酒亦佳。

寬腸圓

治痢後裏急。大府閉澀不通。

枳殼

同上製仍用清油浸一宿焙乾五錢

麻仁

去殼

木通

去皮

大黃半生半炮

檳榔

大腹皮淨洗焙乾五

右除麻仁用乳鉢極細杵。外五味檳榔不過火。餘焙同研成末。入乳鉢中。與麻仁再杵勻。煉蜜圓。菴豆大。每服三十圓至五十圓。仍以枳殼甘草煎湯。空心送下。一二月嬰孩溫蜜湯化服。

### 香陸胃苓圓

治腫疾日久不瘳。此藥大能實脾導水。多服取效。

丁香香去梗

商陸

赤小豆

陳皮去白

甘草炙五味各二兩

蒼朮如前製三兩

澤瀉去粗皮二兩半

赤茯苓去皮

猪苓去皮

白朮三兩各一兩半

肉桂去粗皮一兩

厚朴同上製二兩

右除丁香肉桂不過火。餘藥剉焙。同前二味爲末。用麵微炒。水浸透。煮糊圓。菴豆大。每服二十圓至五十圓。或七十圓。空心溫湯下。兒小者圓作粟穀大吞服。粒數引子。並如前法。

### 二薑圓

治瘧疾往來寒熱經久不瘳者。

夏

薑一兩剉片東壁土炒白

薑一兩剉片巴豆九粒去

右爲細末。用獺猪膽汁和水煮麵糊圓。麻仁大。就帶潤以硃砂末爲衣。熱多用溫湯。早晨面北空心送下。寒多亦於清旦用溫酒面南空心嚥服。若寒熱相亭。用陰陽湯以一半冷水一半熱湯參和是也。不拘向南北投服。

沒石子圓

治久患疳痢及釀瀉。

沒石子二枚

南木香溼紙包略炮過

肉豆蔻一枚

淨黃連

剉碎薑汁炒過二味各二錢半

訶子四枚炮

右剉焙成末。如烏犀圓內製飯糊爲圓。粟穀大。每服十五圓至三十圓或五十圓。溫白湯空心下。或米清湯。

半夏圓

治痰證神妙。若驚搐後。風涎潮作。服之尤驗。

半

夏生用二兩

赤茯苓去皮

枳

殼同上製二錢風化朴消半

右前三味剉焙爲末。入乳鉢同朴消杵勻。用生薑自然汁煮糯米粉爲糊。圓棗

豆大。每服三十圓至五十圓。仍以淡薑湯食後臨睡送下。兒小者圓如粟穀大。

### 六聖圓

治諸積和胃。大能主氣厚腸。消痞快膈。屢用取效。

莪 朮 炮製

淨黃連

陳 皮 去白

白

薑 各四錢

南木香 二錢

右除南木香不見火。餘四味剉焙。同木香爲末。每一錢重。巴豆三粒。去殼膜。心存油碎切。入乳鉢極細杵。同前藥末再拌勻。煮醋麵糊圓。麻仁大。每服十五圓至二十五圓。或三十五圓。淡薑湯五更初空心送下。利三五行。勻氣散止。補常服助脾化積。進食消痞。臨睡以淨湯或溫酒下三粒及五粒而已。每一次止圓藥末三錢重。淨巴豆九粒爲則。不可多合。久則味過。用之效遲。

### 內消圓

治癰癰作膿穿破。久不瘡者。或初得此證。投之亦效。

斑

貓 一兩 除翅足 粟米大 蓋炒  
令粟米微焦 色仍去 粟米

右件入薄荷葉三兩。同研爲末。雞子清爲圓。菴豆大。初用半飢半飽間。以溫茶

清下一圓。逐日加一圓。加至五圓之外。又逐日減一圓。減至一圓之後。每一日只服五圓。得瘥即止。不可過投。

截驚圓

治驚風搐掣。煩躁有熱。兩目上視。口噤牙關。

龍膽草

去蘆

防

風

去蘆

青

黛

鉤

藤

和鉤

淨黃連

牛

黃

甘

草

硃

砂

末水飛者入

薄荷葉

二錢半

麝

香

半錢

右除牛黃、麝香外。餘八味剉晒。或焙爲末。仍同前二味乳鉢內杵勻。煉蜜圓。芡實大。每用一圓至二圓。溫湯化服。或茶清。

散氣圓

理諸疝氣。小便利或不通。臍下作痛。不堪忍者。

海

藻

湯浸洗七次焙乾用

澤

瀉

去粗皮

茴

香

炒

車

前

子

焙

蘿蔔子

用屋瓦慢火焙乾

川

練

子

取肉斑貓九枚去翅足同炒少時仍去斑貓候冷用

大

腹

皮淨洗焙乾七

味各一兩

右件剉焙爲末。酒煮麵糊。圓菴豆大。每服三十圓至五十圓。南木香煎酒。空心

下。或防風、牡丹皮煎酒下。不能飲者。於木香湯中防風、牡丹皮湯內各少入酒。並空心投亦可。再用鹽炒茴香煎湯尤妙。

金粟圓

治下痢赤白。水穀不化。

淨黃連一兩

神

麴

一兩別研爲末作糊

川

芎

枳

殼製如前

穀

芽淨洗焙乾

赤茯苓去皮

白芷

南木香

六味各半兩

右除木香別剉。不過火。餘六味焙。入木香同爲末。用神麴末煮糊圓。粟穀大。每服七十圓至百圓。空心溫米清湯下。不拘時。

萬應圓

治諸般疳證。胃口有熱。飲食不進。頭髮作穗。面色痿黃。

五倍子

去內蟲屑

胡黃連

青皮去白

陳

皮去白

黃檗

神麴

麥芽淨洗焙乾

三

稜炮剉

莪

朮炮剉

蕪荑

檳榔

龍膽草

川練子肉

使君子肉

十四味各一兩

右除檳榔不過火。麥芽二味外。餘十二味剉碎。炒令微焦色。候冷同前麥芽檳榔研爲細末。水煮麵糊圓。麻仁大。每服三十圓。至五十圓。或七十圓。溫米清湯無時送下。或空心。兒小者圓作粟穀大。粒數下法同前。

金菜圓

治冷疝氣痛。及膚囊浮腫。

金鈴子肉一兩

家菜萸半兩

右二味焙研爲末。酒煮麵糊圓。麻仁大。每服三十圓至五十圓。空心溫鹽湯下。溫酒亦好。兒小者圓作粟穀大。粒數下法如前。

二聖圓

治腹內諸蟲。及消穀逐水下氣去風。

檳榔一兩

巴豆

十五粒去殼膜內有油

右檳榔剉晒爲末。巴豆碎切。在乳鉢內極細杵。仍入檳榔末同再杵勻。麵糊圓。菴豆大。每服七十七圓至九十九圓。用溫茶清五更初空心止投一服。見蟲下盡。進以稀粥自安。

商陸圓

治水腫小便不通。勿拘遠近。

商

陸一兩

淨黃連半兩

右二味焙爲末。薑汁煮麵糊圓。菉豆大。每服三十圓至五十圓。用溫紫蘇熟水空心下。或溫葱湯。

枳殼圓

治大府虛閉氣連日不通。痢後裏急。用之亦效。利小便熱閉。

枳

殼

不拘多少剉片麥麵炒過。仍以清油潤透一宿焙乾。

右焙爲末。煉蜜圓作芡實大。兒小者用甘草糯米煎湯化下一圓至二圓。兒大者圓菉豆大。每服三十圓或五十圓。食前溫米清湯送下。小府熱閉。用車前子煎湯候溫空心投之。

溶川圓

治水腫及單腹滿脹。氣促食減。徧身面浮。

大戟

芫

花醋炒

沉香

檀香

南木香

檳榔

莖朮

大腹皮

焙乾  
淨洗

桑白皮

剉炒九味  
各半兩

黑白牽牛

曬研取生  
末一兩

巴豆

去殼膜心存  
油三十五粒

右除牽牛末。巴豆外前九味。內有沉香。檀香。木香。檳榔。不過火。餘五味焙乾。同沉香等爲末。就加牽牛末和勻。巴豆碎切。在乳鉢內極細杵。入前藥末同再杵勻。水煮麵糊圓。麻仁大。每服十七圓。濃煎葱湯。候溫五更初空心下。去水未盡。停一日減用十三圓。次減作九圓。再減至七圓。湯使下法如前。證退卽止。仍投南星腹皮散。如單腹腫甚。能飲食氣壯者。加甘遂末同圓取效。仍忌有甘草草藥餌。不致相反。

三聖圓

治諸瘧不拘遠近。

穿山甲

一兩半湯浸透取甲剉碎同  
熟灰鑑內慢火炒令焦黃色

雞骨常山

雞心檳榔

二味各一兩  
薄剉曬乾

右件再晒爲末。水煮糯米粉爲糊。圓莖豆大。就帶潤以紅丹爲衣。陰乾。每服三十圓至五十圓。未發前隔晚用酒空心投一服。重則二服。經久不瘥。下祛瘧丹。

莪朮圓

和脾益胃。消進飲食。寬膈快氣。悅色清神。

莪朮炮剉

三稜炮剉

淨香附

三味各四兩。醇醋浸一七。慢火煮乾。再焙。

檳榔一兩。薄剉

生牽牛末。別研

青木香。去蘆

穀芽。淨洗。焙乾。

青皮。去白。三味。各半兩。

萆澄茄

丁香

南木香。三味。各四錢。

右除檳榔、丁香、木香不過火。及牽牛末。餘七味剉焙。仍同檳榔、丁香、木香爲末。臨入牽牛末和勻。水煮麵糊圓。菴豆大。每服三十圓至五十圓。無時用淡薑湯下。溫茶溫酒皆好。兒小者圓粟米大。粒數下法如前。

豆蔻圓

治患豆瘡。脾虛作瀉。

肉豆蔻

南木香

縮砂仁

三味各

白龍骨

訶子肉。二味。各五錢。

赤石脂

枯白礬。二味。各七錢半。

右除木香不過火。餘六味剉焙。仍同木香爲末。稠煮麵糊圓。麻仁大。每服三十圓至五十圓。溫米清湯空心送下。或不拘時。兒小者圓粟穀大。下法同前。

碧玉圓

治痰嗽氣喘胸滿。飲食減少。睡不得寧。煩躁有熱。

青黛

明白礬生用

南星生用

滑石四錢各

輕粉五十

全蠍十五尾

巴豆四十九粒

右除輕粉。巴豆外。餘五味或晒或焙爲末。仍入前二味。同在乳鉢杵勻。薑汁煮

糯米粉爲糊。圓粟穀大。每服七圓至九圓。或十一圓。用淡薑湯空心投。熱甚者

薄荷湯下。或不拘時。

快活圓

治丁奚疳證。皮膚瘦削。骨露如柴。肚大青筋。小便白濁。睡臥煩躁。神氣昏沉。常服

健脾化積。進食肥肌。

蒸餅一兩去頂刺空入青礬內半錢重仍以碎餅屑

右件剉焙爲末。別以肥棗用米泔水浸。經一宿飯上蒸。少時去皮核。用乳鉢爛

杵如糊。同前餅末亭分。再杵勻。圓麻仁大。每服三十圓至五十圓。溫米清湯無

時送下。兒小者亦以米湯化服。其蒸餅不拘箇數。大約以一兩入青礬半錢重

爲定。下常如前法製半斤。作一料。後人切勿以見方不重藥爲誤。余嘗屢試屢驗。其餅如南饅頭樣者

### 沉香檳榔圓

和脾助胃。進食清神。寬胸快膈。順氣調中。悅顏色。壯筋骨。理面帶痿黃。肌膚瘦弱。過食生果。停寒在裏。乳癖腹脹作痛。及吐痢瘧腫。瘡後諸疳蟲積。並皆可投。

沉香

檳榔

檀香

楠木香

丁皮

三稜炮制

莪朮炮制

神麴炒

穀芽洗焙

厚朴同上

蒼朮同上

使君子肉剉以屋瓦焙乾

青皮去白

陳皮去白

縮砂仁

益智仁

淨香附

枳殼同上

良薑同上製十九味各半兩

粉草炙一兩半

右除沉香、檳榔、檀香、木香、丁皮不過火。餘十五味剉焙。仍同沉香等爲末。水煮麵糊圓。麻仁大。每服三十圓至五十圓。溫米清湯無時送下。兒小者不能吞嚥。煉蜜圓如芡實大。每以一圓或二圓。溫湯化服。

膏類

硃砂膏

五心煩熱。喉痰壅盛。驚風搐搦。渴飲無時。睡中不寧。見人煩躁。口瘡糜爛。

硃砂水飛

牙消

硼砂

玄明粉三味各二錢半

麝香一字

金箔

銀箔各十貼

白附子

枳殼如前製二錢

芎

粉草二味各四錢

人參去蘆

黃芩

薄荷葉三味各二錢

右前七味。入乳鉢杵勻。後七味剉焙爲末。仍入鉢中同前藥和。煉蜜圓芡實大。每服一圓至二圓。用麥門冬熟水無時化服。

如意膏

治痰喘氣促咳嗽。連聲不已。冷熱二證皆可投。

半夏炮裂

南星炮裂二味各一兩半

右二味爲末。以生薑汁和勻。捻作小餅如錢樣。用慢火炙乾。再爲末。復取薑汁如前。經兩次炙乾。仍焙爲末。煉蜜圓芡實大。每服一圓至二圓。仍用薑蜜湯無

時化服。有熱以薄荷湯。

地黃膏

治口內舌上生瘡作痛。飲食艱進。晝夜煩啼。

山梔仁

萊豆粉

二味各一兩半

粉

草六錢

右件或晒或焙爲末。用生地黃爛杵取汁一兩半。好蜜一兩半。以薄瓦器盛。在銅鐵銚中水煮成膏。如稀糊相似。候冷亭分。入前藥末。同在乳鉢再杵勻。圓芡實大。每以一圓至二圓。麥門冬熟水無時化服。兒大者每用一圓納口內含化。或以新汲水調點舌上。

烏梅膏

治諸渴不止。吐瀉後口乾無味。及病中昏悶。咽痛不利。心悸似驚。此藥品味不寒不燥。用得其宜。暑月出路含化。則津液生而煩渴少。神效異常。

人參

去蘆

檀香

剉麝

薄荷葉

三味各半兩

烏梅肉

薄切用屋瓦慢火焙乾

乾葛

縮砂仁

百藥煎

粉

草

五味各一兩

右除檀香不過火。烏梅肉別焙。餘六味或晒或焙。仍同前二味研爲細末。煉蜜

圓芡實大。每服一圓或二圓。無時含嚥。兒小者麥門冬熟水化服。

烏附膏

理顛門陷。

綿川烏生用

綿附子生用二味各五錢

雄黃二錢

右件爲末。用生葱和根葉細切爛杵。入前藥末同煎。空心作成膏。貼陷處。

烏豉膏

治六七歲以上小兒。疳顛腫毒。牙關緊硬。飲食不便。

綿川烏

水浸潤炮裂去皮臍半兩

玄明粉二錢

淡豆豉

三錢重水浸飯上蒸透

右以川烏爲末。同蒸豆豉玄明粉在乳鉢爛杵爲膏。圓芡實大。每用一圓。兒大者安在牙關內。令其自化和痰吐出。又再如前法含化。腫毒自消。兒小者用薄荷蜜湯化開。以指頭抹入牙關內。嚥下亦不妨。

辟塵膏

治小兒塵埃入目。揩成腫熱作痛。啼哭不已。

油煙細墨

右以煙墨新汲井水濃磨。入玄明粉半錢。和勻爲膏。用筆多點目內。三五次卽效。仍忌飲酒一晝宵。

### 草麻膏

治暴患脫肛。

草麻子一兩

右件爛杵爲膏。捻作餅子。兩指寬大。貼顙上。如陰證脫肛。加生附子末。葱蒜同研作膏。依前法貼之。

### 鉤藤膏

治百日內嬰孩。脣面青冷。腹痛夜啼。及周歲以上者。盤腸內疝。諸疝氣疾。

鉤

藤

玄胡索

當歸酒洗

粉草炙

乳

香五錢味各

肉

桂去粗皮

麝

香一字

右前四味焙乾。桂不過火。同爲末。乳香蒟葉裹。熨斗盛火。熨透候冷。入乳鉢同麝細杵。後入前藥末再杵勻。煉蜜圓芡實大。每用一圓至二圓。白湯空心化服。

### 黃連膏

治時行火眼。赤腫澀痛。晝夜煩啼。

淨黃連二錢半

右件細剉。雞子一枚。筋嘴札開。一頭大處。取清瓦盞盛入黃連和勻。釀一時。見黃色。以絹濾過。成膏。患者仰面臥。外令人挑一字許。頻點目內。覺口中有苦味。滿舌。上藥之驗也。豆瘡餘毒攻眼。眇多有熱。用之亦驗。

益中膏 一名助胃膏

治脾胃虛弱。吐瀉腹脹。肚疼困倦。有因感冷而瀉。夜起頻數。大便過時。食不剋化。

肉豆蔻

丁香

縮砂仁

訶子肉

炮去核四味

粉草炙

青皮

去白二味

陳皮

去白

馬芹

淨洗焙

右除丁香不過火。餘七味焙。仍同丁香爲末。煉蜜圓。芡實大。每用一圓至二圓。白湯空心化服。

玄霜膏

治一切湯火瘡。但傅上痛止。更無癢痕。

好糯米五升或多少不拘

右用堅硬鐵器盛貯。見天處以雪水浸一二月。不問腐爛。仍用竹器撈出。於大  
筲箕內。別取淨水淋過。晒乾。焦炒研爲細末。新汲井水調塗患處。如乾燥。又以  
軟雞翎蘸水。添拂瘡上。使之滋潤。痛減。藥少再添用。自然效速。未久成團。再研  
細。一名玄霜散。炒透黑色。煙清爲度。

### 清涼膏

治暴赤火眼腫痛。及血癰作疼發熱。

大黃

淨黃連

黃檗

赤葛

細

辛和葉

薄荷葉

風化朴消

七味各一兩

右前六味。或晒或焙爲末。臨入朴消。乳鉢內同杵勻。每用一錢至二錢。冷水加  
薑汁調塗太陽。或新汲井水調妙。熱癰以涼米湯水調。搽患處。

### 祛風膏

治急慢驚搐。臍風撮口。牙關緊閉。痰涎壅盛。咽喉腫痛。

歲靈仙

去蘆一兩半細切焙研爲末

右用皂莢三兩。去皮弦槌損。挪溫水一盃。絹濾過。慢火熬若稀糊。入醇醋半兩。

再熬三五沸。去火候冷。用前藥末亭分。乳鉢內杵勻。圓莢實大。先用鹽梅肉擦牙根。次以此膏一圓或二圓。溫白湯濃調。抹入左右牙關內。即開。續進別藥。熬時得瓦器爲上。銀器尤佳。及解風痰壅盛。淡薑湯調化。無時少與含嚥。咽喉腫痛。溫茶清調下。或薄荷湯。

千金膏

治水瀉疳瀉。下痢赤白。腹痛煩渴。

橡斗子 一兩

細茶

白薑

甘草 三錢各半

白芷 五錢

右件剉焙爲末。煉蜜圓莢實大。每服二圓至三圓。溫米清湯空心化下。入醋與蜜相亭。爲膏尤妙。湯溫化服。

丹飲門

丹類

水晶丹

治驚積。食積。蟲積。腹脹。煩啼惡心。食減面黃。並宜通利。此藥有頑積驚重風緊。涎多熱極。乃可服。非常用之劑。及急驚後風痰未盡。免生癰疾。宜再投。

南星劉作小塊。湯煮少時。半夏如前製。二錢。石四錢。輕粉五十

淨蕪荑二百片。巴豆五十粒。去殼全者。湯泡七次。又法。

右前三味焙爲末。拌和輕粉外。蕪荑仁。巴豆二味同碎切。在乳鉢內細杵。入前藥末再杵勻。如烏犀圓內製麵糊。圓麻仁大。每服十五圓至二十五圓。或三五圓。糯米湯泡葱白取汁。小盞五更初空心下。過三五行。進勻氣散調補。下風痰用淡薑湯空心服。

### 不驚丹

治因驚氣而吐逆作搐。痰涎壅塞。手足掣縮。目睛斜視。常服疏風順氣。自不作驚。和脾胃。進飲食。

枳殼同上製。一兩。淡豆豉焙乾。茯苓去皮。南星同上製。三

蠍梢五十尾。去尖毒。淨蕪荑二錢。半先入乳鉢內極細研爛。

右除蕪荑外。餘五味焙爲末。再同蕪荑乳鉢內杵勻。醋煮糯米粉糊爲圓。周歲

內嬰孩粟穀大。每服三十圓至五十圓。乳汁下。三歲以上者。麻仁大。每服五十圓及六十圓。溫米清湯下。候一時得喫乳食。

鶴頂丹

治陰陽二證結胸神妙。勝陷胸、承氣、瀉心三藥。

明白礬一兩

真銀硃半兩

右二味同研爲末。用熨斗盛。少炭火坐小瓦盞在上。平抄礬硃末一錢入盞中。鎔化。急刮出。就搓成圓。如有前證。每用一圓。研細茶清調勻溫服。或入薑汁少許同炒下。聽心上有隱隱微聲。結者自散。不動藏府。不傷真氣。無問虛實證。皆可投。白礬能化痰解毒。銀硃是水銀或硫黃煉成汁。專破積聚。故治結胸。

黑虎丹

治諸般風證。

草烏

去黑皮只一兩生用

烏

去黑皮生用

甘

草

二味各七錢半

麻

黃

不去根節

甘松

熟乾地黃

淨洗

藿香葉

白

芷

油煙墨

燒存性

猪牙皂莢

川

芎

當

歸

何首烏

南星生用

僵蠶去絲

赤小豆

羌活

白膠香

木鼈子

去油十六  
味各半兩

右件剉碎。或焙或晒。研爲細末。糯米粉煮糊。圓麻仁大。每服三十圓至五十圓。或七十圓。稍空心用淡薑湯下。兒小者。圓作粟穀大。治法如前。

祛暑丹

治小兒暑月五心煩熱。睡臥不穩。無時噁嘔。及小便少。乳食減。渴飲水漿。

硃砂末

水飛三錢

黃芩末

甘草末

二味各半兩

五苓散末二兩

右件和勻。煉蜜圓。芡實大。每服一圓至二圓。麥門冬熟水無時化服。臨睡時投亦佳。

四神丹

治水瀉赤白痢。

淨黃連

一兩三錢

黃檗

去粗皮七錢

白薑

當歸

酒洗焙乾二錢半

右四味薄剉。或曬或焙爲末。用烏犀圓內製飯糊。圓麻仁大。每服三十圓至五十圓。烏梅煎湯空心下。其他病證。多好甘甜鹹美。惟瀉痢惡之。專喜酸苦澀淡。

爲上。故以烏梅作湯。使兒小者圓粟穀大。下法同前。

祛瘧丹

治瘧疾經久不瘥。

常山二兩 細切

烏梅和枝一兩 薄切 紅丹半兩

右除烏梅屋瓦別焙。常山或曬或焙仍同烏梅。紅丹研爲細末。糯米粉煮糊圓。麻仁大。每服三十圓至五十圓。未發前涼酒空心送下。或隔晚酒下。重則二服。輕則一服。忌雞麵羊生冷飲食毒物。

飲類

百傷飲

主百物所傷。感冒風寒邪氣。不拘冷熱二證。並宜可服。惟慢驚慢脾不用。

乾葛三兩

淨香附二兩 淨洗

升麻淨洗

青皮去白

陳皮去白

穀芽淨洗 乾

麥芽淨洗 乾

桔梗剉炒

紫蘇和根

縮砂仁

甘草

神麴炒

赤芍藥十一兩 各一味

麻黃同上

枳殼同上 製二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。或入薑、蔥同煎。有積加水、酒、麴。熱多添燈心、竹葉煎投。

速效飲

治長成小兒。因他物或跌著觸損兩目。血脹腫痛。

荊芥穗

薄荷葉

二味各半兩

草決明

微炒

甘

草

三錢生用

右爲粗末和。半生半炒芝麻等分。炒二錢。在掌中盛。以乾喫咀嚼。味盡吐去渣。如此法投三五次即效。

柴胡飲

治骨蒸疳氣。五心煩熱。日晡轉盛。口乾無味。渴多身瘦。胸滿痰緊。小便黃色。食減神昏。

北柴胡

去蘆淨洗

人

參

去蘆

當

歸

酒洗

黃

芩

赤芍藥

甘

草

炙六味各一兩

大

黃

生用

桔

梗

去蘆

北五味

去梗

半

夏

同上製四味各半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。烏梅小角。薑二片。煎七分。無時溫服。

四順飲

治血脈壅實。藏府生熱。煩赤煩躁。四肢驚掣。及因乳哺過傷。寒暄失理。令兒腸胃不調。蘊蓄積滯。並風熱結核。頭面多生瘡癬。目赤咽痛。

當歸酒洗二兩

大黃半兩

赤芍藥三兩

甘草一兩

右件剉焙爲末。每服一錢。湯調溫服。不拘時。

清肺飲

治肺受風邪客熱。嗽聲不斷。氣促喘悶。痰壅鼻塞。流涕失音。及解時行疹毒豆瘡。涎多咳嗽。咽痛煩渴。

人參去蘆半兩

柴胡淨洗二兩

杏仁湯泡去皮尖

桔梗剉炒

赤芍藥

荊芥

枳殼同前製

桑白皮剉炒

北五味

麻黃同前製

半夏同前製九味各一兩 旋覆花五錢

甘草半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。無時溫服。或入薄荷同煎。

沖和飲

治感冒風寒。頭疼發熱。肩背拘急。惡心嘔吐。腹痛膨脹。兼寒溼相搏。四肢拘急。冷氣侵襲。腰足疼痛。

蒼朮同上製一錢 人參去蘆 前胡去蘆 桔梗剉炒三錢

枳殼同上 麻黃同上 陳皮去白三錢 川芎

白芷半 夏同上 當歸酒洗 薄桂去粗皮

白芍藥 赤茯苓去皮七錢半 乾薑 厚朴同上製二錢

甘草炙七錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。無時溫服。傷冷惡心嘔吐。

煨薑同煎。開胃進食。加棗子煎。空心溫投。寒疝痛。入鹽炒茱萸。茴香同煎。

明目飲

治心脾蘊熱。肝受風邪。致兩目羞明。經久不瘳。

山梔仁 淨香附二味各一兩 夏枯草去梗半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。蜜大匙。煎七分。無時溫服。

玉露飲

治頰赤咽乾。心煩躁。睡不穩。身熱頭痛。兼中暑發渴昏悶。小便不通。驚氣入腎。夢中齧牙。加金珠散。薄荷湯。空心溫服。

寒水石 中有細紋以手可碎者是

石膏 潔白堅硬而有鱗壁者是二味各一兩重

甘草 三錢曬乾天陰火焙

右除前二味外。甘草剉曬或焙。同爲細末。每服半錢至一錢。溫湯無時調服。或麥門冬熟水。

寬氣飲

主通利關節。除胸膈痞結。消痰逐水。進美飲食。及治蓄氣而成搐。傳變急慢驚風。氣逆不和。精神昏倦。

枳殼 同上

枳實 同上製二兩

甘草 炙二味各半兩

右件剉焙爲末。每服半錢至一錢。淨湯無時調服。驚風痰搐加薑汁。葱湯同調。熱極者入寬熱飲。薄荷蜜湯調下。或麥門冬湯。

菰豆飲

解誤服熱劑。煩躁悶亂。或作吐或狂渴。宜先投之。次服對證藥劑。

萊豆粉一斤

淨黃連

乾葛

甘草三兩

右除萊豆粉外。餘三味或曬或焙爲末。入乳鉢同萊豆粉杵勻。每服半錢至一錢。溫豉湯調服。

寬熱飲

主伏熱在裏。風痰壅滿。氣促昏悶。或脾胃停滯。日久飲食減少。而黃脈實。發熱無時。並宜可服。

枳

殼去麁心兩剉片巴豆十五粒作二邊去

大黃一兩

粉

草七錢玄明粉二錢

右前三味。剉焙爲末。臨入玄明粉。乳鉢內同前藥末杵勻。每服半錢至一錢。兒小者抄一字。並用薑蜜湯無時調服。或薄荷湯。

赤蒼飲

主脾胃因虛受溼。面浮而黃。或徧身作腫。飲食減少。氣不升降。小便赤色。腹肚膨脹。咳嗽有痰。及腫後當服神妙。加草果仁炮過水。薑棗煎投。

赤茯苓去皮

蒼朮同上製二味

枳殼同上製

藿香和根

半夏同上

淨香附

紫蘇和梗

厚朴同上

陳皮去白六味甘草炙一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

化蟲飲

治化蟲毒在腹作痛。

檳榔

酸石榴根皮淨洗焙乾二

紅丹服過

雷丸

貫衆如雞頭使君子肉薄切焙四味

甘草

枳殼同上大黃三味各

右爲細末。用清油煎雞子一枚。如春餅樣。候冷抄藥末一錢於上攤勻。空心捲而食之。兒小者用糯米粉水煮糊圓。粟穀大。每服十五圓至三十圓。以淡猪肉汁空心下。雞肉汁亦好。

玄參飲

治瘰癧證。及頸上生惡核腫痛。

玄參

升麻二味各

川烏炮裂去

草烏炮裂去

當歸酒洗

川芎

赤葛

生乾地黄

赤芍藥二錢七味各半

甘草三錢

大黃半生半炮四錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

參香飲

治胃虛作吐。投諸藥不止。

人參去蘆一兩

沉香

丁香

藿香和梗

南木香四味各二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。去渣。臨入薑汁少許。作三次空心溫服。

健脾飲

健脾養胃。理嘔吐。治瀉痢。及諸病後氣色虛弱。有痰惡心。腹中微痛。飲食減。精神慢。並宜投服。

厚朴同上製再熱炒入醇醋

人參去蘆二味各一兩

白茯苓去皮

肉豆蔻半 夏同上

益智仁

淨香附五味各二錢半

夏薑剉片東 訶子肉二錢各

甘草炙五錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。空心溫服。或無時。

五皮飲

主頭面四肢浮腫。時有微喘。飲食不進。

大腹皮淨洗焙乾

桑白皮去粗皮剉炒

茯苓皮淨去埃土

生薑皮略洗焙乾

陳皮去白兩味各一兩

右件咬咀。每服三錢。水一盞。煎七分。無時溫服。此劑但多投自然作效。勿以見方不重藥爲誤。

立效飲

主口內牙根舌上發瘡作痛。致語言飲食不便咽痛。茶清調下。

淨黃連一兩

北細辛去葉二錢半

玄明粉二錢

右件細剉。或曬或焙爲末。仍同玄明粉乳鉢內杵勻。每用一字。乾點患處。或以一錢。新汲井水調塗瘡上。兒小者畏苦不肯點。用蜜水調抹爛處及舌上。令其自化。

沉香飲

治吐痢後。神昏倦怠。飲食減少。脾胃氣虛。水穀不化。或隨時直下。五心煩熱。盜汗常出。或聞食心惡。

沉香

丁香

南木香

藿香葉四味各二錢半

陳皮去白

白朮

半夏同上

白茯苓去皮

肉豆蔻五味各五錢

粉草炙三錢

右除沉香、丁香、木香不過火。餘七味或曬或焙。仍同前三味研爲細末。每服半錢至一錢。用紫蘇、木瓜煎湯。空心調服。棗湯亦好。

拔毒飲

解風熱毒氣。上攻頭項。浮腫作痛發驚。及治發斑。

天花粉去粗皮

生乾地黃淨洗

白芷

當歸尾酒洗

桔梗劉片蜜水炒過

甘草五味各半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

藿香飲

理虛化痰。及治脾胃不和。飲食少進。正氣除邪。

人參去蘆

半夏同製

赤茯苓去皮

甘草炙四味各一兩

蒼朮同上製

陳皮去白

藿香去皮二味各七錢半厚朴同上製

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。空心溫服。或入燒鹽同煎。

參蘇飲

解驚風煩悶。痰熱作搐。咳嗽氣逆。脾胃不和。

人參去蘆

紫蘇和梗

前胡去蘆

乾葛

半夏同上

赤茯苓去皮六味各七錢半

枳殼同上

陳皮去白

桔梗剉炒

甘草四味各五錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑三片。煎七分。無時溫服。

紫草茸飲

和益脾胃。催張豆瘡。庶使易收。不致傳變。

紫草茸無微茸取近蘆半寸者代

人參去蘆

黃耆生用

當歸酒洗去尾

白芍藥

甘草六味各半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。糯米五十粒。煎七分。無時溫服。或入棗一枚。去核。

同煎。

天麻飲

治諸般風搖。不省人事。

天麻補亮

川

烏炮製去皮二味各七錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑三片。慢火煎若稀糊。無時勤與溫服。

黑白飲

治臍風氣實者。及急驚壯熱發搐。

黑牽牛半生半炒

白牽牛半生半炒

大黃生用

陳皮去白

檳榔五味各半兩

甘草炙三錢

玄明粉二錢

右除檳榔不過火。餘五味或曬或焙。仍合檳榔爲末。同玄明粉入乳鉢再杵勻。每服半錢至一錢。溫蜜湯調化。空心投服。或無時。此藥新合最妙。久則效遲。

白附飲

治肝風剋脾土。痰涎壅盛。和飲食吐出。蓋風能生痰。痰壅甚食故吐出。

白附子

南星生用

半夏生用

川烏生用仍去皮臍

天麻

明亮

陳皮

去白

南木香

全蠍

去尾

僵蠶

去絲

丁香

各二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞半。薑三片。慢火煎七分。作五次空心溫服。

二仙飲

治瘧疾。不拘歲月遠近。

青蒿

去梗二兩五月五日采暴乾用

桂枝

去粗皮半兩

右二味。剉曬爲末。每服一錢。寒熱未發前。用涼酒調服。或先隔晚。亦以酒調下。加香薷葉二兩。好茶芽半兩。合研成末。又名斬邪飲。治證下法同前。療暑瘧尤勝。

雙金飲

治下痢赤白。晝夜頻密。及泄瀉經久。

大罌粟殼

去蒂剉碎蜜水炒透晒乾一兩

大川芎

剉碎釀醋炒透候乾半兩

右二味。再曬或焙爲末。每服一錢至二錢。用粳米清湯空心調服。或溫蜜湯。

大順飲

解冒暑毒。煩渴吐瀉。腹痛發熱神昏。或衄血咯血。及大府下血。小便黃少。口乾汗多。

細 麵二十

生 薑十六

赤茯苓去皮

粉 草二味各五兩

右先以生薑方切如菉豆樣。石鉢內略杵爛。入麵再杵勻。攤作薄片。烈日中暴乾。赤茯苓粉草二味。細剉。同前薑麵片。或曬或焙。合研爲末。每服一錢至二錢。新汲井水。無時調服。或溫熱湯。

快斑飲

治痘瘡出不快。

麻 黃去節存根一兩半略以酒浸透一宿焙乾

紅色麴半兩

薄 桂去粗皮

甘 草二錢各

右剉焙爲末。每服一錢。用溫白湯無時調服。

消暑清心飲

解伏熱中暑。煩躁作渴。神氣不清。及有驚搐。名暑風證。投之卽效。

香 薷去老梗

澤 瀉去粗皮二兩扁豆同上

淨黃連

羌活

猪苓去皮

厚朴同上製

白朮

乾葛

赤茯苓去皮

升麻

川芎十味各半兩

甘草二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時帶涼服。治暑風證。先投此劑得效。次服卻暑丹。其搐不致再發。

定喘飲

治夾風痰喘氣促。不拘冷熱二證。

人參去蘆

麻黃不去根節

防己去黑皮

訶子去核

半夏同上製

甘草六味各五錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

常山飲

治瘧後單熱不退。

常山

檳榔二味各

烏梅一兩和核

右前二味各剉片。各用醇醋釀一宿。常山炒乾。檳榔曬乾。仍同烏梅咬咀。每服

二錢。水一盞。煎七分。熱未發。先空心帶涼服。仍忌雞酒羊麵生果毒物。有寒熱經久不除者。加此劑於小柴胡湯。或藿香飲內。同煎亦效。

消毒飲

解急驚風毒。赤紫丹瘤。壯熱狂躁。睡臥不安。胸膈滿悶。咽喉腫痛。九道有血妄行。及徧身瘡疥。

牛蒡子 六兩

荊芥穗 二兩

甘草 一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

縮砂飲

和胃氣。消宿食。及理腹痛。快膈調脾。

沉香 一兩

縮砂仁

烏藥 二兩 各

淨香附 四兩

甘草 二錢

右除沉香不過火。餘四味剉焙。仍同沉香研爲細末。每服一錢。用溫鹽湯無時調服。或空心燒鹽湯調下亦好。及紫蘇棗湯尤妙。

定吐飲

治吐逆投諸藥不止。用此神效。

半

夏

同前製改細末二兩

生

薑

淨洗拭乾和皮二兩薄

桂

去粗皮咬咀三錢

右生薑切作小方塊。如萊豆大。同前半夏和勻。入小鐺內。慢火順手炒令香熟。帶乾。方下桂再炒勻。微有香氣。以皮紙攤盛。地上出火毒候冷。略簸去黑焦末。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。稍空心少與緩服。

萬安飲

此劑能推陳致新。除邪輔正。和益脾胃。宣通氣血。調順飲食。疏解風寒。寧心化痰。去煩理熱。不拘證在表裏。並宜可投。常服百病不生。貞元益固。補養諸虛。亦有驗矣。此方與宣明論當歸飲相類不遠。治法最多。其藥品之外。惟加枳殼半夏。

人

參

去蘆

當

歸

酒洗

大

黃

生用

防

風

去蘆

柴

胡

去蘆

枳

殼

同前製

半

夏

同上

芍

藥

淨洗

黃

芩

甘

草

十味各一兩

滑

石

末六兩

右件咬咀。除滑石末臨入和勻。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。或加棗一枚同煎。

# 金餅門

## 金類

### 一字金

治初生嬰孩一七之外。欲成臍風撮口。及卒中急驚慢風。牙關緊閉。痰涎上壅。

僵

蠶去絲

威靈仙

去蘆二味各四錢

明白礬

生用二錢

細

辛

去葉一錢

甘

草

生用二錢半

右件剉焙爲末。每服一字至半錢。薑汁沸湯調和。以指抹入牙關內。治卒中急慢驚證。口噤不開。用鹽梅湯調擦上下牙根二處。

### 一匕金

治痘瘡黑陷。或變紫黯色。證在急危。但投此藥。亦能頓蘇而復紅壯。則此劑又勝人齒散。若精神昏慢。口鼻氣冷。不復救矣。

穿山甲

同上製五錢

紅色麴炒

川烏一枚

灰火中帶焦炮二味各二錢半

右研爲末。入麝香半字。同在乳鉢杵勻。每用一匕。用葱白濃煎湯調下。止投一

服或二服。

一抹金

治偏身生瘡。潰爛如糜梨。燥痛膿汁不乾。

黎蘆淨洗焙

蛇牀子去埃土

紅丹火飛過三錢 硫黃

赤石脂

明白礬火飛過

五倍子去內蟲屑 黃礬去粗皮五錢

輕粉五十貼

右前入味。或曬或焙爲末。仍同輕粉在乳鉢再杵勻。用生肥猪膏碎切。以瓦鉢和藥末爛杵。塗抹患處。或清油調搽亦可。

餅類

香橘餅

治嬰孩過傷乳食。或吐或瀉。及病後虛中感積成痢。氣弱神昏。面黃目慢。

南木香

陳橘皮去白

青皮去白三錢半厚 朴同上製

縮砂仁

神麴溼紙裏炮

麥芽淨洗焙三錢 稜炮剉三錢

右除木香不過火。餘七味剉焙。仍同木香研爲細末。煉蜜捻作餅子。如芡實大。

每服一餅至三餅。用棗湯化開。空心溫服。米清湯亦可。

通聖餅

治大府閉澀。連日不通。滿腹膨脹。氣壅悶亂。服藥罔效。

淨黃連二錢

巴豆

生蒜一箇

生鹽半錢

右以黃連剉碎爲末。同後三味石鉢內爛杵。捻作餅子。寸半闊。貼臍。緊搓乾艾。切作菉豆大五枚。作五次安臍間餅子上。以火灸之卽通。

薑豉餅

治久因溼氣中於膀胱。復爲風邪客熱攻激。小便不利。臍凸腹脹。食減作痛。先投解表散。後用此藥貼之。

生薑

碎一兩

生葱

五根

豆豉

七錢

生鹽

一錢

生蒜

七個

醱糟

一盞盞無穿山甲

同五錢

上製

右件入石鉢內同杵爛。捻作餅子。二寸闊。用微火炒熱。帶溫貼臍上。外以絹帕兜住。如冷。依前法換帶溫者貼之。或再以火烘煖亦好。

拾遺

香艾圓

此劑小兒常進驚積自除。色澤殊異。手足肥健。脾胃調和。兼理男子婦人諸虛不足。生氣血。暖中焦。固養精神。消進飲食。男子服之。身體強壯。寒暑耐安。婦人投之。百病不生。經脈通順。

淨香附 一斤

乾艾葉 四兩

右二味。瓦器盛。用醇醋浸經七日。於淨鍋內用火煮令醋盡。就炒乾研爲細末。仍用醋煮粳米粉爲糊。入乳鉢亭分杵勻。小兒圓如蘿蔔子。大人圓如梧桐子。每服三十圓至五十圓。或七十圓。湯酒米飲隨意送下。並不拘時。婦人血氣素虛無生育者。加琥珀二兩。同作圓服。極效。粒數湯使下法。亦依前。或用棗湯。

烏白圓

治五六歲以上小兒。頭風苦痛。或一邊作痛。及療耳聾耳。

綿川烏

湯浸潤略去皮臍

草

烏略炮去皮

川白芷

蒼

朮

如上製四味各一兩

右件剉焙爲末。用生葱汁合麵糊圓。菴豆大。慢火焙乾。晴曬亦好。每服三十圓至五十圓。或七十圓。食後臨臥用溫清茶送下。其葱汁法。用生葱不去根葉。入

水同搗爛取汁

既濟解毒丹

治小兒中熱。睡中齧牙。夢語驚悸不寧。或吐血溺血。強渴引飲。手足動搖。狀似鬼祟。並宜投服。

淨黃連五分

黃蘗去粗皮製

黃芩淨者

大黃二錢各半

肉桂去粗皮製

枳殼同上

白茯苓去粗皮各二錢甘草七錢

右除桂不過火。餘七味剉焙。仍同桂爲末。滴水乳鉢內熟杵。圓菴豆大。帶潤以水飛。硃砂末爲衣。陰乾。每服三十圓至五十圓。用麥門冬熟水無時送下。吐血溺血。梔子仁煎湯下。兒小者。薄荷湯磨化投服。

輕粉散

治長成小兒。蟲蛀牙疼。飲食不便。

輕粉

白礬生用

雄黃

紅丹四錢各一錢

麝香半字

右件入乳鉢細杵爲末。先用五倍子、鶴虱、生葱。煮水大半盃。候溫灌漱令淨。次

以前未藥一字或半錢擦患處。六七次即效。

獨聖散

治嬰孩滿口白屑。或如粟穀。糜爛作痛。不能乳食。晝夜煩啼。此名鵝口證。

大北南星

劉開白者爲佳不拘多少

右件爲末。炒一錢或二錢。醋蜜調塗顴門上。於中間留一小指大不塗。及傅男左女右足心。仍以立效。飲溫蜜水調點舌上。令其自化尤佳。

藿香托裏散

治諸腫毒癰疽。已潰未潰者。及疔瘡流注偏身。並內外一切黃證。惡心嘔逆。憎寒壯熱。晝夜疼痛。不拘老少。悉宜服之。此藥非特解毒。大能正氣理虛。祛風去煩。排膿活血。定痛消腫。

藿香

連翹

山梔仁

川當歸酒洗

木通去節

芍藥

僵蠶去絲

甘草入味各二錢半

大黃生用

茵陳

黃耆生用

貝母四味各五錢

右件咬咀。每服二錢。酒水各大半盞。煎八分。病在上食後溫服。病在下食前溫

服。

### 拔毒散

治癰犬惡犬所傷。不拘老幼。並宜可投。

斑

蚤七枚去翅足用屋瓦藏入糯米同炒候米黃為度以乳鉢細杵羅過不用米

黑牽牛末二錢半先研取末

右二味和勻。用無灰溫酒調作一服。空心投。其毒自小便中出。或從大府過。似葡萄肉。或如犬形。見毒出盡。尚覺腹中有痛。取用青黛入乳鉢杵勻。仍羅為末。每服三錢。井花水調下二服。不拘時。

### 神應散

治小兒大人虛嗽。神效。

罌粟殼

去硬碎剉碎蜜水炒

杏

仁

湯泡去皮尖炒過

白膠香

浮者水煮過瀝乾

人

參

去渣

阿膠

剉碎炒過

麻

黃

去節存根

烏

梅

和核五味各二兩

桑白皮

去粗皮炒過

款冬花

淨者四味各一兩

甘

草

炙一兩

右件咬咀。每服二錢。水大盞薑三片。棗一枚。煎八分。空心溫服。或不拘時。

### 涼肺散

治小兒大人一切實嗽。

桑白皮

去粗皮剉碎蜜水炒過二兩

桔

梗剉炒

天花粉

淨者

乾葛

麻

黃

根節不去

薄

荷和梗

黃

芩

杏

仁皮不去

知母

貝

母

木

通

去節十味各一兩

款冬花

淨者

麥門冬

去心二味各七錢半

甘

草

生用一兩八錢

右件咬咀。每服二錢。水大盞。薑三片。葱一根。煎八分。無時溫服。如有熱氣促。加大黃製。枳殼各一兩。

玄明粉

治腎水衰虛。肝經邪熱。視物不明。或生障翳。脰肉攀睛。迎風淚出。或如蠅飛油星。或睛澀腫痛。癢不可忍。並皆治之。及療風熱上壅。咽痛口瘡。痰實咳嗽不活。悉宜加諸藥內。自然作效。

明淨朴硝

右於臘月霜雪凝寒之際。用皂莢三兩重。略炮搥碎。溫熱湯六盞。擲去渣浸化。薄皮紙二重濾過澄清。入鐵鍋煮至一半。候溫。傾出瓦盆內。於見天處露一宿。

次早結塊。再用淨熱水六盃化開。入大蘿蔔八兩重。切作二分厚一片同煮。見蘿蔔熟爲度。仍便在瓦盆去蘿蔔片。放在見天處露一宿。次日結塊去水。取去瀝乾。入好皮紙袋盛。懸掛當風處。自然成粉。用以點眼。只如常法。治風熱等疾。隨意加減用之。

### 必勝散

治小兒大人病中聞飲食藥氣。卽惡心乾嘔。不能療者。

川白芷不拘

右件剉曬。或焙研爲細末。抄一字及半錢於舌上。令其自化。或用掌心盛之。以舌舐嚥。兒小者。溫淨湯濃調。少與含化。並不拘時。至六七次卽效。

### 遠徹膏

治大小府秘澀。投諸藥無驗。不拘老幼。並皆療之。

穿山甲

尾足上者佳  
燒透二錢重

五靈脂

淨者二錢重

右二味研爲細末。次以巴豆二錢重。去殼研碎。和前藥末。仍用大蒜四錢重。去上粗皮三五層。於砂鉢內爛杵如泥。圓作一餅。納臍中。以絹帕繫之外。以掌心

火上烘熱。熨至八九次。聞腹中微響即通。

至聖散

治老幼暴吐。服藥不止者。神驗。

枇杷葉

淨刷去葉後毛。碎二兩重。

半

夏

父母且淨者。四兩重。

右件用生薑四兩重。切作菉豆大。拌勻。釀一宿。慢火炒令微焦色。以皮紙盛於地上。候冷。每服二錢。水一盞。煎七分。去渣。空心少與。緩投。或入諸藥內同煎服。亦效。

八仙飲

治小兒男子婦人。血風目疾。經久不瘥。晝夜澀痛。視物不明。甚至生翳散漫。投諸藥未驗者。

生乾地黄

淨洗焙乾。

赤芍藥

大川芎

羌

活

川當歸尾

酒洗焙乾。

龍膽草

漢防己

甘

草

八味各五錢。

右件咬咀。每服二錢。水一盞。白蜜半匙。煎八分。去渣。食後臨臥二時溫服。

活幼心書終

跋一

曾世榮活幼新書上中下三卷。上卷爲決證詩賦。中卷爲明本論並拾遺。下卷爲信效方並拾遺。余向曾見此刻多闕失。故未收。後又收得一本。非此刻矣。適從五硯樓以醫書一櫥歸海寧友人。余爲之介。遂檢得是書。中多缺葉。影鈔別本補全。卽所收之又一本。而非原刻也。重付裝池。而識其緣起如此。

嘉慶辛未中秋前二日復翁丕烈識

活幼心書跋一

跋一

元本活幼心書三卷。每半葉十一行。每行二十一二字不等。蓋至元甲午曾氏原刻全裘。藝風前輩所藏。士禮居本也。德顯出處無徵。是書辨證詳明。處方精密。允爲仁人之言。自序備述淵源。極有心得。爰爲重刻。以廣流傳。同治衡陽縣志及各家著錄。多作新書。黃跋偶沿其誤。千頃堂書目。光緒湖南通志。據抱經堂補元志。並作二卷。殆亦未見全書。明宣德庚戌有修補本。日本高保甲寅曾爲校刻。皆不及此本之善。因屬翟君展成鳳翔蕭君伯丞延平再三讎校。改正良多。並附校記於後。其昭晰無疑者。不復贅列。庶後之君子有所考焉。

宣統二年庚戌二月武昌柯逢時



活幼心書校記

決證詩賦卷上

吳序

善狀

狀原

反激他證

反原

成效之速

成原

作或速

決證詩六論

因有薄荷

原文恐誤下文有皮嫩皮厚之說或係皮有薄厚之訛

皮嫩

嫩原

不言之疾乎原

耳作

詩七論

蓋周歲以前

蓋原

盡疏滌積聚

滌原

詩十九

揚晴

原作

詩五十一

風痰結聚

風痰原作冷熱據明本論咳嗽十一改

詩五十六

風溼

溼原

詩七十一

暑溼

溼原

賦七十五

腎有證攻

腎原

怨咨

咨原

晉代叔和

代原

明本論卷中

胎寒一

庶漸瘥也

漸原

夜啼四

遏熱鎮心

遏原作獨

急驚五

目睛

原作日晴

如怒

怒原作怒

勻氣

散止

補

勻原作鈞

慢驚六

惟載

陰癇作載

不可

治也

治原作治

風毒七

營化

營疑作銘

但依

前

依原作依

傷積八

風寒

所襲

襲原作資

熱證九

面慘

慘原作慘

恰

五百

一十二

日

怡原作怡

腹疼

嘔吐

腹原作腹

中指

獨自

冷

中指毒獨令

遇晚

二發

二疑誤

傷寒十

省音

省原作省

肩閒

以無

驚圓

圓原作圓

圓

本書丸多作圓

備沿宋槧名

遠

然

出外

據原作據

正氣

將衰

正氣二字增

百骸

骸原作骸

咳嗽十一

癖塊

頑塊作頑塊

吐瀉十二

詳究

治法

究原作丸

養宗

筋

宗原作宮

諸吐十三

其吐

自減

減原作咸

諸瀉十四

素弱

素原作素

化癖

圓

瘕原作瘕

粳米

粳原作占

案粳應作稅

糞稠

糞原作姜

赤白痢十五

亦效

效原作效

腫證十六 施治施原兩脇脇原鴨塘塘原手足背皆腫背原其腫如初其原

脫肛十九 風屬木木原

癰證二十 七情所汨汨原

瘧疾二十一 閒日而作閒原勻氣散止補勻原加草果果原為醫為父母者者原

在醫字下

瘡疹二十六 發之亦少之字原導赤葛散導字為其藥性藥原異功散功原噬

臍臍原蚊蚤蚊原病必致危病原

陰囊腫二十七 縱弛弛原感風溼溼原

驚癰鶴膝二十八 閒服排風湯閒原

五淋三十 而為洩洩原名曰陰閉閉原薑豉餅豉原

口瘡三十三 脣弦弦原

諸瘡三十四 及三解散及原乃木通散閒服閒原

目疾三十五 紅弦弦原

重舌三十七 卷音捲音卷札針札原

五軟三十八

鞠音報

原作鞠音昂

諸汗三十九

驚汗

汗作肝

黃證四十

兩目弦

弦作弦原

辨藥病不相主對二

所傳藥性

傳原作侍

評非時用附子大黃四

侯自牧

侯原作侯下同推

信效方卷下

目錄

使君子圓

圓原作丸以下

拾遺目錄

凡十四原無今補

白芍藥湯十

臍下痛

臍作劑原

六和湯三十三

水一盅

盅作中原

黃耆六一湯三十四

口揚

揚作揚原甘草一兩缺一原

坎離湯三十七

甘草

無分數或下二味當是三味

化丹湯四十

石膏末

無分數薄桂下注入味各五錢當移此

雄黃散六

川烏頭

此葉鈔補作川芎按重

瀉黃散二十七 微炒香錢氏原作妙據

調元散二十八 手足如癰癰作簡

霹靂散五十 白芷三味各二錢原作

麝香人齒散五十六 入腎作胃

補腎地黃圓九 取皮爲用則

香陸胃苓圓十一 此藥作菰

二薑圓十二 就帶潤作滯

沒石子圓十三 肉豆蔻一枚模刻

二聖圓二十三 逐水作逐

地黃膏三 納口內作紙

烏豉膏六 作顯原作

劫風膏十四 劫原作方

寬熱飲十一 見微黃色去巴豆片原作見微去黃

白附子飲二十六 白附飲共十味原注五味各二錢菰據

拾遺

輕粉散四

五倍子

倍原作部

藿香托裏散六

托原作托

拔毒散七

犬形

形原作刑

玄明粉十

蠅飛

飛類方準繩改

