

癰痰

科癰

全法

書門

全

中國醫學大成第八集

外科叢刊之一
外科類甲

癰
科
全
書
全

上海大東書局印行

音 士 矩

癰 痰

癰 癰

全 法

書 門

冊 一 合

角 一 幣 國 價 實

中華民國二十七年五月初版

原 著 者

清 · 梁 柘 軒
清 · 李 子 穀

發 行 人

上海北福建路三三一號
沈 駿 聲

印 刷 者

上海北福建路三三一號
大 東 書 局

總 發 行 所

上海福州路三一〇號
大 東 書 局

分 發 行 所
開封 安慶 常州 無錫 信陽 大東
南京 北平 天津 濟南 漢口 蕪湖 重慶
徐州 南昌 雲南 杭州 廈門
汕頭 廣州 衡陽 哈爾濱 書局

癰科全書提要

清梁柘軒著。柘軒字希曾。嘉應人。先生對於癰癰一科。夙有研究。以爲症候可分爲十五。原因雖非一類。然皆由於體質痿弱。血液乾枯。陰虧火鑠。氣滯痰凝。其毒久伏於臟腑。一旦發於肢體。遂根深蒂固。牢不可拔。先生主外用點癰藥。內服湯丸消散。以潛移默化。首辨癰症之原理。次辨癰症之證治。再次列點癰之藥方。點藥之用法。癰症食物之忌宜。足爲癰科證治之專書。據炳章診察之經驗以觀。近世癰癰症之多。皆以治法不當。每致潰爛而夭。爰將是書與李子毅痰癰法門合刊一冊。俾世之治癰癰痰核症者。有所取法。

侯序

醫之爲任重矣。天下之業醫者多矣。善醫者固藥到回春。如響斯應。有回生起死之功。不善醫者。往往操庸劣手段以嘗試。而卒以殺人。間有一二醫者。得一最靈驗之奇方。則祕而不肯示人。藉口以方傳不效。其實持金錢主義。藉是方以博取人財。惟吾鄉柘軒梁先生。人本儒素。術妙岐黃。金匱玉函。悉心研究。凡遇內外奇難諸症。靡不應手奏效。而於瘰癧一科。尤爲獨具手眼。具徵心得。夫瘰癧分三十六症。雖內傷外感。原因不一。類皆由於質體痿弱。血液乾枯。陰虧火鑠。氣滯痰凝。其毒久伏於臟腑。而一旦發於肢體。根深蒂固。牢不可拔。中醫多用吊丹。西醫多用剖割。徒欲以霸術取速效。卒之愈吊而毒終不散。愈割而瘰癧總叢生。駸駸然。臟腑內蝕。肢體外潰。遂致十瘰而終不得一生。是非死於症。實死於醫耳。先生於是症。

則神乎其技。外治則頻以藥點之。化朽腐爲神奇。具見手法之高。內治則審其寒熱虛實以施治。取其潛消默化於無形。尤徵心法之妙。今復將其治癰全科。先論症。後列方。源源本本。朗若列眉。俾天下後世之業醫者。知所則效。而天下後世之患癰者。亦得所生全。蓋先生久以醫術名中外。初則駐上海。駐香港。繼則游歷南洋十餘島。今則寄跡鮑江。微特雪晨雨夜。暑日炎天。有請則輒應。從不過取人錢物。且每日必限數點鐘。以盡贈醫義務。論者謂先生造福於人者大。而天之錫福於先生者亦宏。春回壽寓。種佈福田。先生哲嗣銳元。以十二齡之童子。果見賞於名公。現入京師高等學堂肄業。試輒高列前茅。他日學成。爲國家用。將大有造於天下。是則父爲良醫。子爲良相。利濟同功。食報正未有艾也。噫。先生絞腦汁費心血而成是書。先生濟世之心苦矣。適遇敝族蘭汀。由暹回國。慨然擔任付梓。以傳世。先生濟世之心慰矣。先生濟世之功亦不朽矣。用是不揣譴陋。聊弁數言。以爲

世之業醫贈醫。兼有祕方者。勸是爲序。

宣統二年春月

古梅侯家驥序於品梅小築

張序

凡病必有治病之方。而知其方者。往往秘而不傳。動曰。傳則方不靈驗。果如所言。則古人傳世之方書。其皆不靈驗矣乎。嗚呼。存射利之心。忍令天下後世之人。抱病而枉死者。弗可勝計。良堪悲痛。吾州梁柘軒先生。夙有不爲良相必爲良醫之志。凡內外各科醫道。莫不悉心研究。而治癰尤爲所長。夫癰危症也。有二十四症。三十六症之名。而大抵由陰虛火盛。挾風痰而成此毒核。其病源久伏於臟腑。根深蒂固。非內外兼治不爲功。時醫不得其治之方。爰有十癰九死之說。先生攷求有素。於外治得其獨一無二之點藥法。內治則以辨寒熱虛實。握其大綱。藥到回春。百試百驗。固已中外揚名矣。人本寒儒。而心存濟世。到處行醫。每日必有數點鐘爲贈醫之時。其胞與爲懷。於此可見。今復將其治癰之方法。和盤托出。付諸

手民。爲天下後世之患癰症者。廣開生路。此其種福恩田。釀功德水。實大而遠。懿哉。此舉尤足風世矣。吾聞之。積善必有餘慶。今先生之哲嗣童年飽學。名動公卿。招入京師學堂肄業。試輒領其前鋒。他日學貫中西。蔚爲國器。意中事耳。論者謂此爲先生仁心壽世之報。其信然也。然則利人卽以利己。其利益莫大乎是。合并誌之。以爲業醫者勸。倘天下業醫之人。概如先生以利濟爲心。凡有秘方。悉爲傳世。俾天下後世同登仁壽。無復有抱病而枉死者。夫非生民之幸福乎哉。夫非生民之幸福乎哉。

宣統元年夏月

嘉應張衡皋序於鮑江八屬會館

自序

千古文人之筆。最懼雷同。獨醫學則最患不能雷同耳。未有患是症不用是方。而能療是疾者。歷觀諸名家醫書。多是各立一說。殊少定見。其於花柳頸癰。尤茫無善法。卽西醫亦然。總不出強硬手段。中材以上之人。閱是書尙可活人。中材以下之人。閱是書非第不能活人。甚且誤人多多不少矣。噫。醫之道最微。微則不能不深究。醫之方最廣。廣則不能不小心。差之毫釐。失於千里。孟子云。術之不可不慎。此之謂也。故凡業醫者。不特難以議目前。實則最難辦善後。今人於外科一門。多行霸道。不顧人命。取求近功。離醫之道益云遠矣。僕之醫則不然。專以王道爲事。如頸癰也。人多用剖割。或用丹出核。僕則專用潛消。奏效雖久。不特形質無損。更可永保無虞。如花柳也。人多用吊丹。或大攻大瀉。僕則專用內解。成功又速。不特

元氣無傷。且無下漏癰瘻牙際湧血之慮。至於內科等症。精微奧蘊。言不勝言。要皆以善後爲本務也。所以僕於花柳頸癰兩門。尤爲細心研究。十餘年來。盡得其中奧旨。歷治多人。發無不中。久欲刊行於世。利濟後人。無奈力恆不逮。輒爲中止。嗟乎。千古成事之難。類多如是。惟念僕自業醫數十年。皆以方便爲事。凡人之相延者。從無貧富之歧視。雖風雨必往。星夜必往。卽嚴寒地凍。酷暑炎天。亦無不往。且旦日雖無粒米之炊。亦從未嘗苛取病家分文。此則僕之所可深自信者也。以爲持是心而行僕之醫道。久而必揚。所以在外洋歷經數十島嶼。凡遇此症。莫不應效如神。愈人何止千數。從無或誤一人。越至丁未在星嘉坡旅次。果得 欽憲楊侍郎士琦。及左總領事秉隆先後品題。獎給匾額。時長男銳元。十有三齡。在星洲養正學堂。並得蒙楊侍郎嘉其童稚篤志好學。加恩特色栽培。親提北上。送往順天高等學堂讀書。今年僕在汕頭。復蒙馮警長駿委派汕頭檢查驗病所之職。

並兼得同濟延壽兩醫院之聘。其於贈醫施藥之念。益遂初心。嗟乎。爲善之願。豈可忘哉。乃者侯君蘭汀過汕。適僕之所編癰科書告成。見而大悅。慨然出資。爲僕刊板。更得侯孝廉家驥。張孝廉衡皋。合爲更正。卽將是編先行佈告同人。其中絲毫無隱。願以後普天之下。五洲萬國。書史同文。得是書而全是症者。皆遲遲鉅商侯君之所賜。亦侯孝廉張孝廉與僕之所大願也。謹誌數言。以爲天下之有秘方者勸。亦爲天下之富有一方者勸焉。時

宣統元年仲秋之月

古梅梁希曾柘軒氏自序於鮎江之檢查驗病所

癰科全書目錄

辨癰症之原理	原名辨癰 養癰法		一
辨癰症之證治	十五 原名辨癰 治癰法		六
點癰之藥方	原名點 癰藥品		二七
點藥之用法	原名點 癰法		二八
癰家之忌食			三一
癰家之宜食			三二

癰科全書目錄

動輒屢月經年。乃能奏效。大凡內外各症。其發之易者。治亦易。發之難者。治亦難。願患癰症者。毋以其醫治之時日久遠。卽輕信人言。或任庸醫用丹吊核。或任西醫用刀割割。不知愈吊愈多。愈割愈衆。竟至纏綿層疊。環頸破爛。腥穢不堪。命在須臾。皆是自誤。

一、癰之成症。其核之生。如竹根焉。如草根焉。非他症結核者之所可比。故其發也。忽左忽右。忽東忽西。忽上忽下。忽前忽後。全無定體。甚至或發連腋下。或發連胸前。或兩手臂等處。種種怪象。實難盡言。時醫不識。則多用吊丹。西醫不明。則專用割割。以爲其核爲我取去。豈有不善之理。不知此纔取出。彼核又生。纏綿不休。多致環頸皆是。坐而待斃而已。慘何言哉。希曾之醫治癰症。則以潛消爲主。隨起隨去。隨點隨乾。務絕其根蒂。使他不得再蔓延而生。論其藥。亦最淡無味。論其價。亦最賤不貴。無論貧富。皆易施治。誠千古五大洲無過之至寶也。

一、癰之成症。總不外熱痰寒痰兩者。患熱痰者居其六。患寒痰者居其二。其餘如花柳風火並挾他症而生者。亦有二焉。全在審症分明。其治自易。

一、癰之成症。原與癰瘰相表裏者也。同一陰火也。痰也。其痰其火行之臟腑。初則咳嗽吐血。隨成癰瘰。行之經絡。則爲瘰癧。有由先天而來者。有由後天而來者。先天之損由胎。故其發多在童年幼穉。後天之損由人。故其發雖年至五六十。猶不免焉。是故善治者。只理其肝脾腎三經之陰火而已。

一、癰之成症。多由肝氣鬱結。或暴怒而成。故其發多在兩耳之下。頸之左右。凡患癰症者。最宜戒惱怒。並戒燥火生痰之味。藏養肝氣。勿使其動。動則其癰雖功在垂成之際。必致反劇。驟然腫脹異常。不得怨望醫師之藥力無功。患是症者。切宜戒之。卽房勞亦所當戒。否則治亦無濟。

一、癰之成症。虛實寒熱。須辨分明。何謂熱症實症。望其舌苔黃。脣色紅。顏面有火。

氣切其脈。浮中沉三部俱堅實有力。且其人雄偉異常。全無虛寒體態。則知其症之是由熱痰而起者。何謂虛症寒症。望其舌苔白。脣色淡。顏面無血色。切其脈。浮中沉三部俱沉遲無力。且其懶弱無比。語言坐臥俱無精神。則知其症是由寒痰而起者。

一、癰之成症。除風火癰一症之外。無論初發久發。多不癢不痛。所以人多爲其所誤。以爲不甚關切。每致忽治。及至疊出無窮。或致潰爛。始恍然悔悟。已禍不堪言矣。願患是症者。早爲調治。免貽後患。

一、癰之成症。最忌夜不早眠。不早眠。則必致陰火暴發。其他勞神各事之忌。無須言矣。

一、癰之成症。查古人所立方書。尙茫無善法。多致斃命。其他割割吊丹等法。則益不堪言矣。故諺云。十癰九死。其信然矣。希曾自傳受此外治之方。再爲參考內

治之法。細心研究。百試不差。經希曾親自醫治者。可云十癰十生。縱有不治者。皆彼之自誤耳。噫。希曾今年四十有八矣。恐一旦棄世。此法失傳。千載下猶有憾焉。茲敬將所傳秘術。全盤托出。更將希曾數十年來。自己親臨各症。測準治法。並如何用藥。一一筆之於書。使後人照此醫治。斷無失誤矣。

一、癰之成症。實變化無窮。有可十天八天告愈者。有可二三十天告愈者。有三五閱月而告愈者。有久至期年而告愈者。總在其人之善爲調養。深信希曾此法醫治。斷無不瘳之理。不然。縱醫治至三十年。亦無濟也。

一、癰之成症。內外兩科相較。此最難治。希曾所列宜食品內。有粉藤根長藤胡練根兩味。和瘦猪肉服食者。此乃治氣血兩種癰症之聖藥。雖然。彼不深信者。斷不可輕易給癰家食之。何也。蓋服此兩種藥根後。必多服按症各丸藥。以固其元氣。庶不致傷損臟腑。若不多服丸藥。將來恐有吐血之病。反爲不美。患癰者

須知之。治癰者須慎之。希曾恐後人不慎。專用此藥根。誤人性命。故特摘出。醫之爲術。可不慎歟。附長藤胡練根說。長藤胡練其葉一與練樹無異。惟彼則藤生的有紅白二種。其功用皆同。能開花結子。其花與燈籠草相似。凡人患惡核。驟然紅腫者。取此藤連葉。搗加赤糖少許。貼之。奇效。并可貼對口瘡。

辨癰症之證治

(一) 氣癰 初起僅二三核。形同檳榔。以指揉之。環轉如丸。愈起愈多。此名氣癰。當用疏氣消核丸。外治照下列點藥法點之。如其人兼有實熱。亦不妨酌加芩連等味。然必須脈症相對。方爲投之無害。

疏氣消核丸

夏枯草 二兩

桔梗 一兩

柴胡 五錢

廣陳皮 五錢

半夏 八錢

元參 四兩

煨牡蠣

煨龍骨

天花粉

茯苓各一兩

白芥子

山慈姑各一兩

生甘草五錢

右藥研細末。煉蜜爲丸。如綠豆大。切勿火焙。早晚飯後淡鹽湯送下三錢。加減作湯劑亦可。

(二)血癰 初起僅一二核。形同伏杯。任指揉之。不搖不動。此名血癰。日久失治。雖未見增加粒數。亦必漸次加大。再爲失治。必日加增矣。當用調血化核丸。或用溪黃五錢。和瘦猪肉四兩。水三大碗。煲二點鐘。煲至半碗。停凍。食時再煲熱。去溪黃。將肉并湯。飯後溫食。或三日。或五日。然後再煲食。不妨多食。外治照下點癰法治之。

調血化核丸

當歸

冬葵子

老熟地各二兩

阿膠

白芍

茯苓各一兩半

杭菊花

淡海藻

昆布

燉龍骨

燉牡蠣

山慈菇各一兩

柴胡四錢

白芥子八錢

右藥研細末。煉蜜爲丸。如綠豆大。勿用火焙。服法同前。臨時加減。水煎亦可。

(三) 陰火癰 凡頸際夾起。大如卵形。堅硬異常。或一邊。或兩邊。或帶小核數粒。

此乃寒痰凝結而成。名曰陰火癰。必其人體質羸弱。或後天虧損所致。當以溫補肝腎固脾爲主。如加減六味地黃丸之類。再審其或脣舌常白。面色痿黃。並其脈沉遲無力。必兼用附桂。乃克奏功。外治概如後點法治之。

加減六味地黃丸

熟地四兩

茯苓

枸杞子鹽水炒

黃肉各一兩半

澤瀉

丹皮各八錢

炙甘草

青皮鹽水炒各五錢

半 夏 八 錢

煨龍骨

煨牡蠣

炒杜仲

白芥子各一兩

右藥研細末，煉蜜爲丸。如綠豆大。切勿火焙。服法如前。加減作湯劑亦可。

(四)無名癰。亦有驟然紅腫。非色慾所致。卽餐膳不謹。此無定名。隨症皆可致此。急用消腫湯。外治同下點法。如其人素本虛寒。仍當於虛寒症中參酌消息。用之。不可拘泥。如腫退後。仍照原症治法治之。

消腫湯

夏枯草

元 參

花 粉各三錢

山慈菇

煨牡蠣

海 藻

昆 布

桔 梗各二錢

生甘草

白芥子各一錢

右藥清水煎服。食後服之。

(五)老鼠癰 凡層疊無窮者。名曰癰癰。俗名老鼠癰。無論已潰未潰。俱隨起隨治。均照下點法。隨核點之。未收口者。並貼以拔毒膏。隨其人虛實寒熱而治之。如熱之挾咳嗽者。卽於貝母瓜蒌散。或紫苑散內酌加元參、煅牡蠣等消息用之。如挾虛寒咳嗽者。則於二陳湯內隨其症之或陰或陽。酌加四物、四君加減消息用之。各湯劑爲丸亦可。

貝母瓜蒌散

川貝母 二錢

杜膽星

焦山梔

黃芩

橘 紅 各錢
半

清水煎服。

紫苑散

北沙參

阿膠

茯苓 各三錢

紫苑

川貝母

桔梗各二錢

炙甘草一錢

五味子廿一粒

四物湯

大熟地四錢

白芍

當歸各三錢

川芎半錢

四君子湯

黨參二錢半

白朮

茯苓各二錢

炙甘草一錢

二陳湯

半夏

茯苓各二錢

廣皮半錢

炙甘草一錢

(六)童子癰 自襁褓而至成童。旋起旋消。或凝結久而不化。或時大時小。此多

由先天虛損所致。或在其母腹內。因飲食不謹而來。此名童子癰。又名乳癰。其

在三歲以內者。不能施以點核之功。如審其果係熱痰。惟用薑頭搗鹽貼之。或

黃花墨菜。白花墨菜。或燈籠草。或野菊花。或甜菜子。取根葉和赤糖少許搗貼。

或用蒼朮三黃散。用白酒開塗。內則服黃花墨菜、白花墨菜。和赤糖少許。時時煎咽之。或百合。或花粉。時災瘦猪肉食之。均宜臨症消息用之。如審其果係寒痰。外則用消腫散。或五將軍散。調白燒酒敷之。其在三歲以上者。則於各條內參酌用之可也。

消腫散

此方可治一切紅腫。並可治天蛇頭等症。

生南星

生半夏

生草烏

凋竹

細辛各五錢

重樓一兩

生甘草三錢

共研細末。燒酒調敷。

蒼朮三黃散

蒼朮

黃芩

黃柏

大黃

生南星各五錢

猪脂粉少許用猪前蹄骨火煨存性研粉用

共研末。燒酒調敷。

此方能治一切溼毒。已破口者。用淨油調。

五將軍散

生半夏一撮連根葉共生搗爛

生蚌三四隻如無蚌肉或蟹肉螺肉之屬均可

丁香少許

粗鹽少許

飯粒少許

同搗敷。此方能治一切痰核惡毒等症。

(七)催命癰 無論因何而起。誤被醫師用丹吊核。或因誤被西醫用刀剖核。以致纏綿不休。時而收口。時而破口。環頸皆是。此名催命癰。目見世人被這兩種醫生誤死者。恆不乏人。此症最爲危險。分內外法治之。內治必審其人果屬熱者。則投以清熱化痰之品。若兼咳嗽者。並理咳嗽。兼血症者。並理血症。兼花柳

者。則並解毒。若其人近陽虛者。則於化痰消核之內。重用四君。若近陰虛者。則於化痰消核之內。重用四物。虛寒甚者。則並用附桂。要皆於前後各症門中。消息用之。不拘執。各湯劑爲丸亦可。外治則與上同。用藥粉調酒。週圍點之。其舊痂之大者。並其核之大者。無論痂內核內。俱並點之。卽點其舊痂至爛。亦不妨。使他惡核潛消。卽穢濁之水。亦可隨舊痂之口。隨點隨爛。隨爛隨乾。自易收口。倘有穢濁墜下。勢欲腫脹。可將其點核之藥渣點上。立即破口。隨腫隨破。以抽乾穢濁之水爲止。此等穢濁。核不成核。膿不成膿。水不成水。不能潛消。不能拔毒。不能解化。只得用此隨腫隨破之法。抽乾其水。方能奏效。否則無濟。

(八) 絕命癰 或挾吐血而來者。或因患癰而至吐血者。俱名絕命癰。最爲難治。又兼吐血。則經絡臟腑。內外俱傷。焉得不死。其因寒症吐血而患癰者。多是五臟虛損。須大補氣血。靜養二三年。或有生理。內治則服補元消核丸。切禁黃耆。

蓋黃耆提氣故也。其因熱症吐血而患癰者。多是飲食不禁。或暴怒所致。內治則加減四生丸。或加減生地黃湯。或加減犀角地黃湯。或加減六味地黃丸。凡湯劑爲丸亦可。隨症選用。外治同上。如吐血不止。可用生蓮藕搗汁服之。或正安南桂亦可。

補元消核丸

當歸

枸杞

白朮

炒棗仁

鹿角膠

各二兩

山藥

茯神

熟地

煅龍骨

半夏

炒杜仲

各一兩

右藥研末。將鹿膠化烱。加煉蜜爲丸。服法同前。

加減四生丸

鮮生地

五錢

生荷葉

生艾葉

生側柏葉

各三錢

真鬱金 錢半

清水煎服。

加減生地黃湯

鮮生地 五錢

麥冬

白芍

丹參 各三錢

元參

懷牛膝

荷葉 各二錢

粉丹皮

焦山梔

真鬱金

參三七 各錢半

煨牡蠣

煨龍骨 各一錢

清水煎服法同前。

犀角地黃湯

黑犀角 二錢 磨汁

鮮生地 四錢

生白芍 五錢

百合 三錢

麥冬 去心

花粉

煨牡蠣

煨龍骨 各二錢

粉丹皮 錢半

清水煎服法同前。

加減六味地黄丸。方見上陰火癰內

(九)風火癰 初起或在兩耳之下。或環頸皆是。或單在左耳之下。或單在右耳之下。無論核之多少。色帶紅光。卽有欲破之勢。或作痛。或不作痛。或寒熱交作。此多由外感而來。名曰風火癰。失治則潰爛異常。須內外分治。外則用燈籠草。或黃花墨菜。白花墨菜。和赤糖少許。取葉搗爛頻敷。隨將其根連枝和赤糖煎服。未潰者。或用蒼朮三黃散。白燒酒調塗。已潰者。用地棉根葉和赤糖生搗敷上。拔去膿穢。貼收口膏。三五日卽愈。內則服活絡疎肝散。如陽虛潮熱。則服加減五味異功散。陰虛潮熱。則服加減蒿皮四物湯。

活絡疎肝散

柴胡

牛蒡子

淮七

青皮

防風

各錢半

花粉

土茯苓

各三錢

山慈菇

葛根

夏枯草

各二錢

生甘草

一錢

審有實熱酌加芩連。

五味異功散

黨參

三錢

白朮

茯苓

各二錢

炙甘草

廣皮

各一錢

有潮熱者酌加丹皮、骨皮等味。

蒿皮四物湯

生地

白芍

各三錢

北沙參

炙鱉甲

各二錢

全當歸

錢半

清水煎服。

蒼朮三黃散。

方見上童
子經內

(十)真元虛損癰。凡環頸破爛。臭穢不堪。久不收口。愈發愈衆。此乃根本虛極。氣血兩虧之症。名真元虛損癰。外治則如下點法。並貼拔毒生肌膏。或用羊屎丸。並搽羊屎散。內服補天大造丸。或加減十全大補丸。

羊屎丸

用山羊屎一斤。焙研。蜜丸。服法如前。綿羊屎不可用。

羊屎散

用山羊屎四兩。焙研。淨菜油調搽。

加減補天大造丸

黨參

白朮

山藥

茯苓

枸 杞各一兩半

當 歸二兩

炒棗仁八錢

熟 地二兩

龜 膠

鹿角膠

煨龍骨

煨牡蠣各一兩

川附子五錢

炙甘草三錢

安南桂二錢

右研末。蜜丸。不用火焙。服法如前。

加減十全大補丸

熟 地

白 芍

白 朮

黨 參

當 歸各二兩

茯 苓一兩半

川 芎八錢

川附子五錢

安南桂二錢

炙甘草三錢

煨龍骨

煨牡蠣各一兩

右藥研細末。煉蜜爲丸。切勿火焙。服如前法。

(十一)傷肝癰 其在婦人。或因姑媳不和。或因夫婦不睦。或因子女不遂。或寡而無耦。憂鬱內傷。初則或經水不調。久而或致閉而不通。陰火上炎。皆能生癰。

凝結不消。此名傷肝癰。百病叢生。極爲難治。外治同上。

內服加減逍遙散。兼服加減八珍丸。或加減調經飲。或加減歸脾湯。隨其人消
息用之。

加減逍遙散

柴胡

丹皮

焦梔子

煨牡蠣

廣皮各錢半

茯苓

白芍各三錢

白朮

當歸

半夏

白芥子各二錢

炙甘草一錢

薄荷葉三分沖

加減八珍丸

熟地

黨參

白朮

白芍各二兩

當歸一兩半

茯苓

煨牡蠣各一兩

山藥一兩半

半夏

川芎各八錢

炙甘草

廣皮各五錢

虛寒者加附、桂。

加減調經飲

當歸

生香附各三錢

川牛膝

山查

茯苓

白芥子

半夏各二錢

青皮半錢

白朮二十粒

加減歸脾湯

黨參

白朮

炒棗仁

半夏

煅龍骨

煅牡蠣

龍眼肉各二錢

當歸

白芍各三錢

遠志

廣皮各錢半

炙甘草一錢

清水煎服。

倘經閉氣塞。用丹參一味約五錢。常服奇效。或王不留行子均妙。或用少腹逐瘀湯。

少腹逐瘀湯

當歸

蒲黃各三錢

沒藥

赤芍

炒五靈脂

各二錢

延胡

川芎

官桂各一錢

炒乾薑一分

炒小茴七分

清水煎服。

(十二)頭風癰 凡挾頭風而來者。名頭風癰。多因肝氣鬱結而成。此症男子少患。女子居多。無論發在何處。外治同上。內服解鬱化痰丸。兼服逍遙散。解鬱化痰丸

夏枯草

白芍各三錢

白芷

羌活

秦 芫

茯苓

半夏

葛 根

煨牡蠣

杭白菊各二錢

天 麻錢半

右研末。爲丸。服法同前。作湯劑亦可。

加減逍遙散方見上傷肝癰內

(十二)傷肺癰 凡因咳嗽日久而來者。名傷肺癰。其症有二。一由外感。一由內傷。由外感而成者。或加減黃芩知母湯。或加減甘桔湯。隨症輕重。斟酌選用。由內傷而成者。或加減八珍湯。或加減左歸飲。右歸飲。隨其症之屬陰屬陽選用。此症多挾氣膈損傷。隨症酌用治傷各味。外治同上。

加減黃芩知母湯

黃 芩

知 母

杏 仁

焦山梔

川貝母

桔 梗

煨牡蠣各二錢

生桑皮

元參

天花粉錢各三

鬱金錢半

生甘草一錢

如挾初感風寒。酌加荊芥、防風。

加減甘桔湯

生甘草一錢

桔梗

川貝母

旋覆花

百部

茯苓錢各二

鬱金錢半

白前錢半

如挾初感風寒。酌加荊芥、防風。

加減左歸飲

熟地

萸肉

枸杞

茯苓

廣皮錢各三

山藥

半夏錢各二

三七

炙甘草錢各一

鬱金錢半

清水煎服。

加減右歸飲

熟地

山藥

枸杞

炒杜仲各三錢

半夏

白芨各二錢

鬱金錢半

三七

廣皮各一錢

炙甘草一錢

白芨

黃肉各二錢

附片八分

安桂三分

(十四)頑核癰 無論在頸之左。在頸之右。初起只單一核。圓若彈丸。不癢不痛。雖經八年十年。仍不腫不痛。亦無加增。此名頑核癰。皆因或氣或血。爲機觸動凝結而成。不必施治。惟謹戒食燥火生痰之物。並少食雞肉。及一切動肝火。則得之矣。

(十五)花柳癰 凡審其果自花柳而來。無論如何發起。均名花柳癰。內治皆以解毒爲先。當用枯草慈菇化毒丸。間服土茯苓膏。如花柳各症。尙未全愈。須兼

服另編花柳丸。並多服解毒湯。如有別症。隨其症之屬陰屬陽。分別酌治。外治同上。如破口。則貼拔毒生肌膏。破口之外。仍用下外治之法點之。如有欲破又未破者。則用所點之藥粉連渣點之。點上少許。其口即破。

枯草慈菇化毒丸

夏枯草 五兩

川貝母

山慈菇

蒲公英

廣陳皮

全蠍

枳殼

桔梗

山梔

白芷

半夏

柴胡

金銀花 各二

沉香

生甘草

杜膽星 各一

共研末。米糊爲丸。如綠豆大。各藥切忌火烘。服法同前。

點癰之藥方

點癰藥品列下

新出窰石灰水入錢出窰未泡
愈新愈佳

乾餅藥四錢又名硯砂潔白
如雪者佳卽純鹼

明硃砂五釐

右三味。其法取石灰先臨風自化。篩去粗粒。將各藥秤足。貯瓦餅聽用。或預先製備多數。將三味加增和勻封好。切勿近潮濕。隨帶出門。極爲方便。至硃砂一味。原取其色紅。易見痕跡。以便復點。非必需之藥也。方中三味。共重一兩二錢零五釐。卽加減些亦可。大約每料必如此之多。方見有味。臨時酌用。不必拘泥。以上所列內服各藥品。其輕重亦可隨時隨人加減。神而明之。存乎其人。

點藥之用法

一、點時。將各藥秤足。用有蓋釉瓷器盛好。然後取高粱燒酒開化。極力攪勻。至恰

好處。何謂恰好。以藥停脚後。其上面約二分清酒浮出。是爲恰好。然後取小筆桿一枝。蘸起其浮出清酒。在癰之核外離三分處。週圍點之。每一點。約亦均離三分。切勿一片塗去。如有酒流下。當用紙圈拭淨。週圍點完。頃刻點乾。照其原點痕處再點。連點至六七次。以痛爲度。初點二三次。卽微作癢。至五六次。卽微作痛。如蟻咬焉。並無大痛。

一、不可並渣點上。如並渣點上。必致破皮。倘破皮。亦無甚妨害。二三日卽自平滿。

一、不可錯亂點去。須次第照原點之痕處點之。其藥味方能直達。而制服其核外之根株。使他潛消。永久不能再發。

一、首次點後。計首尾足五日。須再依前法點之。使其前次所點之藥力。與後次之藥力。可以相接。方能奏功。如未消盡。越五日再點。點至全消爲止。

一點時。無分點數。量核之大小而准數焉。核之大者。其點數卽多。核之小者。其點

數卽少。總以週圍點之爲妙。長者照長式點之。圓者照圓樣點之。核之奇正不齊。卽隨其奇正之式點之。倘其核過大。則並核內亦不妨點之。且不妨週圍雙行點之。使藥味猛而有力。點至全消爲度。如其核收小。則點藥亦宜漸次移入步位。勿拘其舊日所點之處也。遇有昔時之破痕破口。亦不妨隨其破痕破口外週圍點之。使他垢穢不再成膿。易以收口。倘其舊痕腫脹不堪。卽痕內亦不妨加點之。其垢穢隨結痂處而乾。亦易收口。倘其痕如有欲破之勢。則將藥渣點上。立卽破口。並貼以拔毒生肌膏。

一、其核之大小長短方圓聯珠。無論如何式樣。皆可散去。惟有舊痕之死核。則不可散去。點者須知。

一、倘無石灰之處。卽用煨蜃灰代之亦可。亦取其鹹能軟堅之意。其藥力雖無石灰之猛。然加之乾餅藥少許。久點亦必自消。

一、倘或鄉曲之處。一時未便有高粱酒。卽用酸醋代之亦可。蓋酒味則取其透徹。經絡。醋味則取其能收斂脛節也。

一點至五六次。猶不癢不痛者。必其藥味洩而無力故也。須換過藥粉。仍開酒或醋點之。大約此藥味調酒後。未經點者。仍可久藏。乾後再將酒調開。如已經點者。僅可藏至十五六天。至久一月。卽要更換。大約攪至藥粉成團。酒不能清。卽無味矣。

一、隨其核之大小點之。其核收小。其點亦隨而減少。收入。總以離核三分爲妙。不可過遠。過遠。則其藥力不能透其根蒂。

癰家之忌食

雞

肉

雞性主動動則燥火癰之症多生自肝肝最忌燥故肉雞肉一味爲癰家最忌食雖已全愈仍當切戒焉

鵝 肉有毒燥火忌食 飛 禽類多燥火忌食 煎 炒燥火忌食 魚 蝦生痰燥火忌食

陳 腐生痰忌食 羊 肉燥火忌食 牛 肉燥火忌食 酸 辣傷筋傷脛忌食非特薑與

胡椒辛辣等味凡一切辛散之味皆當戒也 馬 肉燥火忌食 猪 肝燥火忌食凡一切諸肝物

皆當戒焉

以上所列忌食各品。不過言其大略。總不外乎其品之近燥火生痰發毒者。皆當切戒焉。癰家謹之。

癰家之宜食

猪 肉滋潤宜食瘦者爲佳 鯉 魚即穿山甲破堅除毒宜食 貓 肉滋潤除陰火宜食

鴨 肉清潤降火宜食 甲 魚滋潤降火宜食 海 參滋潤宜食破爛者則忌食也

墨 魚滋潤降火宜食 蜆 皮滋潤除痰宜食 鮑 魚滋潤宜食 蜃 肉滋潤宜食

燕窩滋潤除痰宜食 蠔宜食 豉宜食 淡菜滋潤宜食 鴨蛋清潤宜食

海帶除痰宜食和猪瘦肉同煲更妙 鹹蛋清潤宜食 雞蛋清潤宜食

百合清潤宜食 紅豆清解宜食 白豆清解宜食 檸檬除痰宜食

東瓜清解宜食 甕菜清解宜食 生菜清解宜食 芥菜除痰宜食

蘿蔔清解宜食 苦瓜清解宜食 綠豆清解宜食 黑豆清解宜食

赤豆去溼宜食 土茯苓清解去溼宜食可當茶飲 夏枯草清解平肝可當茶飲

粉藤根化痰解毒消腫化核須和猪瘦肉同煲食其法取根約三錢和猪瘦肉四兩水三大碗煲二點鐘至半碗停凍去渣藥根再煲並湯食之

長藤胡練根其性服法一如粉藤根 鳳尾草清解當茶飲 溪黃化痰消核服食之法一如

粉根

以上所列當食各品。大約多近清痰化火之味。至其人虛寒。又當因人服食。臨時酌定可也。無論寒熱各症。上條所列之當戒者。仍當切戒。

癰科全書 癰家之宜食

三四

癰科全書終

中國醫學大成第八集

外科類甲
外科叢刊之一

痰癰法門全

上海大東書局印行

痰癰法門提要

清李子穀撰。子穀字慶申。楚北蘄水人。是書首列痰癰總論。大致謂輕微易治者。痰子也。遲重難愈者。癰癰也。次述痰癰鑑別法。外治法門。內治法門。禁用須知。如燈火。禁戒須知。如飲食。服藥宜忌物品。痰癰醫案。末附楊梅驗方。喉蛾捷訣等類。皆從先生平時所得經驗。先辨原因。次詳治法。終述醫案。末附驗方。文義簡當。不感艱澀。與癰科全書合一刊行。相得益彰。誠醫家之寶筏也。

痰癰法門提要

自序

毅自髫齡。見梓里中患斯疾者。日至門而呼籲。

先君魚泉公。具活人手眼。審症施治。刻期而愈。不可勝計。其貧困不能購買方藥者。先君恆備囊餌施與。而不求償報。故近鄉之患痰癰者。咸有所恃而不恐。光緒丙戌。先君見背。是時大母在堂。嘗示毅曰。吾家治痰癰。始於汝曾祖。遠峰公患斯症。後求醫於湖南某君。居家診治。數月而愈。遂得其傳授。汝祖汝父。皆知其術。濟人急難。宏慈善之門。汝曹曷取成法而習之。亦紹先人之事也。毅謹遵命。按法施治。罔不取驗。第見近世以來。患者日衆。其經毅醫治者。痊愈不可枚舉。其不知就醫治者。死喪不知凡幾。即或不死。非成癆瘵。則爲廢疾。哀我人斯。頻罹疾戾。豈不深可憫乎。是以不揣固陋。謹將夙昔所聞見。平時所經驗。先辨論情形。次詳解

治法。終略述醫案。務求平易簡當。俾閱者一覽週知。無質疑問難之苦。將人人得此編。卽人人能治此病。人人能治此病。卽億兆京垓之人。咸無是病。斯亦爲嘽嘽羣生。廣開方便法門之意也。故名是編爲痰癰法門。倘內外

鴻博之士。於斯症有所發明者。究其得失。不憚斧政。改良而進化之。是又所希望於將來也。

民國七年四月十一日

楚北蘄水李慶申子毅謹序

痰癰法門目錄

痰癰總論

一

痰癰鑑別法

三

外治法門

六

內治法門

一〇

禁用須知燈火

一四

禁戒須知飲食 服藥

一六

宜食物品

一八

痰癰醫案

一八

附楊梅驗方

二三

痰癰法門目錄

二

附喉蛾捷訣

一五

痰癰法門

清 蘄水 李慶申子毅氏著

鄞縣 曹赤電炳章圈校

痰癰總論

輕微易治者。痰子也。遲重難愈者。癰癰也。有風痰、熱痰、氣痰。由外感之不同。癰癰、筋癰、痰癰。因內傷之各異。其表面形狀。大致相類。故總名曰痰子。而癰癰者。尤痰子中之重症。治之久而難愈也。

風痰者。風濕之毒。伏於經絡。先寒後熱。結核浮腫。二三日內。即發起於頸項間。治宜祛風散濕化痰消堅之類。

熱痰者。天時亢熱。暑中三陽。及內食煎炒厚味。釀結爲患。色紅發熱。結核堅腫。治宜清脾瀉熱之類。

氣痰者。由感觸四時殺厲之氣。於耳項胸腋。驟成腫核。患者寒熱交作。頭眩項強。治宜調氣和血之類。

癰癰者。累累如貫珠。連接三五枚。有數月數年。或十餘年始發者。初則核小不痛。亦不作寒熱。久方知痛。由誤食蟲蟻鼠殘不潔之物。及宿水陳茶。內有汗液所致。治宜散堅解毒和血之類。

筋癰者。憂愁抑悶。暴怒傷肝。蓋肝主筋。故令筋縮。結蓄成核。生項側筋間。形如棋子。大小不一。或陷或起。久則虛羸。多生寒熱。勞怒則甚。治宜清肝解鬱之類。

痰癰者。飲食冷熱不調。饑飽喜怒不常。致脾氣不能運輸。遂成結核。初起如梅如李。生及遍身。久則微紅。後必潰破。收斂亦易。治宜豁痰行氣之類。

又有婆婦尼僧。室女庶妾。或男患失榮失精。皆志不得伸。思不得遂。積想在心。思慮傷脾。脾敗血虧。遍身結核。最爲難治。宜先養心血。次開鬱結。益腎安神。疎肝快膈。如逍遙散。歸脾湯。益氣養榮湯。俱加香附。青皮。山梔。貝母。木香之類是也。

痰癰鑑別法

凡頭腦骨。及兩顙骨部位。不生痰癰。其餘頸項以下。及週身。皆可發生。初起寒熱交作。結核紅腫者。痰子也。初起不發寒熱。色白不痛者。瘰癧也。以紅屬陽。白屬陰。陽易治而陰難治。

凡癰疽初起時。旁亦核起。然癰疽之核。按之甚形活動。而痰癰結核。按之則推移不動也。

凡痰癰結核。在皮膜內。初則形如棋子。豌豆。菜豆等粒。起發時寒熱交作。大者如


雞卵。如覆盃。或長形不一。色紅腫而起發速者。皆屬痰子。色白微紅。不甚浮腫。而起發遲者。多屬癰癰。

凡痰癰潰破後。多不結痂。穢水時出。生肌膏藥。此塞彼潰。難於取效。惟用後載火攻之法。收工甚速。且不復發。否則蔓延遍身。至津液枯竭。遂成癆瘵。

凡痰癰結核。多以形狀及部位而定其名。隨舉數者。可以例推。如結核在舌下。卽名爲墊舌痰。核在咽喉左右各一枚者。名鐵門拴。耳下入分頰車穴結核者。爲頰車痰。頸項筋間。核長如馬刀者。名馬刀癰。沿頸前面至兩耳下。核起累累如貫珠者。名馬掛鈴。核在脇眼。突然腫大者。爲夾脇痰。附兩手大骨結核者。爲貼骨痰。核生於胸膈上者。爲氣痰。在腰眼者。名纏腰痰。在兩臀上。形如覆碗者。名煨督痰。在胯內鼠蹊穴。及足上臙骨結核者。亦名貼骨痰。結核此潰彼起。遍身而無定處者。名曰遊痰。其蔓生不已。節節破潰。潰口不收者。名瓜藤癰。然得其大概。卽昔人云

七十二種痰症。亦不難辨矣。觀後第一圖。已得概要。

第一圖




說明

右第一圖。所誌各小圈。皆痰癰生於人身各部位。因之而定其名。庶治者覘核結

何部位。及何形像。即可知之。總之痰癰。多緣骨隙而生。而癰癰純屬陰分。其愈期及治法。亦較痰子難十數倍也。

外治法門

第二圖



- (一) 合谷穴 屬手陽明經。
- (二) 肘臂穴 屬手少陽經。
- (三) 肩頭穴 屬手少陽經。
- (四) 頰車穴 屬手陽明經。
- (五) 翳風穴 屬手少陽經。

說明

合谷穴 亦名虎口。在手表面大指次指歧骨間。

肘臂穴 在肘上直骨中間。穴居消燄穴之下。清冷淵之上。


肩頭穴 在肩頭骨下縫中。雲門穴外邊寸許。

頰車穴 亦名禾膠穴。在耳下八分。

翳風穴 在耳後側。穴與耳下齊。

右第二圖所載。皆上身穴道。凡痰癰等症。核起於上身者。按照上身穴道。用麻油蘸細燈草。先在紙上。將油搓乾燃之。於圖中有定點處。輕微燒之。觸近皮膚。卽速提起。凡一、二、三、四、五、五穴。爲有定點。頸項左右有核起者。則左右手五穴。皆用火攻。片面核起者。只於一手五穴用之。此有定點也。其餘無定點。除致命氣門外。則在核起處圍燒之。核大者。頂上三兩點。核小者。頂上一點。此無燒點也。

第三圖



(子)內庭穴 屬足陽明經。

(丑)陷谷穴 屬足陽明經。

(寅)商邱穴 屬足太陰經。

(卯)申脈穴 屬陽蹻。奇經入脈之一

(辰)膝眼穴 屬足陽明經。

(巳)膝眼穴 屬足陽明經。

(午)委中穴 屬足少陰經。即膝腕穴

(未)鼠鼯穴 屬足厥陰經。

說明

內庭穴 在足表面大指次指之歧骨間。

陷谷穴 在足背跌陽穴前去內庭一寸五分。

商邱穴 在內螺螄骨下陷中。

申脈穴 在外螺螄骨下陷中。

膝眼穴 在膝蓋骨左陷中。

膝眼穴 在膝蓋骨右陷中。

委中穴 在膝後腕中。

鼠鼷穴 在胯內大骨盡處。上與橫骨相接之間。

右第三圖所載。皆下身穴道。凡痰癰核起於腰以下者。按照下身穴道。左患攻左。右患攻右。雙方皆患。則左右俱治。如圖所載子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未。爲有定點。用麻油蘸細燈草燒之。此有定燒點。若無定點。亦視腫核環燒之。核大者。頂上燒二三點。核小者。頂上燒一點。此無定燒點之要訣也。

內治法門

內治之法。不外審脈用藥。如風痰。脈必兼浮。熱痰。脈必洪數。氣痰。脈濡。癰癰。脈虛弱。筋癰之或弦或濇。痰癰之或弱或滑。尤在臨症時。細察病原。別其膏梁菽藿。觀其寒熱虛實。老幼榮枯。細詢起居嗜好。而知爲何症。當用何方。病機自無遁情矣。茲將平昔試驗之方。縷列於下。

風痰主治方

防風

荊芥

連翹

牛蒡子

歸尾

赤芍

生甘

銀花錢各一

土茯苓二錢

燈蕊莖十七

熱痰主治方

連翹二錢

當歸

山梔

桔梗

條芩

花粉

僵蠶錢各一

生石膏二錢

竹茹

甘草各五分

氣痰主治方

夏枯草引一錢

藿香二錢

香附

白芷

陳皮

桔梗

茯苓

柴胡

法夏

白朮

厚樸

腹皮

甘草各一錢

癰癰主治方

白芍三錢

當歸三錢

昆布

穿甲

牡蠣

花粉

雲苓

天葵子各二錢

桔梗一錢

山梔

柴胡各五錢

筋癰主治方